



(1) Seja $f(x) = 5\sqrt{x}$ e $g(x) = 4 + \cos x$.

- a) Encontre $(f \circ g)(x)$ e $(f \circ g)'(x)$.
- b) Encontre $(g \circ f)(x)$ e $(g \circ f)'(x)$

(2) Encontre $f'(x)$:

a) $f(x) = (x^3 + 2x)^{37}$

b) $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$

c) $f(x) = \cos^2(3\sqrt{x})$

d) $f(x) = \cos^3(\sin 2x)$

e) $f(x) = \left(\frac{x-5}{2x+1}\right)^3$

(3) Se a equação de movimento de uma partícula for dada por $s(t) = A \cos(\omega t + \delta)$, dizemos que a partícula está em movimento harmônico simples.

- a) Encontre a velocidade da partícula no instante t .
- b) Quando a velocidade é zero?

Gabarito:

(1) a) $(f \circ g)(x) = 5\sqrt{4 + \cos x}$ e $(f \circ g)'(x) = \frac{-5\sin x}{2\sqrt{4 + \cos x}}$.

b) $(g \circ f)(x) = 4 + \cos(5\sqrt{x})$ e $(g \circ f)'(x) = \frac{-5\sin(5\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$

(2) a) $f'(x) = 37(x^3 + 2x)^{36}(3x^2 + 2)$

b) $f'(x) = -\frac{2}{x^3} \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$

c) $f'(x) = -\frac{3}{\sqrt{x}} \cos(3\sqrt{x})\sin(3\sqrt{x})$

d) $f'(x) = -6 \cos^2(\sin 2x) \sin(\sin 2x) \cos(2x)$

e) $f'(x) = 33 \frac{(x-5)^2}{(2x+1)^4}$

(3) a) $v(t) = s'(t) = -A\omega \sin(\omega t + \delta)$.

b) Assumindo as constantes A e ω não nulas, a velocidade é zero para todo $t = \frac{k\pi - \delta}{\omega}$, para todo $k \in \mathbb{Z}$.