

### Sumário

1. Definição e Propriedades

# Definição e Propriedades

### **AVISO**




Nesta aula, todas os entes geométricos estão situados num mesmo plano  $\alpha$ .

### **Conjuntos Convexos**

#### Definição 1

Um conjunto A chama-se **convexo**, se para cada dois pontos X e Y de A, o segmento  $\overline{XY}$  está contido em A.




### Postulado da Separação dos Pontos de um Plano



#### Postulado da Separação dos Pontos de um Plano


Toda reta de um plano divide-o em dois conjuntos, os quais são convexos, denominados **semiplanos.** 



A reta r chama-se **aresta** de cada semiplano de  $\alpha$ .

### Postulado da Separação dos Pontos de um Plano






- Se A e B pertencem a um mesmo semiplano, o segmento AB está contido no mesmo semiplano e não intercepta a reta r.
- Se os pontos C e D pertencem a semiplanos distintos, o segmento CD intercepta a reta r.

## Ângulos


#### Definição 2

Chamamos de **ângulo** a figura formada por duas semirretas que têm a mesma origem.



As semirretas  $\overrightarrow{OA}$  e  $\overrightarrow{OB}$  são chamados **lados** do ângulo e a origem comum O é o seu vértice.

### Notações



Para denotar este ângulo, escrevemos:


- ► Ô
- ► AÔB
- ► BÔA
- ightharpoonup uma letra grega:  $\alpha, \beta, \gamma, \eta, ...$

### Interior

#### Definição 3

Diz-se que um ponto P pertence ao interior de um ângulo AÔB, se

- ► P e A estão num mesmo semiplano definido pela reta  $\overleftrightarrow{\mathsf{OB}}$ ;
- ▶ P e B estão num mesmo semiplano definido pela reta 🛱.



**Figura 1:** *P* pertence ao interior do ângulo *AÔB* 

### Exterior

#### Definição 4

O **exterior** de um ângulo AÔB é o conjunto de todos os pontos do plano que o contém, tais que:

- não pertencem aos lados do ângulo;
- não pertencem ao interior do ângulo dado.





Figura 2: Q pertence ao exterior do ângulo AÔB

# Ângulos Consecutivos

#### Definição 5


Dois ângulos são ditos consecutivos se têm o mesmo vértice e um lado em comum.



# Ângulos Adjacentes

#### Definição 6

Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos em comum, são denominados **adjacentes**.




**Figura 3:** Os ângulos *AÔB* e *BÔC* são adjacentes.

# Ângulos Opostos pelo Vértice

#### Definição 7

Dois ângulos são ditos **opostos pelo vértice**, se os lados de um deles são as semirretas opostas dos lados do outro.



**Figura 4:** Os ângulos  $\mu$  e  $\theta$  são opostos pelo vértice.

### Trabalho




Responda ao questionário: Aula 02: Ângulos Parte 1.

# Ângulos Suplementares



#### Definição 8

Dois ângulos adjacentes, cujos lados não comuns são semirretas opostas, são denominados **suplementares**.



ightharpoonup Dizemos que au é um **ângulo suplementar adjacente** de heta (e vice-versa).

### Tipos de Ângulos

#### Definição 9

Um ângulo AÔB é dito:

- reto, se é congruente a seu suplementar adjacente;
- agudo, se é um ângulo menor que um ângulo reto;
- **obtuso**, se é um ângulo maior que um ângulo reto.



# Medida de Ângulos



As unidades mais utilizadas para medir ângulos (sua amplitude) são o **grau** e **radiano**.





Figura 5: A área em verde representa o ângulo AÔB

# Adição de Ângulos



Postulado Da adição de Ângulos: Se P é um ponto de interior de um ângulo  $A\hat{O}B$ , então  $A\hat{O}B = A\hat{O}P + P\hat{O}B$ .



# Medida de Ângulos



- ▶ O ângulo de um grau (1°) é o ângulo obtido ao dividirmos o ângulo reto em 90 ângulos iguais. Com isso, um ângulo reto possui 90°.
- ▶ O ângulo de um minuto (1′) é o ângulo obtido ao dividirmos o ângulo de 1° em 60 partes iguais:

$$1'=\frac{1^\circ}{60}.$$

▶ O ângulo de um segundo (1") é o ângulo obtido ao dividirmos o ângulo de 1' em 60 partes iguais:

$$1'' = \frac{1'}{60} = \frac{1^{\circ}}{360}.$$

# Ângulos Congruentes




#### Definição 10

Dois ângulos são ditos **congruentes** se têm a mesma medida.

### Bissetriz

#### **Definição 11**

Seja P um ponto interior do ângulo AÔB. A **bissetriz** do ângulo AÔB, é a semirreta  $\overrightarrow{OP}$ , tal que  $A\widehat{OP} = P\widehat{OB}$ .




**Figura 6:** Os ângulos  $A\hat{O}P$  e  $P\hat{O}B$  possuem a mesma medida.

# Ângulos Complementares

#### Definição 12

Dois ângulos são ditos **complementares**, se a soma de suas medidas é 90°. Cada um deles é denominado o **complemento** do outro.



**Figura 7:** Temos que  $\eta + \zeta = 90^{\circ}$ , logo são ângulos complementares.

### Medidas de um ângulo



► Todo ângulo tem sua medida, em graus, de 0 à 180. A medida de um ângulo é zero se, e somente se, seus lados são semirretas coincidentes. Se seus lados são semirretas opostas, sua medida é 180°.




Figura 8: Transferidor: a 'régua' para medir ângulos

# Ângulos



#### Definição 13

Denominamos de ângulo **raso** ao ângulo cujos lados são semirretas opostas (estão sobre a mesma reta, em sentidos opostos).




Figura 9: Ô é um ângulo raso

### Teorema

#### Teorema 1

Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes.




**Figura 10:** Os ângulos  $\mu$  e  $\theta$  são opostos pelo vértice.

### Postulado



Postulado da Unicidade: Qualquer que seja o número real  $\zeta$ , com  $0 < \zeta < 180$ , podemos construir um único ângulo de  $\zeta$  graus, a partir de uma semirreta dada num semiplano.



### Trabalho



Responda ao questionário: Aula 02: Ângulos Parte 2.