

Sumário




1. Definições e Conceitos Básicos

Definições e Conceitos Básicos

Definição

Definição 1

Sejam r um número real positivo e O um ponto do plano. O lugar geométrico de todos os pontos do plano que estão à distância r de O é a **circunferência** de raio r e centro O.




- ▶ Denotaremos esta circunferência por C(O, r).
- O segmento que une o centro O a qualquer ponto da circunferência é denominado raio da mesma.

Definição



Definição 2


- O segmento cujos extremos pertencem à circunferência é denominado corda.
- A corda que passa pelo centro é denominada diâmetro.



Conceitos Básicos



- ▶ Circunferências que possuem o mesmo centro são chamadas concêntricas.
- Circunferências que possuem mesmo raio são chamadas **congruentes**congruentes.



Secantes



Definição 3

- Uma reta que corta uma circunferência em mais de uma ponto é uma reta secante à circunferência.
- Duas circunferências distintas que se cortam em mais de um ponto são chamadas secantes.




Figura 1: \overrightarrow{AB} reta secante à circunferência. Circunferências secantes.

Secantes



Definição 4

A reta que intersecta a circunferência em apenas um ponto é denominada **tangente**. Este ponto é denominado **ponto de tangência**.





Figura 2: \overrightarrow{QP} reta tangente à circunferência em P.

Teorema 1




Teorema 1

A reta tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio traçado pelo ponto de tangência.






ightharpoonup Suponha, por absurdo, que o raio \overline{OP} não seja perpendicular à tangente t



- ▶ Então, seja *C* o ponto da tangente *t* tal que $\overline{OC} \perp t$.
- Seja, também, D um ponto de t, tal que PC = CD.



- ▶ Desta forma, $\triangle OCP = \triangle OCD$:
 - ► OC é um lado em comum (L);
 - ▶ $P\hat{C}O = D\hat{C}O = 90^{\circ}$ (A);
 - ightharpoonup PC = CD (L).
- ▶ Portanto, *OP* = *OD* (lados opostos ao ângulo reto), de onde segue que

$$r = OD$$
.



▶ Isso significa que *D* pertence à circunferência e, assim, a reta *t* teria dois pontos em comum com a mesma, contrariando a hipótese de *t* ser tangente.


Teorema 2



Teorema 2

Recíproca: Uma reta perpendicular ao raio em seu ponto extremo é tangente à circunferência.






- ► Sejam *P* o ponto de tangência e *C* outro ponto de *t*.
- ► Como $\overline{OP} \perp t$, segue que OC > OP = r (\overline{OC} é a hipotenusa do $\triangle OPC$).
- ▶ Logo, *C* não pertence à circunferência, de onde segue que *P* é o único ponto de *t* em comum com a mesma.

Circunferências Tangentes



Definição 5

Duas circunferências são ditas **tangentes**, se são tangentes a uma mesma reta no mesmo ponto.



Teoremas 3 e 4



Teorema 3

O raio perpendicular a uma corda, bisseca esta.

Demonstração: Exercício

Teorema 4

Reciprocamente, se um raio bisseca uma corda, então ele é perpendicular a mesma.

Demonstração: Exercício