

### Sumário

- 1. Definição e Nomenclaturas
- 2. Propriedades dos Paralelogramos
- 3. Propriedades do Retângulo
- 4. Propriedades do Losango
- 5. O Trapézio
- 6. Formulário Avaliativo


# Definição e Nomenclaturas

# Definição

# 1

### Definição 1

Denominamos de quadrilátero ao polígono de quatro lados.





### Definição 2


O quadrilátero cujos lados opostos (que não possuem vértices em comum) são paralelos é denominado **paralelogramo**.





### Definição 3


Um paralelogramo cujos ângulos são retos é denominado **retângulo**.





### Definição 4


Um retângulo cujos lados são congruentes é dito um **quadrado**.





### Definição 5

Um paralelogramo cujos lados são congruentes é denominado losango.



# Propriedades dos Paralelogramos



#### Teorema 1


Em todo paralelogramo:

- a) os ângulos opostos são congruentes;
- b) os lados opostos são congruentes;
- c) as diagonais se bissecam.

Antes de demonstrar o teorema, prove o seguinte lema:

'Segmentos paralelos compreendidos entre dois segmentos paralelos são congruentes.'

- a) Trace uma diagonal e separe o paralelogramo em dois triângulos. Mostre que são congruentes, usando o paralelismo dos lados opostos.
- b) Use a conclusão do item a).
- c) De fato, na figura abaixo



mostre que  $\hat{BIC} = \hat{AID}$  e  $\hat{IBC} = \hat{IDA}$ . Conclua que  $\triangle BIC \equiv \triangle AID$  (LAA).

► Com isso, teremos  $\overline{BI} = \overline{ID}$  e  $\overline{CI} = \overline{IA}$  (Por quê?)




#### Teorema 2

Reciprocamente, um quadrilátero convexo:

- a) cujos lados opostos são congruentes é um paralelogramo;
- b) cujos ângulos opostos são congruentes é um paralelogramo;
- c) cujas diagonais se bissecam é um paralelogramo.



a) Trace uma das diagonais do quadrilátero, dividindo-o em dois triângulos: △ABD e △BCD. Mostre que eles são congruentes.



Conclua que  $\angle CBD = BDA$  e mostre que os segmentos  $\overline{BC}$  e  $\overline{AD}$  são paralelos.



▶ Do mesmo modo, conclua que  $A\hat{B}D = B\hat{D}C$  e mostre que os segmentos  $\overline{AB}$  e  $\overline{DC}$  são paralelos.



b) Trace uma das diagonais do quadrilátero.




- Por hipótese,  $\hat{A} = \hat{C} e A \hat{B} D = A \hat{D} C$ .
- Na figura acima, temos que  $\alpha + \beta = \rho + \theta$  (por hipótese).
- ▶ Além disso, pela Lei Angular de Tales (soma dos ângulos internos):

$$\beta + \theta = \alpha + \rho$$
 (confira!)



- Some estas equações, membro a membro, e conclua que  $\alpha = \theta$ .
- Mostre que, por isso, os segmentos  $\overline{BC}$  e  $\overline{AD}$  são paralelos.
- Analogamente, conclua que  $\beta=\rho$  e, com isso, mostre que os segmentos  $\overline{AB}$  e  $\overline{DC}$  são paralelos.
- ▶ Portanto, *ABDC* é um paralelogramo.


c) Trace as diagonais do quadrilátero.



- ▶ Qual caso de congruência garante que  $\triangle BIC \equiv \triangle AID$ ?
- Dessa congruência, como podemos relacionar os ângulos *CBD* e *BDA*?
- ► Conclua que  $\overline{BC} = \overline{AD}$ .



Analogamente, conclua a congruência dos triângulos AIB e DIC.



- Dessa congruência, relacione os ângulos ABD e BDC.
- ► Conclua que  $\overline{AB} = \overline{DC}$ .

Do exposto acima, conclui-se que ABCD é um paralelogramo.



#### Teorema 3

O quadrilátero que tem dois lados paralelos e congruentes é um paralelogramo.



Trace a diagonal do quadrilátero, transversal aos lados paralelos e congruentes,  $\overline{AD}$  e  $\overline{BC}$ :



► Temos  $\hat{ABD} = \hat{BDC}$  (justifique!) e, assim,

$$\triangle CBD = \triangle BDA$$
 (qual congruência?).


- ightharpoonup Dessa forma, AB = DC (por quê?).
- ▶ Pelo item a), do Teorema 2, segue-se que *ABCD* é um paralelogramo.

# Propriedades do Retângulo



#### Teorema 4

As diagonais de um retângulo são congruentes.



**Figura 1:** Se *EFGH* é um retângulo, então EG = HF.

Demonstração: Exercício.




#### Teorema 5

Reciprocamente, o paralelogramo que tem as diagonais congruentes é um retângulo.




► Trace as diagonais do paralelogramo:



- ▶ Pelo Teorema 1, item c), as diagonais se bissecam.
- ► Como AC = BD, temos que  $\frac{AC}{2} = AI = BI = DI = CI = \frac{BD}{2}$ .
- ▶ Portanto, são isósceles os triângulos AID, BIC, AIB e DIC.
- ► Conclua que  $\triangle AID \equiv \triangle BIC$  e  $\triangle AIB \equiv \triangle DIC$ .



Assim, teremos  $\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = \hat{D} = \alpha + \beta$ .



Como a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é  $180^{\circ}(4-2)=360^{\circ}$ , segue que

$$360^{\circ} = \hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 4(\alpha + \beta) \Leftrightarrow \alpha + \beta = 90^{\circ}.$$

Portanto,  $\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = \hat{D} = 90^{\circ}$ , sendo o paralelogramo um retângulo.


# Propriedades do Losango




#### Teorema 6

Em todo losango:

- a) as diagonais são perpendiculares;
- b) as diagonais são bissetrizes dos ângulos do quadrilátero.







- ► Na figura acima, △*PMN* é isósceles.
- O segmento MI divide a base PN em dois segmentos congruentes. Portanto, é mediana referente a este lado.
- Como a mediana da base é também a altura do triângulo isósceles, temos que MI é perpendicular à diagonal PN.
- ► Conclua daí que  $\overline{MO} \perp \overline{PN}$ .




Para o item b), sabemos que a mediana da base é também a bissetriz do vértice oposto.


- Conclua que  $\overline{MO}$  é a bissetriz de  $\hat{M}$  e de  $\hat{O}$ .
- Conclua que  $\overline{PN}$  é a bissetriz de  $\hat{P}$  e de  $\hat{N}$ .

4

 $ightharpoonup PMI = I\hat{O}N \text{ (por quê?)}$ 




► Com isso,  $\overline{MN}$  é bissetriz dos ângulos  $\hat{M}$  e  $\hat{O}$ .





Para concluir a demonstração do item b), mostre que  $\overline{NP}$  é bissetriz dos ângulos  $\hat{P}$  e  $\hat{N}$ .






#### Teorema 7

Reciprocamente, se as diagonais de um quadrilátero se bissecam e são perpendiculares, então o quadrilátero é um losango.




- Pelo Teorema 2, se as diagonais de um quadrilátero se bissecam, então ele é um paralelogramo.
- ▶ Logo, MN = PO e MP = NO (por quê?).



Para concluir a demonstração, precisamos mostrar que os quatro lados são iguais.



▶ Verifique que  $\triangle PMI = \triangle MIN$ 




ightharpoonup Conclua que MP = MN e, portanto, MN = PO = MP = NO, c.q.d.




#### Teorema 8

As três medianas de um triângulo concorrem no mesmo ponto, situado a dois terços de cada uma delas a partir do vértice.



**Figura 2:**  $AI = BI = CI = \frac{2}{3}AD = \frac{2}{3}BE = \frac{2}{3}CF$ 


Pelos pontos médios M e N trace um segmento de reta que, pelo Teorema 13 (Retas Paralelas), é paralelo ao lado  $\overline{BC}$ . Além disso,  $MN = \frac{BC}{2}$ .



▶ Pelos pontos médios de BI e CI, trace um segmento  $\overline{PO}$ . Por que esse segmento também é paralelo ao lado  $\overline{BC}$ ?




▶ Ainda pelos pontos médios *P* e *O*, trace as paralelas (por quê?) *MP* e *NO*.



- Conclua que os lados paralelos são congruentes.
- O quadrilátero MNOP é um paralelogramo (Teorema 3).



ightharpoonup Se é um paralelogramo, suas diagonais se bissecam, então MI = IO e NI = IP.




ightharpoonup Como IP = BP, BN = BP + IP + IN = IP + IP + IP = 3IP, segue que

$$IP = \frac{BN}{3} \Rightarrow BI = BP + IP = 2IP = \frac{2}{3}BN$$



Por outro lado, se G é o ponto de interseção entre as medianas  $\overline{BN}$  e  $\overline{AD}$ , então

$$BG = \frac{2}{3}BN = BI.$$



► Como *BI* e *BG* estão sobre o mesmo segmento, com o mesmo ponto inicial, podemos concluir que

$$BI = BG$$
,

ou seja, os pontos *l* e *G* coincidem e as três medianas concorrem num mesmo ponto.


# O Trapézio

# Um quadrilátero que não é um paralelogramo



#### Definição 6

Um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos é denominado trapézio.




Os segmentos  $\overline{AB}$  e  $\overline{CD}$  são as **bases** do trapézio.

### Trapézios Especiais



- O trapézio cujos lados não paralelos são congruentes é dito isósceles.
- O trapézio que possui dois ângulos retos é dito **trapézio retângulo**.



### Propriedades do Trapézio




#### Teorema 9

No trapézio isósceles, os ângulos adjacentes à mesma base são congruentes.


#### Demonstração:

- $\blacktriangleright \ \, \textbf{Hipótese:} \, AB = CD$
- ► Tese:  $\hat{A} = \hat{D} e \hat{B} = \hat{C}$






▶ Trace pelo vértice *D* o segmento  $\overline{DE}$  paralelo a  $\overline{AB}$  com  $E \in \overline{BC}$ .



- ▶ O quadrilátero ABCD é um paralelogramo (pq?). Logo,
  - ightharpoonup AB = ED
  - ightharpoonup AB = DE = DC



► Como  $\hat{B} = D\hat{E}C$  e  $C\hat{E}D = \hat{C}$  (pq?), então  $\hat{B} = \hat{C}$ .



lacktriangle Por serem suplementos de ângulos congruentes, temos  $\hat{A}=\hat{D}$ .

### Propriedades do Trapézio




#### Teorema 10

O segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases e igual à sua semi-soma.


#### Demonstração:

- ▶ Hipótese: MB = MA e NC = ND.
- ► Tese:  $\overline{MN} \parallel \overline{BC}$ ,  $\overline{MN} \parallel \overline{AD}$  e  $\overline{MN} = \frac{BC + AD}{2}$





Trace pelo vértice B o segmento  $\overline{BE}$ , que passa pelo ponto médio N, com  $E \in \overrightarrow{AD}$ .



- Os triângulos formados BCN e NDE formados são congruentes, pois
  - ightharpoonup NC = ND (hipótese)
  - $ightharpoonup B\hat{N}C = D\hat{N}E \text{ (pq?)}$
  - $\hat{C} = N\hat{D}E \text{ (pq?)}$
- Assim, BC = DE e BN = NE (lados opostos à ângulos congruentes).



▶ Dessa forma,  $\overline{MN}$  une os pontos médios dos lados  $\overline{AB}$  e  $\overline{BE}$  do  $\triangle ABE$ . Logo,

$$\overline{MN} \parallel \overline{AE}$$
.

- ightharpoonup Como  $\overline{AE} \parallel \overline{BC}$ , a primeira parte do teorema está demonstrada.
- ► Finalmente,

$$MN = \frac{AE}{2} = \frac{AD + DE}{2} = \frac{AD + BC}{2}.$$

O segmento  $\overline{MN}$  é denominado base média ou mediana do trapézio.

# Formulário Avaliativo

#### Formulário



Responda ao formulário: Aula 08: Quadriláteros.