

Aula 01

Conjuntos Numéricos

Karla Lima

Sumário



1. Atividades com o Geogebra
2. Propriedades Básicas da Álgebra
3. Operações com Frações
4. Exercícios de Aprofundamento

The background of the slide is composed of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape occupies the top-left corner, while a light gray shape occupies the bottom-left corner. The rest of the slide is white. The text is centered in the white area.

Atividades com o Geogebra

A Reta Real



Vamos encontrar a posição de alguns números reais na reta real, usando o software Geogebra.

Obs: Como estamos usando uma calculadora 2D, os pontos serão descritos em 2 coordenadas: $(a,0)$. A segunda coordenada igual a zero garante que o ponto estará na reta horizontal.

A Reta Real



1. Os números inteiros são marcados na reta para demarcar posições importantes.
2. Localize os números racionais: $-\frac{33}{13}$, $\frac{29}{7}$ e 5.
 - ▶ Use a barra "/" para escrever frações.
3. Localize os números irracionais: -2π , e , $-\sqrt{2}$ e π .
 - ▶ Use o texto "pi" para denotar o número π e o texto "e" para denotar o número de Euler e .
 - ▶ Para escrever raiz quadrada, use o texto "sqrt" antes do número desejado.

A Reta Real



1. Vá em "Ferramentas" e clique em "Ponto em Objeto".
2. Clique na reta real, obtendo um novo ponto na mesma.
3. Vá em "Ferramentas" e clique em "Mover".
4. Arraste o ponto obtido e observe os valores de sua coordenada na reta.

Ordenação na Reta Real



1. Baixe o arquivo Intervalos na Reta Real.
2. Represente os pontos pedidos.
3. Vá em "Ferramentas" e clique em "Mover".
4. Arraste os pontos extremos ao longo da reta para representar os intervalos pedidos.

The background of the slide is composed of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape occupies the top-left corner, while a light gray shape occupies the bottom-left corner. The rest of the slide is white.

Propriedades Básicas da Álgebra

Operações Fundamentais



Definimos as seguintes operações básicas no conjunto dos números reais:

- ▶ Adição (+);
- ▶ Multiplicação (\cdot ou \times).

A seguir, vamos apresentar suas propriedades.

Leis de fechamento



Dados dois números reais a e b :

- ▶ A soma $a + b$ é ainda um número real;
 - ▶ $3 + 1 = 4 \in \mathbb{R}$;
 - ▶ $-2 + \pi \in \mathbb{R}$.
- ▶ O produto $a \cdot b$ também é um número real.
 - ▶ $3 \times 1 = 3 \in \mathbb{R}$;
 - ▶ $-2 \times \pi = -2\pi \in \mathbb{R}$.

Leis de comutatividade



Dados dois números reais a e b :

- ▶ A ordem é irrelevante na adição: $a + b = b + a$;
 - ▶ $3 + 1 = 1 + 3$;
 - ▶ $-2 + \pi = \pi + (-2)$.
- ▶ A ordem é irrelevante na multiplicação: $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $3 \times 1 = 1 \times 3$;
 - ▶ $-2 \times \pi = \pi \times (-2)$.

Leis associativas



Dados três números reais a , b e c :

- ▶ O agrupamento é irrelevante em adições repetidas: $(a + b) + c = a + (b + c)$;
 - ▶ $(3 + 1) + 5 = 3 + (1 + 5)$;
- ▶ O agrupamento é irrelevante em multiplicações repetidas: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $(3 \times 1) \times 5 = 3 \times (1 \times 5)$.

Leis distributivas



Um panda morre cada vez que você usa errado. Por isso eles estão em extinção!

Dados três números reais a , b e c :

- ▶ A multiplicação é distributiva em relação à adição: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
 - ▶ $3 \times (7 + 5) = 3 \times 7 + 3 \times 5$ (o 3 multiplica os **DOIS** termos da soma, não apenas o que está próximo a ele!);
 - ▶ $(2 + 7) \times (-3) = 2 \times (-3) + 7 \times (-3)$.

Leis distributivas



- ▶ A forma **expandida** de $(a + 2)x$ é

$$a \times x + 2 \times x = ax + 2x.$$

- ▶ A forma **fatorada** de $3y - by$ é

$$(3 - b) \times y = (3 - b)y.$$

Leis de identidade



Dado um número real a :

- ▶ Existe um único elemento 0 com a propriedade: $0 + a = a + 0 = a$;
- ▶ Existe um único elemento 1 com a propriedade: $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

Leis de inverso



Dado um número real a :

- ▶ Existe um número $-a$, tal que

$$a + (-a) = (-a) + a = 0;$$

- ▶ O **oposto** de $\sqrt{2}$ é $-\sqrt{2}$;
- ▶ O **oposto** de $-\pi$ é π .



Leis de inverso

Dado um número real a :

- ▶ Se $a \neq 0$, então existe um número a^{-1} , tal que

$$a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1.$$

- ▶ A **recíproca** de $\sqrt{2}$ é $\frac{1}{\sqrt{2}}$;
- ▶ A **recíproca** de $-\pi$ é $\frac{1}{-\pi}$.

Subtração



Vimos que dado um número real b , existe um número $-b$, tal que

$$b + (-b) = (-b) + b = 0.$$

Devido à esta propriedade, podemos definir em \mathbb{R} a operação de **subtração**, estabelecendo que

$$a - b = a + (-b), \quad \text{para todos } a, b \in \mathbb{R}.$$

Ou seja, **subtrair** dois números nada mais é do que **somar** um deles com o oposto do outro.

Divisão



Vimos também que se $b \neq 0$, então existe um número b^{-1} , tal que

$$b \cdot b^{-1} = b^{-1} \cdot b = 1.$$

Devido à esta propriedade, podemos definir em \mathbb{R} a operação de **divisão**, estabelecendo que

$$\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}, \quad \text{para todos } a, b \in \mathbb{R}, \text{ com } b \neq 0.$$

Ou seja, **dividir** dois números nada mais é do que **multiplicar** um deles com a recíproca do outro.

The background of the slide is composed of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape occupies the top-left corner, while a light gray shape occupies the bottom-left corner. The rest of the slide is white. The title is centered in the white area.

Operações com Frações

Soma de Frações



- Para **somar** duas frações com denominadores iguais, basta somar seus numeradores:

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a + b}{c}.$$

Soma de Frações



- ▶ Se os denominadores são diferentes, devemos dividir o todo por um múltiplo comum entre os denominadores.
- ▶ A forma mais reduzida é encontrada ao se tomar o mínimo múltiplo comum (mmc), porém é bem mais rápido tomar o múltiplo obtido pelo produto dos denominadores.

Soma de Frações



Dada a soma $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$, devemos reescrever cada fração para representar a quantidade de partes de $b \cdot d$ que elas representam:

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} &= \frac{a}{b} \cdot 1 = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{d} \\ &= \frac{a \cdot d}{b \cdot d}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{e} \quad \frac{c}{d} &= \frac{c}{d} \cdot 1 = \frac{c}{d} \cdot \frac{b}{b} \\ &= \frac{c \cdot b}{b \cdot d}\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}\frac{a}{b} + \frac{c}{d} &= \frac{a \cdot d}{b \cdot d} + \frac{c \cdot b}{b \cdot d} \\ &= \frac{a \cdot d + c \cdot b}{b \cdot d}.\end{aligned}$$

Soma de Frações: Exemplos



Exemplo 1

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{1+4}{3} = \frac{5}{3}.$$

Soma de Frações: Exemplos



Exemplo 1

$$\frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{1+4}{3} = \frac{5}{3}.$$

Exemplo 2

$$\frac{1}{\pi} + \frac{7}{2} = \frac{1 \cdot 2}{\pi \cdot 2} + \frac{7 \cdot \pi}{2 \cdot \pi} = \frac{2 + 7\pi}{2\pi}.$$

Multiplicação de Frações



A multiplicação entre frações é bem simples: basta multiplicar os numeradores e dividir pela multiplicação dos denominadores

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}.$$

Multiplicação de Frações: Exemplo



Exemplo 3

Vamos calcular o produto $\frac{12}{11} \cdot \frac{1}{3}$. Pela definição anterior, basta calcular

$$\frac{12}{11} \cdot \frac{1}{3} = \frac{12 \cdot 1}{11 \cdot 3},$$

de onde obtemos que

$$\frac{12}{11} \cdot \frac{1}{3} = \frac{12}{33}.$$

Divisão de Frações



Digamos que queremos efetuar a divisão da fração $\frac{8}{3}$ pela fração $\frac{1}{5}$. Pela definição de divisão, sabemos que

$$\frac{\frac{8}{3}}{\frac{1}{5}} = \frac{8}{3} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-1},$$

onde $\left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$ é o inverso multiplicativo de $\frac{1}{5}$.



Divisão de Frações

Tal inverso é único e satisfaz

$$\frac{1}{5} \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = 1.$$

Como

$$\frac{1}{5} \cdot \frac{5}{1} = 1,$$

podemos afirmar que

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{1}.$$

Divisão de Frações



Em geral, se $\frac{a}{b} \neq 0$, temos que

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{a}{b}} = \frac{b}{a}.$$

Portanto, para efetuar a divisão entre duas frações $\frac{a}{b}$ e $\frac{c}{d}$ ($\neq 0$), basta fazer:

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}.$$

Divisão de Frações: Exemplo



Exemplo 4

Vamos calcular a divisão $\frac{\frac{12}{11}}{\frac{1}{3}}$. Pela definição anterior, basta calcular

$$\frac{12}{11} \cdot \frac{3}{1} = \frac{12 \cdot 3}{11 \cdot 1},$$

de onde obtemos que

$$\frac{\frac{12}{11}}{\frac{1}{3}} = \frac{36}{11}.$$

Divisão de Frações: Exemplo



Exemplo 5

Vamos calcular a divisão $\frac{4}{7} \div \frac{3}{5}$.

Pela definição anterior, basta calcular

$$\frac{12}{11} \cdot \frac{3}{1} = \frac{12 \cdot 3}{11 \cdot 1},$$

de onde obtemos que

$$\frac{\frac{12}{11}}{\frac{1}{3}} = \frac{36}{11}.$$

The background of the slide is composed of two large, overlapping geometric shapes. A teal-colored shape occupies the top-left corner, while a light gray shape occupies the bottom-left corner. The rest of the slide is white.

Exercícios de Aprofundamento

Arquivo



Baixe o arquivo `Numeros.pdf` e resolva os exercícios propostos.