

### Sumário

- 1. Introdução
- 2. Triângulos
- 3. Congruência de Triângulos
- 4. Lugares Geométricos no Triângulo
- 5. Problemas

# Introdução

### Um pouco de História



- Os triângulos têm uma longa história que remonta a algumas das civilizações mais antigas do mundo.
- Desde os primórdios da geometria, eles têm sido objetos de estudo e fascínio.



Egito Antigo (3000 a.C. - 332 a.C.): Os antigos egípcios demonstraram conhecimento básico de geometria ao construir suas pirâmides. Embora não tenham desenvolvido teoremas formais sobre triângulos. suas construções revelam uma compreensão prática dos princípios geométricos.



**Figura 1:** placa circular de argila com pelo menos 3.600 anos de idade produzida na Babilônia Antiga

Mesopotâmia (4000 a.C. - 539 a.C.): Os sumérios e babilônios, que habitavam a região da Mesopotâmia, hoje parte do Iraque, também contribuíram para o desenvolvimento da geometria. Eles possuíam conhecimentos matemáticos avançados, incluindo o uso de triângulos em medições de terras e construções.



**Figura 2:** placa circular de argila com pelo menos 3.600 anos de idade produzida na Babilônia Antiga

- Parece ser o registro mais antigo já identificado de geometria aplicada, propõe o matemático Daniel Mansfield, da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália.
- Segundo o matemático, esse é o único documento cadastral daquele período e representa um mapa usado por agrimensores para definir os limites de um terreno.




**Figura 3:** placa circular de argila com pelo menos 3.600 anos de idade produzida na Babilônia Antiga

- "Ela nos dá detalhes jurídicos e geométricos de um campo que foi dividido após parte dele ter sido vendida".
- Nela, o agrimensor traça ângulos retos usando sequências de três números que formam triângulos retângulos, hoje conhecidas como trios pitagóricos <sup>α</sup>, estabelecidos com base no famoso teorema de Pitágoras, matemático e filósofo grego que só nasceria mais de mil anos depois.

 $<sup>^</sup>a$ é formado por três números naturais  $a, b \in c$  tais que  $a^2 - b^2 + c^2$ 

- ▶ Geometria Grega: Pré-socráticos (séculos VII a VI a.C.) Os filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto, Pitágoras e outros, foram alguns dos primeiros a estudar formalmente os triângulos e suas propriedades. Pitágoras, em particular, é conhecido por seu famoso teorema sobre triângulos retângulos.
- Euclides (século III a.C.): Euclides, sistematizou o conhecimento matemático da época em sua obra "Os Elementos". Neste trabalho, ele dedica um livro inteiro à geometria, incluindo a teoria dos triângulos e muitos dos teoremas fundamentais ainda estudados hoje.

#### Era Moderna



- Nos tempos modernos, os triângulos continuam a ser uma parte essencial do currículo matemático, estudados desde as séries iniciais até níveis mais avançados de educação matemática.
- Suas propriedades geométricas e aplicações são amplamente exploradas em diversas áreas, desde a física e a engenharia até a computação e a arte.


# Triângulos

### Definição

#### Definição 1


Sejam A, B e C três pontos não colineares.

Denominamos de **triângulo** ABC a união dos segmentos  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$  e  $\overline{BC}$  e o denotaremos por  $\triangle ABC$ .



### Definição






- ► Os pontos *A*, *B* e *C* são os **vértices** e os segmentos  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$  e  $\overline{BC}$  são os **lados** do triângulo.
- ▶ Os ângulos  $B\hat{A}C = \alpha$ ,  $A\hat{B}C = \gamma$  e  $A\hat{C}B = \beta$  são os **ângulos internos** do triângulo. Seus suplementos  $\alpha'$ ,  $\gamma'$  e  $\beta'$  são os **ângulos externos** do triângulo.

### Isósceles



Um triângulo que tem dois lados congruentes é denominado isósceles.




O outro lado é chamado **base** e o ângulo oposto à base é o **ângulo do vértice**.

### Equilátero

#### Definição 3

Um triângulo cujos lados são congruentes chama-se equilátero.




**Obs:** Todo triângulo equilátero possui dois lados congruentes, logo ele também será isósceles.

### Escaleno



#### Definição 4

Um triângulo no qual dois lados quaisquer não são congruentes, chama-se **escaleno**.





### Classificação: Ângulos



Quanto aos ângulos, os triângulos se classificam em:

- retângulos se, e somente se, têm um ângulo reto;
- acutângulos se, e somente se, têm os três ângulos agudos;
- b obtusângulos se, e somente se, têm um ângulo obtuso.





 $\triangle$ ABC é retângulo em A.  $\triangle$ DEF é acutângulo.

 $\triangle$ RST é obtusângulo em S.

### Congruência de Triângulos

### Introdução



- Ao longo da história, a congruência de triângulos tornou-se uma parte fundamental da geometria, com muitos matemáticos contribuindo para seu estudo e desenvolvimento.
- A compreensão das propriedades que tornam dois triângulos congruentes é essencial em diversas áreas, desde a construção civil até a ciência da computação.
- A congruência de triângulos permanece como um dos pilares fundamentais da geometria.

### Introdução

- ➤ A congruência de triângulos é um dos conceitos centrais da geometria. Ela nos permite entender e descrever as relações entre diferentes triângulos com base em suas propriedades geométricas.
- ► Isso é essencial para o desenvolvimento de teoremas e métodos de resolução de problemas geométricos.

### **Aplicações**

- Na engenharia civil e na arquitetura, a congruência de triângulos é essencial para projetar estruturas sólidas e estáveis.
- Os princípios da congruência são aplicados no desenho de edifícios, pontes, estradas e outras estruturas.
- A congruência de triângulos está intimamente relacionada com a trigonometria, especialmente quando se trata de resolver problemas envolvendo ângulos e medidas de lados em triângulos.
- As relações trigonométricas são usadas para determinar a congruência de triângulos em muitos casos.

### Definição de Congruência



#### Definição 5


Um triângulo é congruente (símbolo  $\equiv$ ) a outro se, e somente se, é possível estabelecer uma correspondência entre seus vértices de modo que:


- seus lados s\(\tilde{a}\) ordenadamente congruentes aos lados do outro;
- seus ângulos são ordenadamente congruentes aos ângulos do outro.

Em linguagem popular, dizemos que duas figuras planas são congruentes se elas coincidem por superposição.

### Definição de Congruência








- ►  $\overline{AB} \equiv \overline{DE}$ ,  $\overline{AC} \equiv \overline{DF}$  e  $\overline{BC} \equiv \overline{EF}$ ;
- $ightharpoonup \hat{A} \equiv \hat{D}, \hat{B} \equiv \hat{E} \ e \ \hat{C} \equiv \hat{F}.$

### Exemplo

#### Exemplo 1

Suponhamos que os triângulos abaixo coincidem por superposição. Quais os pares de vértices que devem ser sobrepostos?




**Figura 4:**  $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ 

#### Nomenclatura

- Os vértices que coincidem na superposição são denominados correspondentes.
- Os lados que unem vértices correspondentes são também chamados correspondentes.
- Analogamente, os ângulos cujos vértices estão em correspondência, são correspondentes.

### Observação

Observe que em triângulos congruentes, a ângulos congruentes opõem-se lados congruentes e vice-versa.



**Notação:** Para indicar que dois triângulos são congruentes, escrevemos:

$$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$$
.

A ordem em que as letras aparecem, indicam as correspondências entre os vértices.




Baixe o arquivo LAL\_1.ggb e abra no Geogebra.


- 1. Construa outro triângulo com dois lados congruentes aos lados  $\overline{A'B}$  e  $\overline{BC}$ , com o ângulo formado por estes lados congruente ao ângulo  $\hat{B}$ .
- 2. Compare o comprimento do terceiro lado obtido e a medida dos outros dois ângulos com os correspondentes do triângulo original.

### 1° caso: LAL

#### Postulado: Caso LAL

Se dois triângulos têm dois lados congruentes e os ângulos compreendidos entre eles são respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes.






### Teorema do Triângulo Isósceles



#### Teorema 1


Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes.




### Demonstração: Teorema do Triângulo Isósceles



- A partir do triângulo ABC, obtemos os triângulo CBA ao espelharmos o triângulo inicial.
- Pelo caso LAL, os triângulos ABC e CBA são congruentes.







### Demonstração: Teorema do Triângulo Isósceles



Como ângulos opostos a lados congruentes são congruentes,  $e\overline{AB} \equiv \overline{BC}$ , concluímos que  $\hat{A} \equiv \hat{C}$ .







Baixe o arquivo ALA\_1.ggb e abra no Geogebra.

- 1. Construa outro triângulo com lado congruente ao lado  $\overline{A'B}$ , com os ângulos adjacentes a este lado congruentes aos ângulos  $\hat{A}$  e  $\hat{B}$ .
- 2. Compare o comprimento dos outros dois lados obtidos e a medida do outro ângulo com os correspondentes do triângulo original.

#### 2° caso: ALA

#### Teorema 2

Se dois triângulos têm um lado congruente, compreendido entre dois ângulos respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes.




Figura 5:  $\triangle ABC \equiv \triangle FDE$ 

### Lugares Geométricos no Triângulo

### Perpendicularidade




- ► Como vimos, Euclides define 'ângulo reto' como sendo igual ao ângulo formado por duas retas que se cortam de maneira a formar quatro ângulos iguais.
- ► Essas duas retas são ditas **perpendiculares** (símbolo: ⊥).
- Dois segmentos são ditos perpendiculares quando ambos se intersectam formando um ângulo reto.

### Altura



▶ se  $\overrightarrow{EH}$  for perpendicular à reta que contém o lado  $\overline{FG}$ , o segmento  $\overline{EH}$  chama-se **altura** do triângulo, relativa ao lado  $\overline{FG}$ .



### Ponto Médio

#### Definição 6

Um ponto C chama-se **ponto médio** do segmento AB, se:

- 1. C pertence ao segmento  $\overline{AB}$  ( $C \in \overline{AB}$ );
- 2. O comprimento do segmento  $\overline{AC}$  é igual ao do segmento  $\overline{CB}$  (AC = CB).




### Ponto Médio (segmento)

#### Mediana

#### Definição 7

Chama-se **mediana** de um triângulo ao segmento que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a ele.




**Figura 6:** Na figura acima,  $\overline{GI}$  é a mediana relativa ao lado EF

#### Bissetriz

#### Definição 8

Sejam EFG um triângulo e H um ponto da reta que contém o lado FG.

se a semirreta  $\overrightarrow{EH}$  é bissetriz do ângulo Ê, o segmento  $\overline{EH}$  chama-se a **bissetriz interna** do triângulo, relativa ao lado  $\overline{FG}$ .




### **Problemas**

# 1


#### Exercício 1

Mostre que, num triângulo isósceles, a bissetriz do ângulo do vértice é também mediana e altura.




#### Exercício 2

Mostre que, num triângulo isósceles, a altura relativa à base o divide em dois triângulos congruentes.



#### Exercício 3

Na figura, temos AB = 30, DE = 20, AE = 3x - 1 e CD = 2y + 8. Determine os valores de x e y.





Num triângulo isósceles  $\triangle ABC$ , de base BC, marcamos sobre o lado BC os pontos D e E, de maneira que BD  $\equiv$  EC. Mostre que  $\triangle ADB \equiv \triangle AEC$ .



Na figura abaixo,  $\overline{DC} \perp \overline{AB}$  e C é o ponto médio de  $\overline{AB}$ . Demonstre que os suplementos dos ângulos DÂB e DÂA são congruentes.

