

Sumário

- 1. Perpendicularidade
- 2. Projeções e Distâncias
- 3. Trabalho 04/07 Parte 2

Perpendicularidade

Definição



- Como vimos, Euclides define 'ângulo reto' como sendo igual ao ângulo formado por duas retas que se cortam de maneira a formar quatro ângulos iguais.
- ► Essas duas retas são ditas **perpendiculares** (símbolo: ⊥).
- O resultado a seguir é um corolário do Teorema do Triângulo Externo.

Corolário




Corolário 1

Por um ponto não pertencente a uma reta, passa uma única reta perpendicular a reta dada.

- ▶ Hipótese: $C \notin r$.
- ► **Tese:** Existe uma única reta que passa por *C* e é perpendicular a reta *r*.


Existência:

- ► Seja *r* uma reta e *C* um ponto fora dela.
- Trace na reta r um ponto D tal que CD = CB.




Existência:

► O triângulo *DCB* é isósceles, logo sua bissetriz é também sua mediana e sua altura (Teorema 2).




Existência:

Assim, a bissetriz de \hat{C} é uma reta perpendicular à reta r que passa por C.



Unicidade: .

► Suponha, por absurdo, que existam duas retas perpendiculares à reta *r*, que passam por *C*.





Unicidade:

- O triângulo *CFE* possui dois ângulos retos (*CFE* e *CEF*).
- Mas, por causa do TAE, se um ângulo for reto os outros devem ser agudos, contradizendo a afirmação acima.

Exercício



Demonstre o seguinte teorema:

Num mesmo plano, duas retas distintas perpendiculares a uma terceira, são paralelas entre si.

Exercício



Demonstre o seguinte teorema:


Num mesmo plano, duas retas distintas perpendiculares a uma terceira, são paralelas entre si.

► Hipótese:

$$r, s, t \in \alpha, r \perp s,$$

 $r \perp t e s \neq t.$

► **Tese:** *s* e *t* são paralelas.



Projeções e Distâncias


Projeção Ortogonal



Definição 1

Chama-se projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta r ao ponto de interseção da reta com a perpendicular à ela que passa por aquele ponto.

- $ightharpoonup \overrightarrow{PP'} \perp r e \overrightarrow{PP'} \cap r = \{P'\}.$
- ▶ Se $P \in r$, então P' = P.



Projeção de um segmento sobre uma reta

Definição 2

A **projeção** de um segmento de reta \overline{AB} não perpendicular a uma reta r sobre esta reta é o segmento $\overline{A'B'}$ em que

- ► A' é a projeção de A sobre r e
- ▶ B' é a projeção de B sobre r.





Figura 1: Exemplos da projeção

Retas Oblíquas

Definição 3

Se duas retas são concorrentes e não são perpendiculares, diz-se que essas retas são oblíquas.



Teoremas

Seja r uma reta, P um ponto fora dela e P' a projeção ortogonal deste ponto. Ainda, sejam A e B pontos de r.

Demonstre os teoremas a seguir:

Teorema 1

O segmento perpendicular $\overline{PP'}$ é menor que qualquer oblíquo \overline{PA} .

Teorema 2

Se os segmentos oblíquos \overline{PA} e \overline{PB} possuem projeções congruentes, então eles também são congruentes.

Teorema 3

Segmentos oblíquos congruentes têm projeções congruentes.

Teoremas

Teorema 4

De dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, o de maior projeção é maior.

Teorema 5

De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior tem projeção maior.

Teorema 6

De dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com a sua projeção ângulo menor.


Teorema 7

De dois segmentos oblíquos não congruentes, aquele que forma com a sua projeção um ângulo menor é maior.

Distâncias

Definição 4

A distância de um ponto a uma reta é a distância desse ponto à projeção dele sobre a reta.



Exercícios



Exercício 2

Mostre que todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante dos lados do ângulo.

Trabalho 04/07 - Parte 2

Exercícios



Seja r uma reta, P um ponto fora dela e P' a projeção ortogonal deste ponto. Ainda, sejam A e B pontos de r.

- 5. O segmento perpendicular $\overline{PP'}$ é menor que qualquer oblíquo \overline{PA} .
- 6. De dois segmentos oblíquos de projeções não congruentes, o de maior projeção é maior.