KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Sinais vitais e interpretação

Temperatura e pulso

Aula 1 de 5 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Temperatura e pulso

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Locais e técnica de medição da temperatura; frequência, ritmo e amplitude do pulso.

Nesta aula aprende a medir a temperatura e o pulso com técnica correcta, a reconhecer os valores normais e alterados e a registá-los de forma clara.

Os sinais vitais são os primeiros dados que o enfermeiro recolhe: valores medidos sem técnica podem levar a decisões erradas.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. O que são sinais vitais
3. Antes de medir qualquer sinal vital
4. Temperatura: locais de medição
5. Técnica: temperatura axilar
6. Temperatura: valores de referência
7. Febre: o que observar
8. Pulso radial: como avaliar
9. Pulso: três características
10. O que altera a frequência do pulso
11. Registar correctamente
12. Caso: homem de 62 anos com febre
13. Caso: resolução
14. Erros frequentes
15. Pontos-chave
16. Para reflectir
17. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Explicar o que são sinais vitais e para que servem
2. Escolher o local e o termómetro adequados
3. Medir a temperatura axilar com técnica correcta
4. Avaliar a frequência, o ritmo e a amplitude do pulso radial
5. Reconhecer febre, hipotermia, taquicardia e bradicardia

O que são sinais vitais

Os sinais vitais reflectem o **funcionamento básico do organismo**:

- **Temperatura**
- **Pulso** (frequência cardíaca)
- **Respiração** (frequência respiratória)
- **Tensão arterial**
- **Saturação de oxigénio** (SpO_2)
- **Dor** (considerada o quinto sinal vital)

Medem-se na admissão, de forma regular durante os cuidados e sempre que o doente se altere.

Antes de medir qualquer sinal vital

Prepare sempre o doente e o material. Em condições erradas, o valor mente.



Temperatura: locais de medição

Local	Vantagens	Limitações
Axilar	Segura, simples, barata	Menos exacta; demora; axila tem de estar seca
Oral	Rápida	Só em doente consciente e cooperante; esperar após beber
Timpânica (ouvido)	Muito rápida	Cera ou técnica errada alteram o valor
Temporal (testa)	Rápida, sem contacto	Sensível a suor, ambiente e distância
Rectal	Mais próxima da central	Invasiva; usada em situações específicas

Use **sempre o mesmo local** ao comparar valores ao longo do tempo e **registe qual**.

Técnica: temperatura axilar

1

Lave as mãos e explique o procedimento

2

Verifique que o termómetro está limpo e a zero

3

Seque a axila; coloque a ponta no centro, bem encostada à pele

4

Peça para manter o braço junto ao corpo

5

Aguarde o sinal sonoro ou o tempo indicado


6

Leia, registe (valor, local, hora) e limpe o termómetro

Temperatura: valores de referência

Classificação	Axilar no adulto
Hipotermia	Abaixo de 35,0 °C
Normal	36,0 a 37,0 °C
Febrícula	37,1 a 37,9 °C
Febre	38,0 °C ou mais
Hipertermia grave	Acima de 40,0 °C

Atenção: em recém-nascidos, idosos e imunodeprimidos, a infecção pode surgir **sem febre**, ou com temperatura baixa.



Febre: o que observar

- Causas: infecção (a mais comum), inflamação, reacção a medicamentos, desidratação, esforço
- Acompanhe: calafrios, sudorese, taquicardia, taquipneia, prostração
- Na criança, procure sinais de alarme: prostração, recusa alimentar, convulsão, manchas na pele
- Hidrate, mantenha o ambiente fresco e cumpra o tratamento prescrito
- Em contexto endémico (ex.: **malária**), febre é sempre motivo de avaliação

Pulso radial: como avaliar

1. Coloque o doente confortável, com o antebraço apoiado e a palma para cima
2. Use as pontas de **dois ou três dedos** no lado do polegar, no punho
3. **Nunca use o polegar** (tem pulsação própria)
4. Conte: pulso regular, **30 segundos × 2**; pulso irregular, **60 segundos completos**
5. Avalie **frequência, ritmo e amplitude**
6. Registe o valor e as características

Pulso: três características

Característica	O que avaliar	Exemplos
Frequência	Batimentos por minuto	60 a 100 bpm no adulto em repouso
Ritmo	Regular ou irregular	Fibrilhação auricular é irregularmente irregular
Amplitude	Força do pulso	Fraco (filiforme), normal, forte (cheio)

- **Taquicardia:** acima de 100 bpm
- **Bradicardia:** abaixo de 60 bpm
- Em atletas treinados, 50 bpm pode ser normal

O que altera a frequência do pulso

Aumenta	Diminui
Febre	Sono e repouso profundo
Dor e ansiedade	Treino físico regular (atletas)
Exercício e esforço	Beta-bloqueadores e outros fármacos
Hemorragia e desidratação	Hipotermia
Café, tabaco, estimulantes	Alguns problemas do coração

Um pulso rápido e fraco com pele fria pode ser sinal de **choque**.

Registar correctamente

- Escreva **valor, unidade, hora e local** (ex.: «Temp. axilar 38,4 °C, 14h30»)
- Registe o ritmo e a amplitude do pulso quando alterados
- Registe o que fez perante um valor alterado e a quem comunicou
- **Não registe** o que não mediu
- Corrija sem rasurar: uma linha e rubrica

Caso: homem de 62 anos com febre

Um homem de 62 anos chega à consulta com mal-estar e arrepios há 2 dias. Temperatura axilar: 38,9 °C. Pulso: 112 bpm, regular. Está a tremer e diz ter dor de cabeça.

> **Pense antes de avançar:** como classifica estes valores e o que faz?

Caso: resolução

1. **Febre** (≥ 38,0 °C) e **taquicardia** (112 bpm), compatíveis com infecção
2. Confirme o local de medição e repita se houver dúvida
3. Avalie os restantes sinais vitais (respiração, TA, SpO_2) e o nível de consciência
4. Pergunte por sintomas associados (tosse, urina, diarreia, exposição à malária)
5. Comunique ao médico, hidrate e cumpra o tratamento prescrito
6. **Reavalie** a temperatura e o pulso após a intervenção

Erros frequentes

- Medir com a axila húmida
- Usar o polegar para tomar o pulso
- Contar pulso irregular só durante 15 ou 30 segundos
- Não registar o local da temperatura
- Medir logo depois de esforço, banho quente ou bebida
- Ignorar um pulso rápido e fraco num doente pálido

Pontos-chave

1. Os sinais vitais incluem temperatura, pulso, respiração, TA, SpO_2 e dor
2. Use sempre o mesmo local para comparar temperaturas
3. Febre: 38,0 °C ou mais; hipotermia: abaixo de 35,0 °C
4. Pulso: dois ou três dedos, nunca o polegar
5. Irregular: contar 60 segundos; regular: 30 segundos × 2
6. Registe valor, unidade, hora e local

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Que termómetros há no seu serviço e como são limpos?

? Em que casos uma temperatura normal engana?

? Como explicaria ao doente porque tem de ficar em repouso antes da medição?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Valores de referência no adulto

→ Conversão de temperatura

→ Siglas de sinais vitais

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser