KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Sinais vitais e interpretação

Respiração e saturação

Aula 2 de 5 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Respiração e saturação

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Contagem da frequência respiratória e utilização do oxímetro de pulso.

A frequência respiratória (FR) é o sinal vital mais facilmente esquecido e, muitas vezes, o primeiro a alterar-se num doente que se agrava. A saturação periférica de oxigénio (SpO_2) mostra em segundos como o sangue está a ser oxigenado.

Nesta aula aprende a medir ambos com técnica, a interpretar valores e a reconhecer…

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. Porque a respiração é tão importante
3. Contar a frequência respiratória
4. Valores de referência e termos
5. Sinais de esforço respiratório
6. Oxímetro de pulso: como usar
7. SpO_2: valores de referência
8. Leituras falsas: causas
9. Oxigénio suplementar: registar bem
10. Caso: dispneia numa idosa
11. Caso: resolução
12. Erros frequentes
13. Pontos-chave
14. Para reflectir
15. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Contar correctamente a frequência respiratória
2. Reconhecer padrões e sinais de esforço respiratório
3. Utilizar o oxímetro de pulso e interpretar a SpO_2
4. Identificar causas de leituras falsas
5. Registar a SpO_2 indicando se há oxigénio suplementar

Porque a respiração é tão importante

- A FR é muitas vezes **o primeiro sinal** de deterioração
- Aumenta na dor, febre, ansiedade, acidose, sépsis e doenças pulmonares
- Diminui em intoxicação por opióides, sedação e lesão cerebral
- Contar a FR demora 1 minuto: **não o substitua por «estimativa»**

Contar a frequência respiratória

Faça-o sem o doente saber

finja que está a tomar o pulso

2

Observe o movimento do tórax ou do abdómen (uma subida e descida = 1 respiração)

3

Conte durante 60 segundos completos

4

Observe o ritmo, a profundidade e o esforço

5

Registe o valor e qualquer sinal de dificuldade

Valores de referência e termos

Termo	Significado	Valor no adulto
Eupneia	Respiração normal	12 a 20 por minuto
Taquipneia	Respiração rápida	Acima de 20
Bradipneia	Respiração lenta	Abaixo de 12
Apneia	Ausência de respiração	0
Dispneia	Sensação de falta de ar	Sintoma subjectivo

Atenção: uma FR de 25 ou mais, ou de 8 ou menos, é sinal de alerta.

Sinais de esforço respiratório

- Uso dos **músculos acessórios** (pescoço, ombros)
- **Tiragem**: retracção entre as costelas ou acima da clavícula
- Batimento das **asas do nariz**
- Fala entrecortada (só palavras soltas)
- Posição de tripé (inclinado para a frente, a apoiar-se)
- Cianose (lábios ou dedos azulados)
- Agitação, sonolência ou confusão

Estes sinais pedem **avaliação urgente**.

Oxímetro de pulso: como usar

1

Escolha o dedo mais adequado (indicador ou médio), limpo e quente

2

Retire verniz e unhas artificiais

3

Coloque o sensor sem apertar e com o doente quieto

4

Aguarde que a leitura estabilize e a onda de pulso seja boa

5

Leia a SpO_2 e a frequência de pulso

6

Registe se o doente respira ar ambiente ou oxigénio

SpO_2: valores de referência

SpO_2 em ar ambiente	Interpretação
95% ou mais	Normal
91 a 94%	Baixa: avaliar o doente e comunicar
90% ou menos	**Hipoxemia**: avaliação urgente

- Em doentes com **DPOC** ou outras doenças crónicas, o alvo pode ser **88 a 92%** (por indicação médica)
- A SpO_2 pode ser normal e o doente estar mal (por ex.: anemia grave)

Leituras falsas: causas

Causa	Efeito
Verniz escuro, unhas artificiais	Leitura baixa ou errada
Mãos frias ou má perfusão	Sem onda ou valores baixos
Movimento, tremores	Leitura instável
Luz intensa sobre o sensor	Leitura errada
Monóxido de carbono	Valor falsamente normal
Pele muito pigmentada	Pode sobrestimar a saturação

Quando a leitura não bate certo com o doente, **confie no doente**, repita e peça ajuda.

Oxigénio suplementar: registar bem

- Indique sempre **ar ambiente** ou **oxigénio** (litros por minuto ou dispositivo)
- A mesma SpO_2 de 96% com oxigénio é **menos tranquilizadora** do que em ar ambiente
- Não corte nem aumente o oxigénio sem prescrição, excepto em emergência
- Vigie a FR, o esforço e a consciência, e não apenas o número

Caso: dispneia numa idosa

Uma mulher de 74 anos, com tosse há 3 dias, tem FR de 26 por minuto e SpO_2 de 89% em ar ambiente. Fala em frases curtas e usa os músculos do pescoço para respirar.

> **Pense antes de avançar:** o que faz?

Caso: resolução

1. **Taquipneia** (26) e **SpO_2 de 89%**: hipoxemia com sinais de esforço
2. Coloque-a numa posição confortável (semi-sentada)
3. **Comunique de imediato** ao médico ou enfermeiro responsável
4. Administre oxigénio **conforme a prescrição/protocolo** e reavalie
5. Verifique os restantes sinais vitais e o estado de consciência
6. Registe valores, hora, oxigénio, comunicação e resposta

Erros frequentes

- Contar a FR durante 15 segundos e multiplicar por 4
- Deixar o doente perceber que está a ser observado
- Não retirar verniz antes do oxímetro
- Não registar se está em oxigénio
- Confiar no valor da SpO_2 ignorando o aspecto do doente
- Esquecer a FR nos doentes «estáveis»

Pontos-chave

1. A FR é um sinal precoce de deterioração
2. Conte 60 segundos, sem o doente saber
3. Normal 12–20; alerta ≤ 8 ou ≥ 25
4. SpO_2 normal ≥ 95%; ≤ 90% exige avaliação urgente
5. Retire o verniz e vigie leituras falsas
6. Registe se há oxigénio suplementar

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Quantas vezes já contou a FR de um doente durante um minuto completo?

? Em que situações confia mais no doente do que no oxímetro?

? Que alvo de SpO_2 definiria para um doente com DPOC e quem decide?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Valores de referência no adulto

→ NEWS2: escala de alerta precoce

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser