KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Estabilização de pacientes

Reconhecer a deterioração (NEWS2)

Aula 4 de 6 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Reconhecer a deterioração (NEWS2)

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Utilizar a escala NEWS2 para identificar o doente que se agrava.

A NEWS2 soma pontos de sete parâmetros para alertar precocemente: frequência respiratória, SpO_2, oxigénio suplementar, tensão arterial sistólica, pulso, consciência e temperatura. Nesta aula aprende a pontuar, a interpretar o resultado, a escalar com SBAR e os limites da escala.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. O que é a NEWS2
3. Os sete parâmetros
4. Tabela de pontuação
5. Consciência: ACVPU
6. Interpretar a pontuação
7. Agir: comunicar com SBAR
8. Caso clínico: pós-operatório
9. Caso clínico: resolução
10. Limites da NEWS2
11. Erros frequentes
12. Pontos-chave
13. Para reflectir
14. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Explicar para que serve a NEWS2 e quando se usa
2. Medir e pontuar os sete parâmetros
3. Interpretar a pontuação total e decidir a resposta
4. Comunicar o doente em deterioração com SBAR
5. Reconhecer os limites da escala

O que é a NEWS2

A **National Early Warning Score 2** é uma escala de alerta precoce publicada pelo Royal College of Physicians (Reino Unido). Transforma sinais vitais em **uma pontuação** que desencadeia uma resposta.

- Cada parâmetro vale de 0 a 3 pontos
- A soma indica o risco de deterioração
- Dá à equipa uma linguagem comum e ritmos de resposta definidos
- Usa-se em adultos; não é validada em crianças nem na gravidez

> A escala **apoia** o julgamento clínico, não o substitui. A preocupação do profissional ou da família é razão suficiente para chamar ajuda.

Os sete parâmetros

Respiração

frequência respiratória por minuto

Saturação

SpO_2 medida no oxímetro

Ar ou oxigénio

o doente recebe oxigénio?

Tensão

tensão arterial sistólica

Pulso

frequência cardíaca por minuto

Consciência

alerta ou alteração nova (ACVPU)

Temperatura

medida em graus Celsius

Tabela de pontuação

Parâmetro	3	2	1	0	1	2	3
Respiração	≤ 8		9–11	12–20		21–24	≥ 25
SpO_2 (escala 1)	≤ 91	92–93	94–95	≥ 96			
Ar / oxigénio				Ar		O_2	
TA sistólica	≤ 90	91–100	101–110	111–219			≥ 220
Pulso	≤ 40		41–50	51–90	91–110	111–130	≥ 131
Consciência				Alerta			CVPU
Temperatura	≤ 35,0		35,1–36,0	36,1–38,0	38,1–39,0	≥ 39,1	

A escala 2 de SpO_2 (alvo 88 a 92%) só é usada por indicação clínica, em doentes com insuficiência respiratória hipercápnica.

Consciência: ACVPU

- **A:** alerta, orientado
- **C:** confusão nova ou agravada
- **V:** responde à voz
- **P:** responde à dor
- **U:** não responde

Atenção: qualquer valor diferente de «A» vale **3 pontos**. Confusão nova, mesmo num doente que responde, é um sinal de alarme.

Interpretar a pontuação

Pontuação	Risco	Resposta
0	Baixo	Observações pelo menos de 12 em 12 horas
1 a 4	Baixo	Observações de 4 a 6 horas; o enfermeiro decide se aumenta
3 num só parâmetro	Baixo a médio	Revisão urgente por clínico; observações de hora em hora
5 a 6	Médio	Revisão urgente por clínico com competência em doença aguda
7 ou mais	Alto	Resposta de emergência; monitorização contínua

Os ritmos exactos seguem o protocolo da sua instituição.



Agir: comunicar com SBAR

S

Situação. Quem sou, qual o doente, a pontuação e o que me preocupa

B

Antecedentes. Motivo da admissão, doenças, medicação, alergias

A

Avaliação. Sinais vitais, ABCDE, o que já fiz

R

Recomendação. O que preciso e em que prazo

Caso clínico: pós-operatório

Mulher de 72 anos, 2.º dia depois de cirurgia abdominal. Está acordada e diz que «não se sente bem».

- Frequência respiratória: 22; SpO_2: 93% em ar ambiente
- Pulso: 112; tensão arterial: 98/60 mmHg
- Temperatura: 38,4 °C; consciência: alerta

Pense antes de avançar: calcule a pontuação NEWS2 e decida o que fazer.

Caso clínico: resolução

- Respiração 22: **2** · SpO_2 93: **2** · Ar ambiente: **0**
- Tensão 98: **2** · Pulso 112: **2** · Alerta: **0** · Temperatura 38,4: **1**
- **Total: 9**, risco alto: resposta de emergência

> Mesmo acordada e a falar, a doente está a deteriorar. Avise o médico de imediato com SBAR, repita o ABCDE, ponha oxigénio e acesso venoso e inicie monitorização contínua. Pense em sépsis, hemorragia e complicações da cirurgia.

Limites da NEWS2

- Não se aplica a crianças nem a grávidas
- Doentes com beta-bloqueadores podem não ter taquicardia
- Jovens e atletas compensam durante muito tempo e deterioram depressa
- Em hipercapnia, a escala 1 de SpO_2 pode levar a excesso de oxigénio
- Uma pontuação baixa **não exclui** preocupação clínica

Erros frequentes

- Medir os sinais vitais e não os registar
- Não somar a pontuação
- Atrasar o pedido de ajuda por esperar «mais uma medição»
- Não aumentar a frequência das observações
- Usar a escala 2 de SpO_2 sem indicação clínica
- Esquecer a confusão nova

Pontos-chave

1. A NEWS2 soma 7 parâmetros, de 0 a 3 pontos cada
2. Qualquer parâmetro com 3 pontos exige revisão urgente
3. 5 a 6: resposta urgente; 7 ou mais: emergência
4. Confusão nova vale 3 pontos
5. Comunique com SBAR e registe a quem avisou
6. A escala apoia o julgamento clínico, não o substitui

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Já viu um doente deteriorar «sem avisar»? Que sinais precoces se perderam?

? Como pediria ajuda se achasse que ninguém o ia levar a sério?

? Que ritmo de observações é realista no seu serviço?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ NEWS2: escala de alerta precoce

→ Sinais vitais: valores de referência no adulto

→ Avaliação primária ABCDE

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser