KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Sinais vitais e interpretação

Tensão arterial

Aula 3 de 5 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Tensão arterial

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Técnica de medição, escolha da braçadeira, classificação e erros comuns.

A tensão arterial (TA) exprime-se em mmHg, com dois valores: a sistólica (quando o coração contrai) e a diastólica (quando relaxa). É um dos sinais vitais mais afectados pela técnica: uma braçadeira errada ou um doente agitado mudam o resultado.

Nesta aula aprende a medir correctamente, a classificar os valores e a evitar…

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. O que mede a tensão arterial
3. Preparar o doente
4. Escolher a braçadeira
5. Técnica passo a passo
6. Classificação da TA no adulto
7. Hipertensão: o que fazer
8. Hipotensão: o que fazer
9. Erros frequentes de medição
10. Medir nos dois braços e na posição de pé
11. Caso: tonturas ao levantar
12. Caso: resolução
13. Pontos-chave
14. Para reflectir
15. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Explicar a tensão sistólica e a diastólica
2. Escolher a braçadeira adequada ao braço
3. Medir a TA com técnica correcta
4. Classificar os valores e reconhecer hipotensão e crise hipertensiva
5. Evitar os erros de técnica mais comuns

O que mede a tensão arterial

- **Sistólica:** pressão nas artérias quando o coração **contrai**
- **Diastólica:** pressão quando o coração **relaxa** e enche
- Escreve-se **sistólica/diastólica**: por exemplo **120/80 mmHg**

Depende do débito cardíaco, do volume de sangue e da resistência das artérias.

Preparar o doente

Para um valor fiável, 5 minutos antes:

- Doente **sentado**, costas apoiadas, pés no chão, pernas sem cruzar
- **Repouso** de cerca de 5 minutos, sem falar
- Bexiga vazia
- Sem café, tabaco ou exercício nos 30 minutos anteriores
- Braço apoiado **ao nível do coração**
- Roupa afastada: nunca meça sobre a manga

Escolher a braçadeira

Parâmetro	Regra
Largura	Cerca de **40% do perímetro** do braço
Comprimento	Cerca de **80%** da circunferência
Braçadeira pequena	Valores **falsamente altos**
Braçadeira grande	Valores **falsamente baixos**

Utilize braçadeira para obeso, criança ou braço fino quando necessário.

Técnica passo a passo

1

Lave as mãos, explique e posicione o doente

2

Coloque a braçadeira 2 a 3 cm acima da prega do cotovelo, com a marca sobre a artéria

3

Insufle e esvazie conforme o aparelho (manual ou automático)

4

Leia sistólica e diastólica

5

Espere 1 a 2 minutos antes de repetir

6

Registe valor, braço, posição do doente e hora

Classificação da TA no adulto

Categoria	Sistólica / Diastólica (mmHg)
Normal	Abaixo de 120 / abaixo de 80
Elevada	120 a 139 / 80 a 89
Hipertensão	140 ou mais / 90 ou mais, **confirmada** em medições repetidas
Crise hipertensiva	180 ou mais / 120 ou mais
Hipotensão	Abaixo de 90 / 60, sobretudo com sintomas

Atenção: as classificações variam um pouco entre guias; siga sempre o protocolo da sua instituição.

Hipertensão: o que fazer

- Um valor isolado elevado **não** confirma hipertensão: repita a medição
- Procure factores: dor, ansiedade, cafeína, braçadeira pequena
- **Crise** (≥ 180/120): comunique de imediato; vigie sintomas (cefaleia intensa, dor no peito, visão turva, confusão)
- Incentive adesão ao tratamento, menos sal, actividade física e controlo do peso
- Nunca suspenda a medicação sem indicação

Hipotensão: o que fazer

Sinais de alerta com TA baixa:

- Tonturas, visão turva, desmaio
- Pele fria e pegajosa, palidez
- Pulso rápido e fraco, FR aumentada
- Confusão, pouca urina

Actue: deite o doente com as pernas elevadas, **comunique de imediato**, repita a medição e avalie as outras constantes. Pode ser sinal de **choque**.

Erros frequentes de medição

Erro	Efeito
Braço abaixo do nível do coração	Valor falsamente alto
Falar durante a medição	Valor alto
Braçadeira pequena	Valor alto
Pernas cruzadas	Valor alto
Roupa apertada no braço	Valor errado
Medir logo após esforço	Valor alto
Esvaziar demasiado depressa (manual)	Valor impreciso

Medir nos dois braços e na posição de pé

- Na **primeira avaliação**, meça nos dois braços e use o de **valor mais alto** depois
- Diferença de **mais de 15 mmHg** entre braços pode indicar doença vascular
- Em doentes com tonturas, medir deitado, sentado e de pé (**hipotensão ortostática**): queda de 20 mmHg na sistólica ou 10 na diastólica ao levantar
- Em doentes com arritmia, os aparelhos automáticos podem errar

Caso: tonturas ao levantar

Um homem de 78 anos, com diarreia há 2 dias, queixa-se de tonturas ao levantar-se. Sentado, TA 100/60 mmHg e pulso 96. De pé, TA 82/50 mmHg e pulso 118.

> **Pense antes de avançar:** o que significam estes valores?

Caso: resolução

1. Queda da TA ao levantar com subida do pulso: **hipotensão ortostática**, provavelmente por **desidratação**
2. Deite-o com as pernas elevadas e **comunique** ao médico
3. Ofereça líquidos por via oral se consciente e se não houver contra-indicação
4. Siga a prescrição de fluidos, se houver
5. **Previna quedas:** ajude-o a levantar-se devagar
6. Registe os valores, a posição e a resposta; reavalie

Pontos-chave

1. Sistólica = contracção; diastólica = relaxamento
2. Repouso de 5 minutos, braço ao nível do coração
3. Braçadeira com cerca de 40% do perímetro do braço
4. Hipertensão confirma-se com medições repetidas
5. Hipotensão com sintomas pode ser choque
6. Em dúvida, repita a medição

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Que braçadeiras existem no seu serviço e quando usa a de obeso?

? Como explica a um doente que não deve falar durante a medição?

? Que sinais de alarme o fariam chamar de imediato o médico?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Valores de referência no adulto

→ Caso clínico: insuficiência cardíaca aguda

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser