

**Problem 1.**


**Solution.**  $f = \mathcal{O}(x^{-2})$ .

$$|f(x)| = \left| \frac{100}{x^6} - \frac{10}{x^2} \right| \leq \frac{100}{x^6} + \frac{10}{x^2}.$$

Since  $x^6 > x^2$  (equivalently  $x^{-6} < x^{-2}$ ) for  $x > 1$ . Choosing  $R = 1$ , we obtain

$$|f(x)| \leq \frac{100}{x^2} + \frac{10}{x^2} = 110x^{-2}.$$

We see that  $C = 110$  is a valid choice.



(Vertical line showing  $R = 1$ )

**Problem 2.**

**Solution.**

$$D_h(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{2 \sin(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) - 2 \sin(\frac{\pi}{3})}{\frac{\pi}{6}} \approx 0.511745,$$

$$\hat{D}_h(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \frac{2 \sin(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}) - 2 \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6})}{2 \times \frac{\pi}{6}} \approx 0.954930.$$

$$f'(x_0) = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1, \quad f''(x_0) = -2 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}, \quad f'''(x_0) = -2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = -1.$$

$$e_h = |D_h(x_0) - f'(x_0)| \approx 0.488255 > \frac{|f''(x_0)|}{2} h \approx 0.453450.$$

$$\hat{e}_h = |\hat{D}_h(x_0) - f'(x_0)| \approx 0.045070 < \frac{|f'''(x_0)|}{6} h^2 \approx 0.045693.$$