

ગુજરાતમાં આંબાની આધુનિક અને વૈજ્ઞાનિક ખેતી

ઉત્પાદન, પોષણ, રોગ નિયંત્રણ, સ્માર્ટ ટેકનોલોજી, લણણી, FPO નિર્માણ, તાલીમ અને નિકાસની સંપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા

ગુજરાતના પ્રગતિશીલ, નાના અને સીમાંત ખેડૂતો માટે વિશેષ સંકલિત અહેવાલ

પ્રસ્તાવના: ગુજરાતમાં ગીર, જૂનાગઢ અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર પંથકની ગીર કેસર તેમજ વલસાડ અને નવસારી વિસ્તારની હાફસ (Alphonso) કેરીઓ સમગ્ર વિશ્વમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. મોટાભાગના ખેડૂતો પાસે ૧ થી ૩ હેક્ટર જેટલી સીમિત જમીન છે. આ નાના ખેડૂતો જૂની પરંપરાગત રીતો છોડીને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ, સેન્સર આધારિત સ્માર્ટ સિંચાઈ, ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપન, સરકારી તાલીમ અને સહકારી મંડળી (FPO) મોડેલ અપનાવીને નિકાસલક્ષી ગુણવત્તા અને બમણો નફો મેળવી શકે છે.

૧. નવા અને જૂના બગીચાનું આધુનિક વ્યવસ્થાપન

૧.૧ ઘનિષ્ઠ વાવેતર પદ્ધતિ (High-Density Planting - HDP)

પરંપરાગત વાવેતરમાં બે આંબા વચ્ચે ૧૦x૧૦ મીટર (૩૦ થી ૪૦ ફૂટ) અંતર રાખવામાં આવતું, જેમાં એક એકરમાં માત્ર ૨૫ થી ૩૦ ઝાડ જ સમાતા હતા. HDP પદ્ધતિમાં જમીન અને સૂર્યપ્રકાશનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ થાય છે:

- વાવેતર અંતર:** ૧૫x૧૫ ફૂટ (૫x૫ મીટર) અથવા ૧૦x૧૦ ફૂટ (૩x૩ મીટર) ના અંતરે વાવેતર કરવાથી એક એકરમાં **૨૦૦ થી ૬૦૦ છોડ** (હેક્ટર દીઠ આશરે ૪૦૦ છોડ) વાવી શકાય છે.
- ખાડા તૈયાર કરવા:** મે માસમાં ૧x૧x૧ મીટર માપના ખાડા કરી ઉનાળાના તાપમાં તપવા દેવા. વાવેતર પહેલાં દરેક ખાડામાં ૨૦ કિલો દેશી છાણિયું ખાતર, ૧ કિલો સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ (SSP) અને લીમડાની ખોળ સારી રીતે ભેળવીને ભરી દેવા.
- વાવેતરનો શ્રેષ્ઠ સમય:** ચોમાસાની શરૂઆતમાં (જુલાઈ માસમાં) પ્રથમ સારો વરસાદ પડ્યા બાદ પ્રમાણિત કલમનું વાવેતર કરવું.
- કેનોપી મેનેજમેન્ટ (છાંટણી / Pruning):** આ પદ્ધતિમાં ઝાડની ઊંચાઈ ૮ થી ૧૦ ફૂટથી વધવા દેવામાં આવતી નથી. દર વર્ષે કેરી ઉતાર્યા પછી તરત જ સુકાયેલી, રોગિષ્ઠ અને અંદર જતી ડાળીઓની વ્યવસ્થિત છાંટણી કરવામાં આવે છે.
- મુખ્ય ફાયદા:** ત્રીજા વર્ષથી ઉત્પાદન શરૂ થાય છે. ઝાડ નીચા હોવાથી દવાનો છંટકાવ, ફુટ બેગિંગ અને લણણી સરળ બને છે તથા સૂર્યપ્રકાશ છેક થડ સુધી મળવાથી ફળની સાઈઝ અને રંગ ઉત્તમ બને છે.

૧.૨ જૂના બગીચાનું નવિનીકરણ (Top Working & Canopy Management)

જો બગીચો ૨૦-૩૦ વર્ષ જૂનો હોય, દેશી જાતો હોય કે ઉત્પાદન ઘટી ગયું હોય, તો તેને મૂળમાંથી કાપી નાખવાને બદલે નીચે મુજબ નવજીવન આપી શકાય છે:

- કેનોપી રીજુવેનેશન:** મોટા ઝાડની વચ્ચેની બિનઉત્પાદક ડાળીઓ કાપી મધ્ય ભાગ સૂર્યપ્રકાશ માટે ખુલ્લો કરવો. આનાથી ફૂલના ઉપદ્રવમાં ઘટાડો થાય છે અને ફળની સાઈઝ વધે છે.
- ટોપ વર્કિંગ (Top Working):** બિનઉત્પાદક ઝાડના મુખ્ય થડને જમીનથી ૬ થી ૮ ફૂટ ઊંચાઈએથી કાપી નાખવું. થોડા સમયમાં ફૂટતી નવી તંદુરસ્ત કૂંપળો પર કેસર કે હાફસ જેવી ઉત્તમ જાતની નવી કલમ બાંધવી. માત્ર ૨ થી ૩ વર્ષમાં ઝાડ ફરીથી મબલખ ઉત્પાદન આપતું થઈ જાય છે.

૨. સ્માર્ટ સિંચાઈ, પોષણ અને ડિજિટલ ટેકનોલોજી

૨.૧ ટપક સિંચાઈ (Drip Irrigation) અને વોટર સ્ટ્રેસ

- વોટર સ્ટ્રેસ (Water Stress):** શિયાળામાં મોર (ફૂલ) આવતા પહેલાં ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં ઝાડને પિયત બંધ કરીને પાણીની ખેંચ આપવી અનિવાર્ય છે. આનાથી ઝાડમાં વનસ્પતિ વૃદ્ધિ અટકે છે અને મોર ફૂટવાની પ્રક્રિયા ઉત્તેજિત થાય છે. ટપક પદ્ધતિથી આ નિયંત્રણ સરળતાથી થાય છે.
- ફર્ટિગેશન (Fertigation):** મોર ખીલ્યા બાદ અને ફળ બંધાવાના તબક્કે ડ્રીપ મારફતે દ્રાવ્ય પોષકતત્ત્વો (ખાસ કરીને **ઝીંક અને બોરોન**) સીધા મૂળમાં આપવાથી ફળ ખરતા અટકે છે અને વિકાસ ઝડપી બને છે.

૨.૨ સ્માર્ટ સેન્સર, હવામાન એપ્સ અને એગ્રી-ડ્રોન

૧. IoT સોઇલ મોઇશ્ચર સેન્સર:

જમીનમાં લગાવેલ સેન્સર ભેજનું લેવલ માપી મોબાઇલ પર એલર્ટ મોકલે છે. વોટર સ્ટ્રેસ અને જરૂરિયાત મુજબના પિયત માટે અત્યંત ઉપયોગી.

૨. હવામાન આગાહી (Meghdoot App):

તાપમાન અને ભેજ વધતાં 'મધિયો' કે 'ભૂકી છારો' આવવાની શક્યતા રહે છે. એપની આગોતરી આગાહીથી ખેડૂત સમયસર નિવારક છંટકાવ કરી શકે છે.

૩. એગ્રી-ડ્રોન (Agri-Drones) દ્વારા છંટકાવ: મોટા અને ઊંચા જાડ પર ટ્રેક્ટરથી દવા છાંટવામાં દવા અને પાણીનો મોટો બગાડ થાય છે. એગ્રી-ડ્રોન દ્વારા માત્ર ૧૦ મિનિટમાં ૧ એકર વિસ્તારમાં એકસરખો સચોટ છંટકાવ શક્ય બને છે. FPO મારફતે ડ્રોન વસાવી સભ્યોને રાહત દરે ભાડે આપી શકાય છે.

૩. આંબાની ખેતીનું વાર્ષિક કેલેન્ડર (Annual Farm Calendar)

માસ (મહિનો)	મુખ્ય ખેતી કાર્યો અને સમયબદ્ધ માવજત
જૂન - જુલાઈ	ચોમાસાનું આગમન. નવા HDP વાવેતર માટે શ્રેષ્ઠ સમય. કાપણી બાદ તરત જ જૂના જાડની છાંટણી (પ્રુનિંગ) કરવી. કટિંગ વાળા ભાગો પર ફૂગ ન લાગે તે માટે બોર્ડો મિશ્રણ / પેસ્ટ લગાવવી.
ઓગસ્ટ - સપ્ટેમ્બર	જાડમાં નવી ફૂટ (વેજીટેટીવ ગ્રોથ) આવશે. નીંદણ નિયંત્રણ કરવું. જાડ દીઠ પૂરતું દેશી છાણિયું ખાતર અને જરૂરી રાસાયણિક/જૈવિક ખાતરો આપવા.
ઓક્ટોબર - નવેમ્બર	વોટર સ્ટ્રેસ (પાણીની ખંચ): ટપક સિંચાઈ બંધ કરી જમીનમાં ભેજ ઘટાડવો જેથી મોર આવવાની ઉત્તેજના મળે. થડ પર જમીનથી ૨-૩ ફૂટ ઊંચાઈએ ગ્રીસ વાળી પ્લાસ્ટિક પટ્ટી (સ્ટીકી બેન્ડ) લગાવવી જેથી મિલીબગ યડતા અટકે.
ડિસેમ્બર - જાન્યુઆરી	મોર (ફૂલ) આવવાની શરૂઆત. મધિયા (Hopper) અને ભૂકી છારાનું સતત નિરીક્ષણ કરી જરૂરી દવાનો છંટકાવ કરવો. ૫૦% ફૂલ ખીલે ત્યારે હળવી સિંચાઈ શરૂ કરવી.
ફેબ્રુઆરી - માર્ચ	ફળ બંધાવવાની શરૂઆત (લખોટી/લીંબુ કદ). ટપક દ્વારા પૂરતું પાણી અને ફર્ટિગેશન ચાલુ રાખવું. ફળમાખી માટે ફેરોમોન ટ્રેપ લગાવવા અને નિકાસ ગુણવત્તા માટે ફ્રુટ બેગિંગ શરૂ કરવું.
એપ્રિલ - મે	ફળનો વિકાસ અને પરિપક્વતા. નિયમિત પિયત આપવું. કેરી ૮૦-૮૫% પાકટ થાય ત્યારે 'નુતન મેંગો હાર્વેસ્ટર' થી ડીટડા સાથે સાવચેતીપૂર્વક કાપણી કરવી.

૪. સંકલિત રોગ-જીવાત નિયંત્રણ અને કુદરતી રક્ષણ

૪.૧ મુખ્ય જીવાતો અને રોગોનું નિયંત્રણ

- મધિયો (Mango Hopper):** મોર અને નવી કૂંપળોમાંથી રસ ચૂસે છે અને મધ જેવો ચીકણો પદાર્થ કાઢે છે, જેના પર કાળી ફૂગ (Meliola) જામે છે.
ઇલાજ: મોર આવવાના સમયે ઈમિડાક્લોપ્રીડ (Imidacloprid 17.8 SL) ૩ મિ.લી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં અથવા જૈવિક ઇલાજ માટે લીમડાનું તેલ (Neem oil 10,000 ppm) ૩૦ મિ.લી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં છાંટવું. ફળ બંધાય ત્યારે થાયોમેથોક્સામ (Thiamethoxam 25 WG) ૧ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં છાંટવું.
- મિલીબગ (Mealybug):** સફેદ ૩ જેવા આવરણવાળી જીવાત જે જમીનમાં ઈંડા મૂકે છે અને શિયાળામાં બચ્યા થડ મારફતે ઉપર ચડી રસ ચૂસે છે. સૌથી સચોટ ઇલાજ: નવેમ્બરમાં જમીનથી ૨-૩ ફૂટ ઊંચે થડ પર અડધો ફૂટ પહોળી પ્લાસ્ટિક પટ્ટી બાંધી ગ્રીસ (Grease) લગાવી સ્ટીકી બેન્ડ બનાવવું. ઉપર ચડી ગયેલ જીવાત માટે પ્રોફેનોફોસનો છંટકાવ કરવો.
- ફળમાખી (Fruit Fly):** પાકા ફળમાં ડંખ મારી અંદર ઈંડા મૂકે છે જેથી ઈંચળો થવાથી કેરી સડી જાય છે.
ઇલાજ: માર્ચ માસમાં એકરે ૪ થી ૬ રક્ષક ફેરોમોન ટ્રેપ (Pheromone Traps) લટકાવવા અને ફ્રુટ બેગિંગ કરવું.
- ભૂકી છારો (Powdery Mildew):** મોર અને પાન પર સફેદ પાવડર છાંટ્યો હોય તેવી ફૂગ છવાય છે અને ફૂલ ખરી પડે છે.
ઇલાજ: હેક્ઝાકોનાઝોલ (Hexaconazole 5% EC) ૫ મિ.લી. પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં અથવા દ્રાવ્ય સલ્ફરનો છંટકાવ કરવો.

ફ્રુટ બેગિંગ (Fruit Bagging):

કેરી લખોટી જેવડી થાય ત્યારે ખાસ બ્રાઉન પેપર અથવા નોન-વોવન બેગ ચડાવવી. ફળમાખી, સૂર્યના તાપ અને કમોસમી વરસાદ સામે ૧૦૦% રક્ષણ મળે છે, કેમિકલ રેસિડ્યુ મુક્ત રહે છે અને રંગ આકર્ષક બને છે.

પવન રક્ષક વૃક્ષો (Windbreak Trees):

સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વાવાઝોડા અને તેજ પવનથી કેરી ખરતી અટકાવવા સરહદ પર સરુ (Casuarina) અથવા નીલગીરીના ઊંચા વૃક્ષોની વાડ કરવી.

પ. વૈજ્ઞાનિક કાપણી અને લણણી પછીની માવજત (Post-Harvest Management)

ભારતમાં અંદાજે ૨૫-૩૦% કેરી લણણી અને સંગ્રહના અભાવે બગડે છે. વૈજ્ઞાનિક ગુણવત્તા માટે નીચેના ૪ પગલાં અનિવાર્ય છે:

- સાચી કાપણી પદ્ધતિ (Harvesting):** કેરી ૮૦-૮૫% પાકટ થાય ત્યારે જ ઉતારવી. ફળ પાકટ છે કે નહીં તે ચકાસવા સામાન્ય પાણીમાં નાખતાં તે ડૂબી જવું જોઈએ (વિશિષ્ટ ઘનતા ૧.૦૧ થી ૧.૦૨). ડાળી હલાવી કેરી પાડવાને બદલે 'નુતન મેંગો હાર્વેસ્ટર' થી ૮ થી ૧૦ મિ.મી. લાંબી ડાળી (ડીટસી) સાથે જ કાપવી, જેથી રસ વહીને ફળ પર ડાઘ (Latex Burn) ન પડે.
- ડી-સેપિંગ (Desapping):** ફળ તોડ્યા પછી તરત જ જાળીદાર ટ્રે (Desapping Rack) પર ડીટસીનો ભાગ નીચે રહે તેમ ૩૦ થી ૪૫ મિનિટ ગોઠવી દેવી, જેથી બધો જ ચીક નીચે ટપકી જાય અને ફળ ડાઘરહિત રહે.
- ગરમ પાણીની માવજત (Hot Water Treatment - HWT):** નિકાસ માટે આ પ્રક્રિયા ફરજિયાત છે. ફળોને ૫૨°C તાપમાનવાળા ગરમ પાણીમાં ૧૦ મિનિટ ડૂબાડવામાં આવે છે. આનાથી ફળમાખીના ઈંડા અને એન્ટ્રેકનોઝ (ફૂગ) નાશ પામે છે.
- ગ્રેડિંગ અને પેકેજિંગ:** ખરાબ ફળો અલગ કરી ઝજન-કદ પ્રમાણે A, B, C ગ્રેડિંગ કરવું. નિકાસ માટે હવાઉજાસ વાળા સીએફબી (CFB - Corrugated Fibre Board) બોક્સમાં પેકિંગ કરવું.

ક. સંગ્રહ અને પકવવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓ (Storage & Ripening)

પ્રક્રિયા	પરંપરાગત રીત (નુકસાનકારક)	આધુનિક વૈજ્ઞાનિક રીત (લાભદાયી)
ફળ પકવવું (Ripening)	કેલ્શિયમ કાર્બાઇડનો ઉપયોગ (કેન્સરકારક, અસમાન પાકે, સ્વાદ બગાડે, ગેરકાયદેસર અને પ્રતિબંધિત).	ઇથિલીન રાઇપનિંગ એમ્બર: ૧૦૦ ppm ઇથિલીન ગેસનો ૨૪-૪૮ કલાક ઉપયોગ. ફળ કુદરતી રીતે, એકસરખું, સલામત અને સ્વાદિષ્ટ પાકે છે.
સંગ્રહ (Cold Storage)	ખુલ્લામાં કે ઓરડામાં સંગ્રહ (આયુષ્ય માત્ર ૪ થી ૬ દિવસ).	૧૨°C થી ૧૩°C તાપમાને કોલ્ડ સ્ટોરેજ: ૨ થી ૩ અઠવાડિયા સુધી તાજું રહે છે. (નોંધ: ૧૦°C થી નીચું તાપમાન ન રાખવું, અન્યથા ફળને ચિલિંગ ઇન્જરી થાય છે).

ગ. સહકારી ખેતી (FPO નિર્માણ, શેર વહેંચણી અને સંચાલન)

ગ.૧ FPO ની સ્થાપના અને રચના પ્રક્રિયા (Step-by-Step)

નાના અને સીમાંત ખેડૂતો એકલા હાથે પેક-હાઉસ, ઢાલ્લો સ્ટોરેજ કે એક્સપોર્ટ કરી શકતા નથી. આ માટે FPO (Farmer Producer Organization) એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે:

- પ્રમોટર્સ જૂથ:** વિસ્તારના ૧૦ પ્રગતિશીલ ખેડૂતો ભેગા મળીને પ્રમોટર/ડિરેક્ટર બને છે.
- કંપની રજીસ્ટ્રેશન:** ભારત સરકારના કંપની એક્ટ (Company Act) હેઠળ FPC (ખેડૂત ઉત્પાદક કંપની) તરીકે સત્તાવાર રજીસ્ટ્રેશન થાય છે (CA ની મદદથી ROC માં નોંધણી).
- સભ્ય ખેડૂતોની ભરતી:** શરૂઆતમાં ૧૦૦ થી ૩૦૦ (અને બાદમાં ૫૦૦+) સ્થાનિક ખેડૂતોને શેરહોલ્ડર સભ્ય બનાવવામાં આવે છે.

ગ.૨ શેર વહેંચણી અને સરકારી ઇક્વિટી ગ્રાન્ટ (Share Distribution & Equity Grant)

- શેર વહેંચણી (Share Capital):** પ્રત્યેક ખેડૂત સભ્ય બનવા માટે નિશ્ચિત શેર રકમ (દા.ત. ₹૧,૦૦૦ અથવા ₹૫,૦૦૦) ભરે છે, જેના બદલામાં કંપની તેમને કાનૂની શેર સર્ટિફિકેટ આપે છે.

- **ઈક્વિટી ગ્રાન્ટ (સરકારી સહાય):** ભારત સરકાર (SFAC / NABARD) ની યોજના હેઠળ ખેડૂતો જેટલી શેરમૂડી એકઠી કરે છે, તેટલી જ સામે સરકાર મેચિંગ ઈક્વિટી ગ્રાન્ટ (મહત્તમ ₹૧૫ લાખ સુધી) કંપનીના ખાતામાં જમા કરે છે! આ રકમ પાછી ચૂકવવાની હોતી નથી અને તેનાથી કંપની વર્કિંગ કેપિટલ ઊભી કરી શકે છે.
- **નફાની વહેંચણી (Dividend):** કંપની સિઝનના અંતે જે ચોખ્ખો નફો કરે છે, તે તમામ ખેડૂત શેરધારકોને તેમના શેર અને વેચેલા માલના આધારે ડિવિડન્ડ (લાભાંશ) સ્વરૂપે વહેંચવામાં આવે છે.

સફળતાનું મોડેલ: સૌરાષ્ટ્ર-ગીરનું FPO ઉદાહરણ (તાલાલા-મેંદરડા)

તાલાલા અને મેંદરડા વિસ્તારના ૩૦૦ થી વધુ નાના આંબાના ખેડૂતોએ ભેગા મળીને ₹૫૦૦૦ શેરફાળો આપી FPC બનાવી. ભારત સરકારની ઈક્વિટી ગ્રાન્ટ અને બાગાયત ખાતાની સબસિડીથી પોતાનો કોમન હોટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને ગ્રેડિંગ લાઈન શરૂ કરી. જે કેરી પહેલા વચેટિયાઓને ₹૪૦/કિલોમાં વેચવી પડતી હતી, તે જ કેરી મંડળીએ પ્રોસેસ કરી, બ્રાન્ડિંગ સાથે યુકે (UK) અને ખાડી દેશોમાં એક્સપોર્ટ કરી ખેડૂતોને ₹૬૦ થી ₹૧૦૦ પ્રતિ કિલો નો ભાવ અપાવ્યો!

૭.૩ નિકાસ માટેના ફરજિયાત ધોરણો (Export Readiness)

- **APEDA રજીસ્ટ્રેશન:** નિકાસ માટે ખેડૂતે કે FPO એ APEDA માં નોંધણી કરાવવી ફરજિયાત છે.
- **ફાઇટોસેનિટરી પ્રમાણપત્ર (Phytosanitary Certificate):** ફળમાં કોઈ ફળમાખી કે રોગ નથી તેનું સરકારી પ્રમાણપત્ર લેવું.
- **હોટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ (HWT):** માન્ય પેકહાઉસમાં ૫૨°C તાપમાને ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી.

૮. સરકારી સબસિડી, ફ્રી તાલીમ અને પોર્ટલની વિગતો

૮.૧ વિનામૂલ્યે તાલીમ અને સ્ટીપેન્ડ યોજનાઓ (Free Training & Skill Development)

ગુજરાત સરકારના બાગાયત વિભાગ અને કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ દ્વારા આંબાની આધુનિક ખેતી, પ્રુનિંગ, કલમ બાંધવી (Grafting), રોગ નિયંત્રણ અને પ્રોસેસિંગ માટે સંપૂર્ણ મફત તાલીમ આપવામાં આવે છે:

- **કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રો (KVK):** જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી (JAU), નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી (NAU) અને આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી (AAU) સંચાલિત KVK કેન્દ્રો પર ટૂંકા અને લાંબા ગાળાની પ્રેક્ટિકલ તાલીમો નિ:શુલ્ક યોજાય છે.
- **બાગાયત તાલીમ કેન્દ્રો અને માળી તાલીમ:** જૂનાગઢ, નવસારી અને જિલ્લા કક્ષાના સરકારી બાગાયત કેન્દ્રો પર કેનોપી મેનેજમેન્ટ અને નર્સરી ડેવલપમેન્ટની તાલીમ અપાય છે.
- **રોજિંદા સ્ટીપેન્ડ સાથે તાલીમ (HRT Scheme):** બાગાયત ખાતાની યોજના હેઠળ ખેડૂતોને ફળ સંરક્ષણ અને વેલ્યુ એડિશનની ૨ થી ૫ દિવસની તાલીમ દરમિયાન પ્રતિ તાલીમાર્થી દૈનિક ₹૨૫૦ થી ₹૫૦૦ સુધીનું સ્ટાઈપેન્ડ (ભથ્થું) તેમજ મફત સાહિત્ય કિટ આપવામાં આવે છે.
- **ક્યાં ચેક કરવું અને અરજી કરવી?:** તાલીમ માટે ગુજરાત સરકારના અધિકૃત **iKhedut પોર્ટલ (ikhedut.gujarat.gov.in)** પર 'બાગાયતી યોજનાઓ' -> 'તાલીમ યોજનાઓ' માં જઈને સીધી ઓનલાઇન અરજી કરી શકાય છે અથવા નજીકના KVK કે જિલ્લા નાયબ બાગાયત નિયામકની કચેરીનો સંપર્ક કરી શકાય છે.

૮.૨ નાણાકીય સબસિડી અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સહાય

- **iKhedut પોર્ટલ (આઈ-ખેડૂત):** તમામ સબસિડી અને ખેડૂત કલ્યાણ યોજનાઓ માટેનું સિંગલ-વિન્ડો પોર્ટલ.
- **ટપક સિંચાઈ (GGRC):** નાના અને સીમાંત ખેડૂતોને ટપક સિંચાઈ બેસાડવા માટે ૭૦% થી ૯૦% સુધીની સબસિડી.
- **વાવેતર સહાય (NHM/SHM):** HDP નવીનીકરણ, ખાડા કરવા, કલમો ખરીદવા અને ટોપ વર્કિંગ માટે હેક્ટર દીઠ નિશ્ચિત આર્થિક સહાય.
- **એગ્રીકલ્ચર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફંડ (AIF):** FPO ને પેક-હાઉસ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, રાઇપનિંગ ચેમ્બર કે HWT પ્લાન્ટ સ્થાપવા બેંક લોન પર ૩% વ્યાજ માફી અને ₹૨ કરોડ સુધી ક્રેડિટ ગેરેંટી તથા પ્રોજેક્ટ કોસ્ટ પર ૩૫% થી ૫૦% કેપિટલ સબસિડી મળે છે.

"વૈજ્ઞાનિક માવજત, સ્માર્ટ ટેકનોલોજી, સરકારી તાલીમ અને FPO સંગઠન જ ગુજરાતના આંબા પકવતા ખેડૂતને સમૃદ્ધ અને આત્મનિર્ભર બનાવશે."