

物理源可以望远镜相消， 临界归一化却留下固定伸缩缺陷

本节检验相邻物理 annuli 是否像 martingale difference。未归一化源确实望远镜相消；进入 Navier–Stokes 临界坐标后，普通系数一差分变成带固定衰减的协变输运，持续基线不会消失。

状态 · 普通相邻差分捷径关闭；源侧平方函数保留

临界 transport law 与三组压力测试完成

版本 v0.70G · 2026-08-25

解析推导、精确证书与报告边界已封存

本节没有构造奇性或证明全局正则性

00 / EXACT DECISION

临界坐标中的相邻差分带有 n 依赖的 dilation factor

对 $c_j^{(n)} = r_j^{n+2} P_j^{(n)}$ 与 annular coefficient $h_j^{(n)}$ ，有

$$h_j^{(n)} = c_j^{(n)} - 2^{-(n+2)} c_{j-1}^{(n)}.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

Leray dissipation 控制源侧带权平方和

固定中心与固定源满足

$$\sum_j r_j^{2n+3} |J_j^{(n)}(x_0)|^2 \leq C_n \|\Omega\|_2^2, \quad \sum_j r_j^{-1} |h_j^{(n)}|^2 \leq C_n \|\Omega\|_2^2.$$

直接 Cauchy–Schwarz 仍需要核心零阶与一阶矩的负权重平方和；有限能量没有提供该对偶量。

$$\sum_j (r_j^{-3} |M_j^{(0)}|^2 + r_j^{-5} |M_j^{(1)}|^2) < \infty.$$

这一步改变了后续检查对象

结果把“望远镜恒等式成立”和“临界归一化后可用普通差分”分开，并把后续问题定位为核心矩的局部 Carleson 或配对变化估计。

证明到这里为止

结论使用固定源、固定滤波器与固定中心；physical cutoff 不是 Fourier LP projection。压力测试是初始面复现，没有共同正终点，也不证明 moving-shell packing。

这里没有构造有限时奇性，没有证明无条件全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.7oH 的检查点

Ro.7oH 推导核心矩在相邻滤波尺度和嵌套时间窗下的精确变化与对偶坐标。

报告、证书和可用的独立复核已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#) · [期刊附图包](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要档案中已经审计的声明；有限生产器不替代报告中的无限维解析步骤。