

Logiki nieklasyczne w informatyce

Szymon Wróbel

5 listopada 2019

Plan prezentacji

Wstęp

Logika intuicjonistyczna

Inne logiki nieklasyczne

Po co nam logika?

Po co nam logika?

Filozofowie: Poszukiwanie prawdy.

Po co nam logika?

Filozofowie: Poszukiwanie prawdy.

Lingwiści: Formalizacja znaczenia wypowiedzi.

Po co nam logika?

Filozofowie: Poszukiwanie prawdy.

Lingwiści: Formalizacja znaczenia wypowiedzi.

Matematycy: Systemy dowodzenia

Po co nam logika?

Filozofowie: Poszukiwanie prawdy.

Lingwiści: Formalizacja znaczenia wypowiedzi.

Matematycy: Systemy dowodzenia (lub z nudów).

Po co nam logika?

Filozofowie: Poszukiwanie prawdy.

Lingwiści: Formalizacja znaczenia wypowiedzi.

Matematycy: Systemy dowodzenia (lub z nudów).

Informatycy: Weryfikacja poprawności programów.

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja
- Wdrożenie

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja
- Wdrożenie

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja
- Wdrożenie

Projektowanie logiki

- Problem

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja
- Wdrożenie

Projektowanie logiki

- Problem
- Intuicja

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja
- Wdrożenie

Projektowanie logiki

- Problem
- Intuicja
- Składnia

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja
- Wdrożenie

Projektowanie logiki

- Problem
- Intuicja
- Składnia
- Semantyka

Powstawanie logiki

Projektowanie aplikacji

- Problem
- Pomysł
- Specyfikacja
- Implementacja
- Wdrożenie

Projektowanie logiki

- Problem
- Intuicja
- Składnia
- Semantyka
- Zastosowania

Dowody konstruktywne

Problem

Czy istnieją dwie liczby niewymierne a, b , takie, że a^b jest liczbą wymierną?

Dowody konstruktywne

Problem

Czy istnieją dwie liczby niewymierne a, b , takie, że a^b jest liczbą wymierną?

Dowód

Weźmy $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2}$. Rozważmy wymierność a^b . Jeśli jest wymierne, to dowód jest zakończony. Jeśli nie, weźmy

$$a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}, b = \sqrt{2}.$$

Wtedy

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}} \right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2} * \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$$



Dowody konstruktywne

Problem

Podaj dwie liczby niewymierne a, b , takie, że a^b jest liczbą wymierną?

Dowody konstruktywne

Problem

Podaj dwie liczby niewymierne a, b , takie, że a^b jest liczbą wymierną?

Pomimo tego, że udowodniliśmy istnienie tych liczb, nie możemy skorzystać z poprzedniego dowodu

Dowody konstruktywne

Dowód (v 2.0)

Weźmy $a = \sqrt{2}$, $b = 2 \log_2 3$.

Wtedy $a^b = \sqrt{2}^{(2 \log_2 3)} = 2^{\log_2 3} = 3$



Logika intuicjonistyczna

Prawdziwe jest to, na co mamy dowód.

Logika intuicjonistyczna

Interpretacja BHK

- Dowód $A \wedge B$ to dowód A i dowód B

Logika intuicjonistyczna

Interpretacja BHK

- Dowód $A \wedge B$ to dowód A i dowód B
- Dowód $A \vee B$ to dowód A albo dowód B

Logika intuicjonistyczna

Interpretacja BHK

- Dowód $A \wedge B$ to dowód A i dowód B
- Dowód $A \vee B$ to dowód A albo dowód B
- Dowód $A \rightarrow B$ to metoda przekształcająca dowód A , w dowód B

Logika intuicjonistyczna

Interpretacja BHK

- Dowód $A \wedge B$ to dowód A i dowód B
- Dowód $A \vee B$ to dowód A albo dowód B
- Dowód $A \rightarrow B$ to metoda przekształcająca dowód A , w dowód B
- Nie ma dowodu \perp

Dedukcja naturalna

Postać sekwentów

$$\Delta \vdash \Gamma$$

Dedukcja naturalna

Aksjomat

$$\frac{}{\Delta, P \vdash P} \text{Ass}$$

Dedukcja naturalna

Aksjomat

$$\frac{}{\Delta, P \vdash P} \text{Ass}$$

Implikacja

$$\frac{\Delta, A \vdash B}{\Delta \vdash A \rightarrow B} \rightarrow\text{I}$$

$$\frac{\Delta \vdash A \rightarrow B \quad \Delta \vdash A}{\Delta \vdash B} \rightarrow\text{E}$$

Dedukcja naturalna

Aksjomat

$$\frac{}{\Delta, P \vdash P} \text{Ass}$$

Implikacja

$$\frac{\Delta, A \vdash B}{\Delta \vdash A \rightarrow B} \rightarrow I$$

$$\frac{\Delta \vdash A \rightarrow B \quad \Delta \vdash A}{\Delta \vdash B} \rightarrow E$$

Koniunkcja

$$\frac{\Delta \vdash A \quad \Delta \vdash B}{\Delta \vdash A \wedge B} \wedge I$$

$$\frac{\Delta \vdash A \wedge B}{\Delta \vdash A} \wedge E_1$$

$$\frac{\Delta \vdash A \wedge B}{\Delta \vdash B} \wedge E_2$$

Dedukcja naturalna

Alternatywa

$$\frac{\Delta \vdash A}{\Delta \vdash A \vee B} \vee I_1 \qquad \frac{\Delta \vdash B}{\Delta \vdash A \vee B} \vee I_2$$
$$\frac{\Delta \vdash A \vee B \quad \Delta, A \vdash C \quad \Delta, B \vdash C}{\Delta \vdash C} \vee E$$

Dedukcja naturalna

Alternatywa

$$\begin{array}{c}
 \frac{\Delta \vdash A}{\Delta \vdash A \vee B} \vee I_1 \qquad \frac{\Delta \vdash B}{\Delta \vdash A \vee B} \vee I_2 \\
 \frac{\Delta \vdash A \vee B \quad \Delta, A \vdash C \quad \Delta, B \vdash C}{\Delta \vdash C} \vee E
 \end{array}$$

NI \Rightarrow *NK*

$$\frac{}{\Delta \vdash P \vee \neg P} \text{LEM} \qquad \frac{\Delta \vdash \neg \neg P}{\Delta \vdash P} \text{DNE} \qquad \frac{\Delta, \neg P \vdash \perp}{\Delta \vdash P} \text{PBC}$$

Przykład: $P \rightarrow \neg\neg P$

$$\vdash P \rightarrow (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp$$

Przykład: $P \rightarrow \neg\neg P$

$$\frac{P \vdash (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp}{\vdash P \rightarrow (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow\text{I}$$

Przykład: $P \rightarrow \neg\neg P$

$$\frac{\frac{P, (P \rightarrow \perp) \vdash \perp}{P \vdash (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow\text{I}}{\vdash P \rightarrow (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow\text{I}$$

Przykład: $P \rightarrow \neg\neg P$

$$\frac{\frac{\frac{P, (P \rightarrow \perp) \vdash (P \rightarrow \perp) \quad P, (P \rightarrow \perp) \vdash P}{P, (P \rightarrow \perp) \vdash \perp} \rightarrow E}{P \vdash (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow I}{\vdash P \rightarrow (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow I$$

Przykład: $P \rightarrow \neg\neg P$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{P, (P \rightarrow \perp) \vdash (P \rightarrow \perp)} \text{Ass} \quad \frac{}{P, (P \rightarrow \perp) \vdash P} \text{Ass} \\
 \hline
 \frac{}{P, (P \rightarrow \perp) \vdash \perp} \rightarrow\text{E} \\
 \frac{}{P \vdash (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow\text{I} \\
 \hline
 \frac{}{\vdash P \rightarrow (P \rightarrow \perp) \rightarrow \perp} \rightarrow\text{I}
 \end{array}$$

Logika liniowa

Przykład

Logika liniowa

Przykład

Niech P oznacza "mieć ciastko".

Logika liniowa

Przykład

Niech P oznacza "mieć ciastko".

Niech Q oznacza "zjeść ciastko".

Logika liniowa

Przykład

Niech P oznacza "mieć ciastko".

Niech Q oznacza "zjeść ciastko".

Jeśli mamy ciastko, to możemy je zjeść, co zapiszemy jako $P \rightarrow Q$

Logika liniowa

Przykład

Niech P oznacza "mieć ciastko".

Niech Q oznacza "zjeść ciastko".

Jeśli mamy ciastko, to możemy je zjeść, co zapiszemy jako $P \rightarrow Q$

Wtedy w logice intuicjonistycznej możemy udowodnić

$$P \rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow P \wedge Q.$$

Wniosek

Dzięki logice intuicjonistycznej możemy zjeść ciastko i mieć ciastko

Logika liniowa: składnia

Zmienne zdaniowe

$$p, p^\perp$$

Stałe

$$1, \perp, \top, 0$$

Koniunkcja

$$A \otimes B, A \& B$$

Alternatywa

$$A \wp B, A \oplus B$$

Logika liniowa: zastosowania

- Typy Liniowe jako kontrakt [Wad91]

Logika liniowa: zastosowania

- Typy Liniowe jako kontrakt [Wad91]
- Logika liniowa jako logika współbieżności/równoległości [Wad14]

Logika liniowa: zastosowania

- Typy Liniowe jako kontrakt [Wad91]
- Logika liniowa jako logika współbieżności/równoległości [Wad14]
- Powiązania z układami kwantowymi [Lag12], [Bae09]

Relevance Logic

Paraconsistent Logic

Computability Logic (CoL)

Bibliografia

- [Tho91] S. Thompson, *Type Theory and Functional Programming*, Addison-Wesley, 1991.
- [Pri08] G. Priest, *An Introduction to Non-Classical Logic: From If to Is*, Cambridge University Press, 2008.
- [Gen35] G. Gentzen, *Untersuchungen über das logische Schließen*, 1935.
- [Wad91] P. Wadler, *Is there a use for linear logic?*, 1991.
- [Wad14] P. Wadler, *Propositions as sessions*, Journal of Functional Programming, vol. 24, 2014.
- [Lag12] U. Dal Lago, C. Faggian, *On Multiplicative Linear Logic, Modality and Quantum Circuits*, Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, 2012
- [Bae09] J. Baez, M. Stay, *Physics, Topology, Logic and Computation: A Rosetta Stone*, 2009.