

Chapitre 25 : Déterminants

1 Groupe symétrique

1.1 Généralités

Définition 1.1. On appelle groupe symétrique sur $n \geq 1$ "lettres" le groupe $\gamma(n)$ des bijections $\llbracket 1, n \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$

Définition 1.2. Soit $\sigma \in \gamma(n)$

- * Un élément $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ est un point fixe de σ si $\sigma(i) = i$
- * Le support de σ est $\text{Supp}(\sigma) = \{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \sigma(i) \neq i\}$

Définition 1.3.

- * Une transposition est une permutation $\tau \in \gamma(n)$ dont le support est une paire $\{i, j\}$ (et qui échange i et j). On la note $\tau = (ij)$
On a $(ij) = (ji)$
- * Plus généralement, si $i_1, \dots, i_r \in \llbracket 1, n \rrbracket$ sont tous différents, on note $(i_1 i_2 i_3 \dots i_r)$ la permutation σ telle que

$$\begin{cases} \forall k \in \llbracket 1, r-1 \rrbracket, \sigma(i_k) = i_{k+1} \\ \sigma(i_r) = i_1, \text{ et } \forall j \notin \{i_1, \dots, i_r\}, \sigma(j) = j \end{cases}$$

Une telle permutation est appelée un r -cycle.

Théorème 1.4. Le groupe $\gamma(n)$ est engendré par les transpositions.

1.2 Décomposition en cycles disjoints

Théorème 1.5. Soit $\sigma \in \gamma(n)$

Il existe un entier $r \geq 0$ et des cycles $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ à supports disjoints tels que $\sigma = \gamma_r \circ \dots \circ \gamma_1$

En outre, cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

1.3 Signature d'une permutation

Théorème 1.6. Il existe un unique morphisme de groupes $\varepsilon : (\gamma(n), \circ) \rightarrow (\{\pm 1\}, \times)$ tel que, pour toute transposition $\tau \in \gamma(n)$, $\varepsilon(\tau) = -1$

(ce morphisme s'appelle la signature)

Lemme 1.7.

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}_2(\llbracket 1, n \rrbracket)} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}$$

Proposition 1.8. Soit $r \in \llbracket 2, n \rrbracket$ et $\sigma \in \gamma(n)$ un r -cycle.

Alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{r+1}$

Définition 1.9. On appelle groupe alterné $a(n)$ le noyau de la signature $a(n) = \{\sigma \in \gamma(n) \mid \varepsilon(\sigma) = 1\}$

2 Déterminant

Soit K un corps.

2.1 Déterminant d'une matrice carrée

Définition 2.1. Soit $A \in M_n(K)$

On définit son déterminant :

$$\det(A) = \sum_{\sigma \in \gamma(n)} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^n [A]_{\sigma(j)j}$$