

Mathematical Analysis Vol.1

@Souez3

22.11.2024

1 Билет 1

1.1 Последовательность

$f(n)$ - последовательность задана на множестве \mathbb{N} Когда каждому $n \in \mathbb{N}$ поставлено в соответствие некоторого закона $a(n) \in \mathbb{R}$, тогда говорят, что задана числовая последовательность a_n

Примеры: n -ый член арифметической прогрессии: $a_n = a_1 + \alpha(n - 1)$ геометрическая прогрессия: $b_n = b_1 * q^{(n - 1)}$

1.2 Предел числовой последовательности

Определение: Число A называют пределом числовой последовательности X_n , если $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) : \forall n > N(\epsilon)$ выполняется $|X_n - A| < \epsilon$

Определение: Сходящаяся последовательность - последовательность, которая имеет конечный предел

Определение: Расходящаяся последовательность - последовательность, которая имеет бесконечный предел либо предела не существует.

Последовательность ограничена, если $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N}$ выполняется $a_n \leq M$ (существует такое число M , что для любого номера последовательности все члены последовательности не превосходят это число по модулю.

2 Билет 2

2.1 Теорема о единственности предела последовательности

Теорема: Если у последовательности есть предел, то он единственный

Доказательство: Докажем от противного. Допустим существует 2 предела.

$$\square \lim_{x \rightarrow \infty} X_n = A \quad \square \lim_{x \rightarrow \infty} X_n = B, \text{ при этом } B \neq A \quad (1)$$

Тогда возьмем $\epsilon = (B - A)/3 > 0$, $(\epsilon_A \cap \epsilon_B) = \emptyset$

Следовательно

$$n > N \exists N_1 : \forall n > N \text{ выполняется } |X_n - A| < \epsilon \quad (2)$$

$\exists N_2 \forall n \geq N_2$ и тоже выполняется, что $|X_n - B| < \epsilon$ (3)

Тогда $|a - b| = |a - X_n + X_n - b| \leq |X_n - A| + |X_n - B| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon = \frac{2*|A-B|}{3}$, тогда получим $|A - B| \leq \frac{2}{3} * |B - A|$ Получим противоречие

3 Билет 3

Определение: Последовательность ограничена, если $\exists M > 0 : \forall b \in N$ выполняется $|a_n| \leq M$

Теорема об ограниченности сходящейся последовательности: Всякая сходящаяся последовательность ограничена!

Доказательство: $\square A = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \in R$, тогда и только тогда, когда $\forall \epsilon > 0 \exists N(\epsilon) \in \mathbb{N}$ такое что $\forall n \in \mathbb{N} : n > N(\epsilon)$ выполняется $|X_n - A| < \epsilon$ $\forall n > N(\epsilon) X_n \in (A - \epsilon; A + \epsilon)$ содержит конечное число x_1, x_2, \dots, x_k $\square m = \min X^-; A - \epsilon M = \max A - \epsilon; x^+$ Тогда на отрезке $[m; M]$ находятся $x_1, x_2, \dots, x_k (A - \epsilon; A + \epsilon) [m; M] x_n, \forall n \in \mathbb{N} x_n \leq M$

Примеры:

1)

$\lim_{n^2=1; \frac{1}{4}; \frac{1}{9}; \frac{1}{16} \dots} \frac{1}{n^2} = 0$ - ограничена сверху 2) $\frac{n^2}{n+1} = \frac{1}{2}; \frac{4}{3}; \frac{9}{4}; \frac{16}{5}; \dots$ $\lim_{n+1} \frac{n^2}{n+1} \geq \frac{1}{2}$ - ограничена снизу (4)

4 Билет 4

Арифметические операции над сходящимися последовательностями

$\square X_n; Y_n$ - две сходящиеся последовательности. Тогда $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = A; \lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = B$

Свойства 1) $X_n + Y_n; X_n * Y_n; \frac{X_n}{Y_n}$ - тоже сходящиеся последовательности. 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (X_n + Y_n) = A + B$ 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (X_n - Y_n) = A - B$ 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} (X_n * Y_n) = A * B$ 5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_n}{Y_n} = \frac{A}{B}$

Доказательство: 1) $\forall N > 0_0 : \forall n > N_0$ выполняется $|X_n - A| < \frac{\epsilon}{2}$ $\exists N_1 : \forall n > N_1$ выполняется $|Y_n - B| < \frac{\epsilon}{2}$ Пусть $N = \max(N_2; N_1), n > N \forall n > N (X_n + Y_n) - (A + B) = |X_n - A + Y_n - B| \leq |X_n - A| + |Y_n - B| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$

5 Билет 5

5.1 Понятие функции через последовательность

Если каждому $x \in X$ по некоторому закону поставлен в соответствии единственный y , то говорят что на множестве X задана функция f

$\forall x \in X \exists! y \in R : f(x) = y$ (5)

5.2 Предел функции в точке

Определение по Гейне: $\square f(x)$ - определена в некоторой проколотой окрестности точки x

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ если $\forall x_n \exists \dot{U}_{x_0} > 0$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - g(x) > 0 \Rightarrow f(x) - g(x) > 0$ по теореме если $f(x)$ имеет предел A и в окрестности (а) принимает значения больше нуля, то $A \geq 0$ (6)

5.3 Теорема о единственности предела

Если функция имеет предел в точке, то он единственный.

Доказательство от противного: $\square \exists X_n = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n = A$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = B, A \neq B; A, B \in R$
Возьмем $\epsilon_n \cap \epsilon_b \neq \emptyset$, тогда $|f(x) - A| < \frac{\epsilon}{2}; |f(x) - B| < \frac{\epsilon}{2} \Rightarrow |A - B| = |A - B + f(x) - f(x)| = |A - f(x) + f(x) - B| \leq |A - f(x)| + |B - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$ То есть получили $\forall \epsilon > 0 \rightarrow |A - B| < \epsilon$

6 Билет 6

6.1 Ограниченная функция

Определение: Последовательность ограничена, если $\exists M > 0 : \forall b \in N$ выполняется $|a_n| \leq M$

Определение: Функция называется ограниченной сверху на x если $\exists M : \forall x \in X$ выполняется $F(x) < M$, снизу соответственно $F(x) > M$

Определение: Теорема об ограниченности функции, имеющей предел (конечный) Если функция $f(x)$ определена в точке x_0 и имеет в точке конечный предел, то она ограничена в некоторой окрестности этой точки.

$$\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in \dot{U}(\delta),$$

$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \epsilon.$$

Пусть $\epsilon = 1$, тогда $\forall x \in \dot{U}(\delta)$:

$$|f(x) - A| < 1,$$

раскрыв модуль:

$$-1 < f(x) - A < 1.$$

Отсюда:

$$A - 1 < f(x) < A + 1 \implies f(x) \text{ ограничена.}$$

7 Билет 7

7.1 Арифметические действия с пределами функции

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = B.$$

Тогда:

1.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + \varphi(x)) = A + B.$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} C \cdot f(x) = C \cdot A, \quad \text{где } C = \text{const.}$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot \varphi(x)) = A \cdot B.$$

4. Если $B \neq 0$, то:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{A}{B}.$$

Условие: $\forall x \in \text{Dom}(\varphi) \quad \varphi(x) \neq 0$.

Доказательство: Арифметическое свойство предела (Сумма)

Условие

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{и} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = B.$$

Доказательство

По определению предела:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall \varepsilon_1 > 0 \exists \delta_1 > 0 : \forall x \in \dot{U}(\delta_1),$$

$$|x - x_0| < \delta_1 \implies |f(x) - A| < \varepsilon_1.$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = B \iff \forall \varepsilon_2 > 0 \exists \delta_2 > 0 : \forall x \in \dot{U}(\delta_2),$$

$$|x - x_0| < \delta_2 \implies |\varphi(x) - B| < \varepsilon_2.$$

Пусть $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, и $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Тогда:

$$|f(x) + \varphi(x) - (A + B)| = |f(x) - A + \varphi(x) - B| \leq |f(x) - A| + |\varphi(x) - B|.$$

Из условий следует:

$$|f(x) - A| < \varepsilon_1 \quad \text{и} \quad |\varphi(x) - B| < \varepsilon_2.$$

Таким образом:

$$|f(x) + \varphi(x) - (A + B)| < \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \varepsilon.$$

Вывод

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + \varphi(x)) = A + B.$$

Теорема о суперпозиции

1) $f(x)g(x): F(x) = F(f(g(x)))$

2) $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$

3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$

Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(f(g(x))) = B$$

8 Билет 8

Теоремы о пределах функции: о предельном переходе в неравенство

Рассмотрим неравенство:

$$a_n \leq b_n$$

Пусть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$. Тогда, если $a_n \leq b_n$ для всех n , то по свойству пределов:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

Следовательно:

$$A \leq B$$

Теорема о сжатой функции

Пусть $f(x)$, $g(x)$ и $h(x)$ — функции, определенные на множестве $E \subset \mathbb{R}$ и выполняется неравенство

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x),$$

и при этом

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = b,$$

то

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = b.$$

1 замечательный предел

Рассмотрим предел:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Доказательство:

Рассмотрим односторонние пределы и докажем, что они равны 1. Рассмотрим случай $x \rightarrow +0$. Отложим этот угол на единичной окружности так, чтобы его вершина совпадала с началом координат, а одна сторона совпадала с осью OX . Пусть A — точка пересечения второй стороны угла с единичной окружностью, а точка B — с касательной к этой окружности в точке A . Точка C — проекция точки A на ось OX . Очевидно, что:

$$S_{\triangle OAC} < S_{\text{сектора } OAC} < S_{\triangle OAB}$$

где S — площадь. Поскольку $|OC| = \cos x$, $|AC| = \sin x$, $|AB| = \tan x$, то:

$$\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2} < \frac{\tan x}{2}$$

Так как при $x \rightarrow +0$: $\sin x > 0$, $x > 0$, $\tan x > 0$:

$$\frac{1}{\tan x} < \frac{1}{x} < \frac{1}{\sin x}$$

Умножаем на $\sin x$:

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq$$

Переходя к пределу:

$$\lim_{x \rightarrow +0} \cos x \leq \lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

Так как $\lim_{x \rightarrow +0} \cos x = 1$, то:

$$\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Аналогично доказывается для $x \rightarrow -0$. Следовательно:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

9 Билет 9

Предел функции на бесконечности

Будем говорить, что на бесконечности функция $f(x)$ стремится к пределу A , если $\forall \varepsilon > 0 \exists X > M$ такое, что $|x| > X \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$.

10 Билет 10

Бесконечно большие функции.

Функция $f(x)$ называется бесконечно большой при $x \rightarrow x_0$, если

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 \text{ такое, что } 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$$

Пример: Функция $f(x) = \frac{1}{x}$ является бесконечно большой при $x \rightarrow 0$.