

まえがき

本日は「数学科展示 ますらぼ」にご来場いただき誠にありがとうございます。今年5月に東京大学本郷キャンパスで開かれた五月祭に引き続き、皆さんに数学と東大数学科について知ってもらいたくて、数学科展示ますらぼは駒場祭にも出展することを決めました。今回の冊子 *episode*(えピソード) は、vol 3.5 と題して発行され、またサブタイトルは「わたしのえピソード」と題しまして、数学科内定したばかりのの学部2年生、先日発表された数学講究XAに夢をふくらませる3年生、院試を終えたばかりの4年生、そしてこの企画が始まって以来ずっとコミットしてきた修士1年生という幅広い層の方たちに自分が好きなものとそのエピソードについて語ってもらいました。執筆者のみなさんには1ページから2ページで軽く書いてくれるだけで良いよと言っていたのですが、募集からわずか2週間というとても短い期間でみなさんこれだけたくさん内容を書いてくださり、またしても濃い内容の冊子が出来上がりました。数学科はこの駒場キャンパスの東の端にある数理科学研究棟で普段は活動していますが、皆さんからは“数理病棟”と呼ばれたり、他の学科の人に自分が今何を勉強しているのかを説明しようとするとうまく理解してもらえなかったりと周囲から距離を感じることがあります。しかし、数学というのはとてもシンプルにまた何に縛られることもなく物事にアプローチをする手段であり、数学をすることによって培われる技能というのは普遍的でこの分野に於いても通じるものであると私は信じていますし、その面白さは丁寧に話しあえば多くの人に理解してもらえるし、また他の分野と何か共通点があるものであると、この数学科展示ますらぼを通じて実感しています。この冊子を開くと数式や難しそうな言葉がたくさん並べてあって、“うわっ...” っと一歩引いてしまう方も沢山いらっしゃると思います。でも、そんな時は“この何が面白いんですか” や “何の役に立つんですか” といった質問でも良いので私たちに投げつけて見てください。きっと何か得るものはあると思います。(伊藤)

目 次

まえがき	i
ネイピア数 e について (伊藤)	1
割り算再考 (前多)	5
圏論が分かる 4 コマ漫画 (小林)	章間

ネイピア数 e について (伊藤)

はじめに

～「私のことは嫌いでも、 e のことは嫌いにならないでください！」～
国民的アイドルグループ EXP271 のとあるセンターの言葉

$e^{\pi i}$ sode(えびそど) という名前の冊子を先輩たちから私達が受け継いでから、はや1年半が経ちましたが、未だに「 $e^{\pi i}$ sode?これはなんて読むの?」と聞かれることも多いです。上記のような発言から察するに、 $e^{\pi i}$ にこめられた意味も理解されていないでしょう。そこで改めて、 e という数字について色々とお話をしたいと思います。

e という数字は**ネイピア数**と呼ばれ、日本語では自然対数の底とも呼ばれたりします。数なのでちゃんと値があって、 $e = 2.718281828459045235360287471352\dots$ という永遠につづく小数として表されます。ネイピア数という名前は、この数を初めて発表したジョン・ネイピア (John Napier) という数学者にちなんでつけられました。ネイピアがこの数を考案した1618年というのは、日本で言うと1615年は大阪夏の陣で徳川家康¹⁾と豊臣秀頼が合戦を繰り広げていた年ですし、ヨーロッパではまだ魔女狩りが勃発していたような時代です。万有引力の法則を発見したアイザック・ニュートンはまだ生まれてもいませんし、ビブン、セキブンという概念言葉すら生まれていません。何が言いたいのかと言いますと、「 e は数学だけの世界に出てくる小難しい数ではなく、誰でも理解できるような身近なもの」ということです。

ということで、出来るだけ皆さんに分かりやすい様に e についてお話をしたいと思います。もし本当は身近なはずの e がこの冊子を読んで、また遠くに感じられてしまったらそれは、 e が悪いのではなく、私が悪いのです。

身近な e

～「借りた金は忘れるな。貸した金は忘れろ。」～
田中角栄

e は身近なところから発生します。それは**金利**というところです。金利という概念は現代人にとってある意味遠い世界にあるものかもしれないので一度説明しておきます。例えば、あなたが銀行にいくらのお金を預けているとします。²⁾ そうすると、銀行は「私達の所にお金を預けてくれてありがとう」と言って年に何度か少しだけあなたの口座にお金を振り込んでおいてくれます。これを**利子**と言います。³⁾ ここで**金利 (利率)**という概念が発生します。金利とは、「あなたが銀行に預けているお金」と「利子」の比率を金利と言います。数式で書くと

$$\text{預金額} \times \text{金利} = \text{利子}$$

となります。⁴⁾

ここからは、簡単のために全て年利率を**1%**の場合にのみ限定して話をすすめましょう。

¹⁾ すごくどうでも良い話ですが、徳川家康を知らない日本では非常識人呼ばわりされますが、ネイピア数 e を知らない人に対して非常識だ!という石を投げる人はそこまでいいでしょう。残念です。

²⁾ ここで預けているという言葉を使うと、まるで厳重な鍵付きの金庫やロッカーにお金を置いてきたように聞こえますが、そのようなことはありません。銀行も企業とは言え、その銀行の中にいるのは人間ですので、あなたのお友達の家山田さんの家のタンスに「お金～万円預けるね。なくしたら承知しないよ。」と言ってお金を置いてきたのと、解釈によっては変わりはないのです。

³⁾ 今の日本の銀行の通常預金の金利は0.001%ぐらいです。つまり、100万円預けて置くと年に10円ほどもらえる事になります。

⁴⁾ ここまでの内容は、できれば読まなくても知っているぐらいのレベルであって欲しいです。

もし、この世に年率1%を謳う銀行がいくつかあったとしましょう。これらは、皆同じに見えますが、実は違う可能性があります。それは **年に何回利子が払われるかが分かっていない** ということです。例えば、

100万円につき、年に一度だけ、1万円の利息がもらえる。

という銀行と、

100万円につき、年に2度、5千円ずつ利息がもらえる

という銀行は1年というスパンで見れば、おなじ年利率1%の銀行です。しかし、ここで違ってくるのが**複利**という考え方です。

(ここに複利の図を入れたい) 複利とは、今までもらった利息を預金額に繰り入れて、利息を払ってくれる方式です。例えば、100万円を(利息年1回払いの)年利息1%の銀行に4年間預けておくと

$$100 \text{ 万円} \times 1\% + 100 \text{ 万円} = 101 \text{ 万円}$$

$$101 \text{ 万円} \times 1\% + 101 \text{ 万円} = 102.01 \text{ 万円}$$

$$102.01 \text{ 万円} \times 1\% + 102.01 \text{ 万円} = 103.0301 \text{ 万円}$$

$$103.0301 \text{ 万円} \times 1\% + 103.0301 \text{ 万円} = 104.0604 \text{ 万円}$$

というように雪だるま式お金が増えていきます。最初に考えた1年間の利払回数が違う場合についても同様のことがいえます。

100万円につき、年に2度、5千円ずつ利息がもらえる

は、

$$1\% \div 2 = 0.5\% \text{ ずつ半年に1回お金が増える}$$

ということになります。そして、いくらになるかと言いますと、

$$100 \text{ 万円} \times 0.5\% + 100 \text{ 万円} = 100.5 \text{ 万円} (= \text{半年後の預金残高})$$

$$100.5 \text{ 万円} \times 0.5\% + 100.5 \text{ 万円} = 101.0025 \text{ 万円} (= \text{1年後の預金残高})$$

という風に101万円よりも、わずか0.025万円だけ増えました。つまり違う利息額となったわけです。

では、更に細かくわけて、1ヶ月に1回、年12回の利息が受け取れる銀行があったとしましょう。この場合は

$$1/12 \approx 0.083\% \text{ ずつ1ヶ月に1回お金が増える}$$

ここで、今までのように12回計算をしても良いのですが、少し落ち着いて見てみると、

例えば100万円が1%増えるとその後どうなるかと言うのは、

$$100 \text{ 万円} \times 1\% + 100 \text{ 万円} = 100 \text{ 万円} \times (1 + 0.01) = 101 \text{ 万円}$$

という式で計算できるということがわかります。また、これを2回払いの式に応用すると

$$100 \text{ 万円} \times (1 + 0.005) \times (1 + 0.005) = 101.0025 \text{ 万円}$$

という風になります。同様に、12回払いの場合も

$$100 \text{ 万円} \times (1 + \frac{0.01}{12}) \times \cdots \times (1 + \frac{0.01}{12}) = 100 \text{ 万円} \times (1 + \frac{0.01}{12})^{12} = 101.004596089$$

という結果が得られます。⁵⁾ また数字に着目すると、利息 12 回払いのときのほうがやはり僅かにお金は多くなっています。

では、もっとお金を増やしたい!! ということで、1 日に 1 回利息が振り込まれるような銀行を考えてみるとどうでしょうか、

$$100 \text{ 万円} \times (1 + \frac{0.01}{365})^{365} = 101.005003 \text{ 万円}$$

となってやはり、いままでよりも僅かに増えています。では、この**利払い回数をどんどん増やしていくと億万長者になれるのでは!!!**⁶⁾ と思ってしまうわけです。例えば、年に 10000 回利払いがされるような銀行があったとしたら

$$100 \text{ 万円} \times (1 + \frac{0.01}{10000})^{10000} = 101.005016 \text{ 万円}$$

となりますが、よく見てみると、そこまで増えていません。どうやら上限があるようです。そしてこの上限が e なのです。ここで

$$e^{0.01} = (2.718281828459045235360287471352 \cdots)^{0.01} = 1.01005016708$$

という数値と見比べて見ましょう⁷⁾。そうすると、実は $100 \text{ 万円} \times e^{0.01} = 101.005016708 \text{ 万円}$ は今まで出てきた数字に非常に近い数字になっています。

つまり、経験的に、

年利率 1 % の銀行の利払い回数をどんどん大きくしていくと、1 年トータルでみたときには $e^{0.01}$ という利率に近づく。

ということがわかります。これを高校数学の言葉で、 $e^{0.01}$ に**収束する**と言います。こうして、 e という数字が簡単な金利計算から出て来るということがわかりました。この利率は、その瞬間瞬間に利息が発生し、それが預金に繰り入れられているという意味で**連続複利**と言われます。(ここに e に収束していく図を入れたい)

まとめ～ e は本当に身近なのか～

～「A bird in the hand is worth two in the bush.」～

(手に持っている 1 羽の鳥は、まだ手にしていない茂みの中の 2 羽の鳥と同じ価値があるということわざ)。

利払い回数をどんどん大きくしていくと、やがては e に近づくということがわかりましたが、実際にそんなに何度も利払いが行われることなんてあるのだろうかと思う方もいらっしゃると思います。しかし、1 つ言えることは、 $e^{\text{利率}}$ は 1 日複利とほとんど差はないということです。そして、 e という数字の計算上の便利さから、金融などの分野では e を使った利率計算が行われています。そのことについて触れて、この記事を終えたいと思います。

どうして、金融機関では e を使う必要があるのかという、まず一つには e を使った利率計算が、数学的に相性が良いということがあります。

例えば、最初の年に 12 回の利払い 1 %、次の年に 6 回の利払い 2 %、そのまた次の年に 10 回の利払い 3 % の利率でお金を運用したときに、その利息の計算は

$$(1 + \frac{0.01}{12})^{12} \times (1 + \frac{0.02}{6})^6 \times (1 + \frac{0.03}{10})^{10}$$

⁵⁾ 電卓で計算する場合は $1.00083333 \times \text{＝} \text{＝} \text{＝} \text{＝} \cdots$ と $=$ ボタンを連打すると計算できます

⁶⁾ 少し関連した話として、**72 の法則**と言うものがあります。これは、6 % 複利でお金を運用すると約 12 年で 2 倍になる、8 % 複利でお金を運用すると約 9 年で 2 倍になるというように複利の % 数と二倍になるまでの年数の積がおおよそ 72 になっているという法則です

⁷⁾ 流石にこれを普通の電卓で計算すわけにはいきませんので、関数電卓で計算するか Google で「 $e^{0.01}$ 」と検索してみてください

となり、いちいち全てを計算する必要があります。また、数学的に見てもこの式は複雑です。しかし、すべて連続複利であるとみなすと、

$$e^{0.01} \times e^{0.02} \times e^{0.03} = e^{0.01+0.02+0.03}$$

という風にシンプルな式にすることが出来ます。⁸⁾ またこの記事では述べませんが、この e の何々乗という数字はとても微分積分などの数学的な操作と相性が良いです。

最後に、そもそも全てのお金を銀行に預けているわけでもないのに、なぜ金融機関がこのようなことをしないといけな
いのかということについて考えてみましょう。これは、**今手にもっている 100 万円と 来年の 100 万円は当価値ではない**ということに由来しています。なぜならば、今の 100 万円を借りに銀行に預けたとしたら、100 万円プラス利子がついているからです。このようにして、金融機関では毎年のようにお金の出入りがありますから、それを一度全て現在の価値に換算して計算する必要があります。

「と言っても、今時超低金利だし関係ないんじゃないの」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、例えば生命保険や年金は非常に長期のお金の出入りがあります。よってその積み重ねは大きく、少しでも金利が動いただけで、保険料や年金の掛金に大きな影響をあたえることがあるのです。⁹⁾ 故に、(e を用いて) その会社のお金の出入りを管理していくことは非常に重要です。¹⁰⁾ またこれは、 e が使われているほんの一例にすぎず、数学が絡む殆どの分野で e が使われているということを最後に注意しておきたいと思います。

⁸⁾ 全く関係がない話ですが、僕がお気に入りの問題として、「 e^π に最も近い整数を電卓なしで計算せよ」という高校数学の問題があります。暇な方はやってみてください。もっと関係のない話として、 π^e , e^e , π^π は全て有理数かすら分かっていませんが、 e^π は超越数であることが分かっています。

⁹⁾ 例えば、前年度のゼロ金利政策が日本銀行によって発表されたとき、多くの積立式の保険商品が販売をやめざるを得なくなったという事実からも分かると思われます。

¹⁰⁾ 1つお詫びをしなければならないのは、 e を用いた現在価値計算が行われるのはどちらかと言うと、数学色の濃い金融派生商品などの分野で、本文中で例として挙げた保険会社や年金などでは、一応「利力」という名前でもって認識はされていますが、少々数学との相性が悪くても、普通の複利計算でゴリ押ししてしまうところがあります。

割り算再考 (前多)

小学校以来習ってきた割り算の概念をもう一度考えてみると、実は数学の概念に繋がっているとわかります。高校生にでもわかるよう配慮して書いたつもりですが、*がついている項目は大学1,2年を想定して、**がついている項目は大学3,4年を想定して書いています。

割り算とは

始まりは小学生の問題です。

問題 6人を2人ずつのチームにわけました。この時、何チームできるでしょう。

式 $6 \div 2 = 3$.

答え 3チーム。

懐かしいですね。また、足し算の答えを「和」と言うように割り算の答えは、「商」と言うんです。ちなみに \div という記号はアメリカ、日本、イギリスぐらいしか使われておらず、標準的には $6/3$ とスラッシュを使いますので、今回もこれ以降は $/$ で書きます。

さて、今回注目したいのは、式ではなく図です。




図1: 3つのチーム分け

小学校以来習ってきた割り算というのは、「たくさんあるものを、均等にチーム分けした時のチーム数を求める演算」だと考えることができます。このイメージを元に、「集合の割り算」を定義してみましょう。

商集合

とはいえ、集合が与えられたとき、いきなり割り算するというのはできません。「チーム分け」するには何が必要かを考えてみましょう。なお、大学以降では、集合の要素のことを「元(げん)」というので、これ以降の記事では、要素を元と書くことにします。

同値関係

チーム分けするためのアイディアは、「同じチームに属する条件」を与えることです。「同じチームに属している条件」を「同値関係」と言います。「同値関係」は、以下に定義されるような3つの条件を満たす必要があります。

DEFINITION 0.0.0.1. 同値関係

集合 X に対し、同値関係 \sim とは、以下の3つの条件を満たす集合の元の間の関係をいう。

- (1) (反射律) 全ての $x \in X$ に対し、 $x \sim x$.
- (2) (対称律) $x \sim y$ を満たす全ての $x, y \in X$ に対し、 $y \sim x$

(3) (推移律) $x \sim y, y \sim z$ を満たす全ての $x, y, z \in X$ に対し, $x \sim z$

一見, 難しそうな定義ですが, よく読めば大したことは言っていない. 1つ目の条件は, どんな奴でも自分自身とは同じチーム, 2つ目の条件は, チームメートは逆からみてもチームメート, 3つ目の条件は, チームメートのチームメートはチームメートだということです (当然成り立ってほしい条件ですね).

例をいくつかあげてみましょう.

例. 自然数の集合 \mathbb{N} において, 元の関係 \sim を

$$n \sim m \Leftrightarrow n - m \text{ は } 2 \text{ で割り切れる}$$

と定めると, これは同値関係です. 実際, どんな数 n についても, $n - n = 0$ は 2 で割り切れますし, $n - m$ が 2 で割り切れるなら $m - n$ も 2 で割り切れます. さらに, $n - m, m - l$ が 2 で割り切れるなら $n - l$ も 2 で割り切れます. 今は「2」で割り切れるとしましたが, 他の自然数でも上のように定めれば同値関係になることは同様に示せます.

例. 実数の集合 \mathbb{R} において, \leq ($<$ または $=$) で定められる元の関係

$$x \sim y \Leftrightarrow x \leq y$$

は同値関係ではありません. どんな実数 x に対しても $x \leq x$ ですし, $x \leq y$ かつ $y \leq z$ ならば $x \leq z$ ですから, 反射律と推移律は満たしますが, 対称律を満たしません. 実際, $x \leq y$ だからと言って, $y \leq x$ とは限らないからです.

同値関係があるとき, 同じチームに属している奴らを集めてきたものを, 同値類と言います. 例えば, $x \in X$ と同値関係にある X の元全体 (x が入っているチーム) を, $[x]$ で書くことにします.

$$[x] = \{y \in X \mid x \sim y\}$$

すると, 集合を「チーム分け」する, つまり集合の割り算を定めることができます.

商集合の定義

さて, 同値関係が定まると集合の割り算を定義できます.

DEFINITION 0.0.0.2. 商集合

集合 X とその上の同値関係 \sim に対し, 商集合 X/\sim を以下で定める.

$$X/\sim = \{[x] \mid x \in X\}$$

例で感覚を掴みましょう.

例.

$X = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ とします. このとき, X に, 同値関係 \sim を,

$$n \sim m \Leftrightarrow n - m \text{ が } 2 \text{ で割り切れる}$$

と定めます. このとき, 商集合 X/\sim は何になるでしょうか. 例えば, 1 の同値類 (1 の入っているチーム) は, $[1] = \{1, 3, 5\}$, 0 の同値類は, $[0] = \{0, 2, 4, 6\}$ となります. これ以外のチームはありませんから,

$$X/\sim = \{[0], [1]\} = \{\{0, 2, 4, 6\}, \{1, 3, 5\}\}$$

であるとわかります。まさに偶数と奇数への「チーム分け」ですよね。 $\{0, 1\}$ はチームの代表メンバーであり、数学用語でも「完全代表系」と言います。しかし、わり算とはいえ、必ずしも1つ1つのチームの元の数は一致しないことには注意しましょう。

様々な商集合の例

合同式

まずは、上の概念をそのまま延長して自然数の集合 \mathbb{N} に対して、同値関係 \sim を以下で定めてみます。

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \text{ が } 4 \text{ で割り切れる}$$

この同値関係で割った集合 \mathbb{N}/\sim は、4で割ったあまりでのチーム分けになります。

$$\mathbb{N}/\sim = \{[0], [1], [2], [3]\}$$

これを図にすると以下ようになります。自然数全体を4つのチームに分けてしまったのがよくわかると思います。

12	13	...	
8	9	10	11
4	5	6	7
0	1	2	3
-4	-3	-2	-1
	...	-6	-5

図2: 4で割ったあまりでチーム分け

合同式を思い出してみましょう。

$$1 \equiv 5 \pmod{4}$$

などという表記を見たことがあるかもしれませんが、これは、1と5が上で定めた同値関係、すなわち $1 \sim 5$ を示しているに他なりません。さらに、もともと \mathbb{N} に定まっている足し算、掛け算はそのまま \mathbb{N}/\sim に遺伝します。つまり、

$$[a] + [b] = [a + b] \quad [a] \times [b] = [a \times b]$$

が成り立つということです。これを使えば、例えば

$$[15^{30}] = [15]^{30} = [3]^{30} = [3^2]^{15} = [1]^{15} = [1]$$

となり、 15^{30} がチーム1に属する(すなわち、4でわると1あまる)ことがすぐ確かめられます。

ベクトル


今までは数字を使っていましたが、集合にしたおかげで、もっと概念的なものについても商集合を考えることができます。高校で習うベクトルも、商集合として考えてみましょう。 E を平面(もしくは空間)の有向線分(向きを持った線分、つまり矢印)全体からなる集合とします。このとき、 E 上の同値関係を、

$$v \sim w \Leftrightarrow v \text{ と } w \text{ は平行移動で重なる}$$

と定めます (同値関係になっていることはチェックしてみてください). このとき, E/\sim がまさに平面全体のベクトルを集めた集合になります. この商集合の一つ一つの元は「平行移動で重なったら同じベクトルを集めたチーム」になりますが, この中で原点を始点として持つものを「代表」とすれば, 終点の「座標」で全てのチームが表せます. これこそがベクトルの「成分表示」なのです.

空間の貼り合わせ


ベクトルの例からもわかるように, あるものたち (ベクトルの場合は平行移動したもの) を「おなじものと見たい」「同一視したい」という気持ちがあるときは, 商集合が使われます. 数学においては図形同士を, のりで貼り合わせたというシーンに多々遭遇しますが, これをきちんと定式化するのも商集合の大事な役割です. 例えば, 下の円と直線を黒点の部分で貼り合わせてみましょう.



このとき, 二つの図形の点の集まりを一つの集合 X だと考え, A を 2 つの黒点からなる集合として, 以下のような同値関係を定めます (同値関係になっていることはすぐ確かめられます).

$$x \sim y \Leftrightarrow x, y \in A \text{ または } x = y$$

つまり, A に入っていない点たちは, その点 1 点からなるチームに, A に入っている点たちはまとめて一つのチームにしてしまいます. そうすれば, チーム全体の集合 X/\sim は, まさに, 二つの図形を貼り付けたものになっていることがわかります. このような貼り付けにより作られる図形の一つをみてみましょう. 正方形の辺を貼り付けて立体を作るということを考えてみます. 図の黒点同士のように, 左側の辺と右側の辺, 上と下も同様に, 同じ方向に貼り付けると, 右のように浮き輪の形の図形が出来上がります. これは (2 次元) トーラスといい, 数学の様々な場面に登場します.



ちなみに, 貼り付けかたを一つだけ逆にすればクラインの壺, 二つとも逆にすると二次元射影空間と呼ばれる図形になります (想像できますか?).

二次元球面 (地球の表面) は地球上の地図を貼り合わせて構成できますし, 多くの図形は貼り合わせによって構成が可能です. 大雑把に言って, このように直線や平面などまっすぐな空間を貼り合わせて作られる図形のことを数学では多様体と呼び, 古くから研究されてきた対象です.

商ベクトル空間*

ここで扱う例は, 大学 1 年生で習うベクトル空間の概念なので, 知らない人は飛ばしてもらって結構です.


ここまでの概念がわかってしまえば、大学1年生の線形代数での1つの難所である商空間は簡単に定義できます。

DEFINITION 0.0.0.3. ベクトル空間 V と部分空間 W に対し、 V 上の同値関係を、


$$v_1 \sim v_2 \Leftrightarrow v_1 - v_2 \in W$$

と定義する。 V/\sim を、部分空間 W による V の商空間といい、 V/W で表す。

これだとイメージしにくいかもしれませんが、 v_1 の同値類 $[v_1]$ は $v_1 + w (w \in W)$ と書けるものな訳ですから、 W の元だけずれているものは全て同じチームなのです。絵で描けば、以下ようになります。まず、部分空間とは、原点を通るまっすぐな空間ですから、 V と W の図は以下ようになります。



この空間 W 全てが同じチームとなりますので、チームは以下のようにならんでいることがわかります。つまり、商空間とは、この1枚1枚のチームの全体となるのです。完全代表系は、 W と原点のみにおいて交わる直線と平面たちの交点となります（完全代表系の取り方は無限通りあります）。つまり、商空間 V/W はこの直線と同一視できるのです。スカラー倍や足し算については合同式のときと同じく商集合に遺伝することが示せるので、 V/W もベクトル空間となることがわかります。イメージとしては、商空間 V/W は V を図の直線に向かって潰した空間ということになります。潰した時、 W は原点に潰れるわけですから、 V において、 W の成分を全て0と同一視したものとも言えます。



数の構成

さて、ここからは応用編です。唐突ですが、「整数、有理数、実数とは何か」と聞かれたとき、何て答えるでしょうか。「え、そりゃあ、 -1 とか分数とかでしょ？」とか答えられても、あくまでそれは例にすぎません。「自然数の集合 \mathbb{N} と足し算、掛け算しか知らない」と仮定して、整数の集合 \mathbb{Z} や有理数の集合 \mathbb{Q} 、実数の集合 \mathbb{R} を自然数のみを用いて構成してみることにします。（今回は、自然数の存在は暗に認めています。公理的集合論の立場では自然数は無限公理を満たす最小の集合として存在を保証しているのですが、今回は解説しないことにします。）¹¹⁾

¹¹⁾ 以下の話の厳密な証明が知りたい場合、[1]を参照してください。

自然数から整数

さて、自然数から整数を構成することを考えてみましょう。一番簡単なアイディアは、プラスパートとマイナスパートの自然数を作るということです。 (a, b) と書いたとき、1つめの項はプラス、2つ目の項はマイナスに当たると考えてみましょう。例えば、 $(2, 0)$ を2に当たる数として、 $(0, 3)$ を -3 に当たる数として定めるわけです。そして、2つの数の足し算を $(2, 0) + (0, 3) = (2, 3)$ と定めます。 $(2, 3)$ はプラスパートとマイナスパートがそれぞれ2, 3ですから、 -1 を表していると考えます。これで見、うまくいったかのように見えますが、これだと $(2, 3)$ と $(0, 1)$ が同じ数字を表しているため、“ダブリ”が生じています。 $(2, 3)$ と $(0, 1)$ を同じものと見たい、同一視したい。こんな時こそ商集合の出番です。

DEFINITION 0.0.0.4. 整数

自然数を二つ並べた集合 $\mathbb{N}^2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{N}\}$ を考え、 \mathbb{N}^2 上に同値関係

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow a + d = b + c$$

と定め、この同値関係による商集合 \mathbb{N}/\sim を整数 \mathbb{Z} と定める。さらに、 \mathbb{Z} 上の加法と乗法を、

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + b, c + d)] \quad [(a, b)] \times [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)]$$

と定める¹²⁾

例えば、 $2 + 1 = 3 + 0$ ですから、 $[(2, 3)] = [(0, 1)]$ だとわかります。掛け算はちょっと技巧的ですが、これでうまくいっていることがわかります。例えば、正の数同士は、 $[(n, 0)] \times [(m, 0)] = [(nm, 0)]$ と、今までと全く同じ演算であることがわかります。また、 $[(n, 0)] \times [(0, m)] = [(0, nm)]$ や、 $[(0, n)] \times [(0, m)] = [(nm, 0)]$ などから、プラスかけるマイナスがマイナス、マイナスかけるマイナスがプラスであることも説明できます。

最後に、 $[(x, 0)]$ を x とかき、 $[(0, x)]$ を $-x$ を書くことにすれば、今まで使っていた表記と合致します。

整数から有理数

さて、今度は有理数を構成してみましょう。さっきのアイディアをそのまま借用して、分母パートと分子パートを並べて書いてみることにします。つまり、 (a, b) と書いたとき、 $\frac{a}{b}$ を表すとしてみます。しかし、分数というのは、小学校以来、約分しても同じ、だったわけですから、例えば $(2, 4)$ と $(1, 2)$ は同じものであってほしいわけです。そこで、商集合を使って同一視してみます。

DEFINITION 0.0.0.5. 有理数

$\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\}) = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z} - \{0\}\}$ 上に同値関係

$$(a, b) \sim (c, d) \Leftrightarrow ad = bc$$

と定め、この同値関係による商集合 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})/\sim$ を有理数 \mathbb{Q} と定める。さらに、 \mathbb{Q} 上の加法と乗法を、

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)] \quad [(a, b)] \times [(c, d)] = [(ac, bd)]$$

¹²⁾ 本当は、これで矛盾なく定まっていることをチェックしなければいけません。つまり、 $(a, b) \sim (a', b')$ のとき、

$$(a + c, b + d) \sim (a' + c, b' + d) \quad (ac + bd, ad + bc) \sim (a'c + b'd, a'd + b'c)$$

であることを示す必要があります。もしこうでなければ、足し算や掛け算の結果が、チームの代表メンバーの選び方によって違う結果になってしまい、矛盾してしまうからです。一つ目だけチェックすれば、 $a + b' = a' + b$ より $(a + c) + (b' + d) = (a' + c) + (b + d)$ ですからうまくいっています(二つ目もチェックしてみましょう)。このようにうまく定まっていることを、数学では、well-definedと言います。

と定める¹³⁾.

～の同値関係は、外項と内項の積が等しい、つまり、 $a:b=c:d$ を表していますから、同じ分数を1チームにまとめていることがわかります。

さて、定義から、 $[(1,1)]$ はどんな数とかけても相手を変えない、自然数の”1”に当たる数だとわかります。また、 $[(0,1)]$ は、どんな数とかけても $[(0,1)]$ になり、どんな数と足し算しても相手を変えない、自然数の”0”に当たる数だとわかります。

また、

$$[(a,b)] \times [(b,a)] = [(ab,ab)] = [(1,1)]$$

ですから、 $[(a,b)]$ に、 $[(b,a)]$ をかけると1になることがわかります。ということは、

$$[(c,d)] = [(a,b)] \times [(b,a)] \times [(c,d)]$$

ですから、

$$[(c,d)]/[(a,b)] = [(b,a)] \times [(c,d)]$$

となり、小学校以来やってきた、分数の割り算は分母と分子をひっくり返してかけるということも正当化できます。

最後に、 (a,b) を $\frac{a}{b}$ と書く¹⁴⁾ことにすれば、今まで使っていた表記と合致します。

有理数から実数

さて、最後に実数を作ってみましょう。これはかなり困難です。実数の構成には、代表的なものでDedekind cutによるものと、有理数の完備化の二つがあるのですが、今回は有理数の完備化を解説したいと思います。

DEFINITION 0.0.0.6. Cauchy 列

数列 $\{a_n\}$ がCauchy列であるとは、以下のことを言う。

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \text{ such that } n, m > N \Rightarrow |a_n - a_m| < \varepsilon$$

一見ギョッとするような定義ですが、簡単に言えば、コーシー列とは、「二項間の差がどんどん小さくなっていくような数列」のことです。さて、ここで、次のような問題を考えて見ましょう。

Cauchy 列は収束するでしょうか？

答えは、実数列なら○、有理数列なら×です。数学用語でこの性質を「完備性」と言います。有理数は完備ではないのです。例えば、有理数で $\sqrt{2}$ に近づくような数列を考えてみれば、もちろん二項の差は縮まっていきますが、肝心の収束先の $\sqrt{2}$ が有理数ではないですから、「有理数の中では」収束しません。このことに着目して、有理数から実数を作ります。具体的には、

$\sqrt{2}$ に収束する有理数列を $\sqrt{2}$ だと定義する

です。数列と $\sqrt{2}$ を同じと見るなんてかなり気持ち悪いですが、一応定義はできるわけです。とはいっても、 $\sqrt{2}$ に収束する有理数列はいっぱいあります。そこで、商集合の考え方を使って、 $\sqrt{2}$ に収束する数列を1チームにしてしまえば良いのです。

DEFINITION 0.0.0.7. 実数

¹³⁾ これも well-defined であることをチェックする必要があります。示してみてください。

¹⁴⁾ ちなみに、 $\frac{a}{b}$ は日本語では「 b 分の a 」と読みますが、英語では逆で、「 a over b 」と読みます。

\mathcal{C} を有理数の Cauchy 列全体からなる集合とし、 \mathcal{C} 上の同値関係を、

$$\{a_n\} \sim \{b_n\} \Leftrightarrow \forall \varepsilon \exists N \text{ such that } n > N \Rightarrow |a_n - b_n| < \varepsilon$$

と定め¹⁵⁾、この同値関係による商集合 \mathcal{C}/\sim を実数 \mathbb{R} と定める。さらに、 \mathbb{R} 上の加法と乗法を、

$$[\{a_n\}] + [\{b_n\}] = [\{a_n + b_n\}] \quad [\{a_n\}] \times [\{b_n\}] = [\{a_n b_n\}]$$

と定める。¹⁶⁾

上のように定めれば $\{a_n\} \sim \{b_n\}$ であれば、 $\{a_n\}$ と $\{b_n\}$ が同じ値に近づいていくことがわかります。本当は、 \mathbb{R} が満たすべきたくさんの性質をここから示さなければいけないのですが、今回の主題はそこではないので、詳しくは参考文献を見てみてください。

このように、存在が当たり前だと思っていた整数や有理数や実数、そしてそのたくさんの性質は、商集合のアイデアに支えられているのです。¹⁷⁾

応用**

最後に、少しだけ応用をみてみます。

等質空間

群構造をもつ可微分多様体で群の積演算 $(a, b) \mapsto ab$ と逆演算 $a \mapsto a^{-1}$ が可微分であるものを Lie 群と言います (群と多様体のあいのこです)。例えば、一般線形群 $GL(n, \mathbb{R})$ や特殊線形群 $SL(n, \mathbb{R})$, 特殊直交群 $SO(n)$ などは Lie 群になっています。

さて、Lie 群 G がある多様体 M に推移的に作用していることを考えてみましょう。推移的、というのは全ての点同士がある Lie 群の元の作用で写りあえるという意味です。全射群準同型 $G \rightarrow \text{Diff}(M)$ があると言ってもいいです。例えば、球面 S^n , 上半平面 H には、

$$\begin{aligned} SO(n+1) &\rightarrow \text{Diff}(S^n) & A &\mapsto (p \mapsto Ap) \\ SL(2, \mathbb{R}) &\rightarrow \text{Diff}(H) & \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &\mapsto \left(z \mapsto \frac{az+b}{cz+d} \right) \end{aligned}$$

のように、Lie 群が推移的に作用しています。この時、ある一点 p の群作用による行き先 (軌道) は、推移的であるという仮定から全体を覆うわけですが、作用させても動かない G の元があるかもしれません。これを集めたもの、

$$H = \{g \in G \mid gp = p\}$$

を G の一点 p の固定部分群と言います (定義より閉部分群になります)。この H たちをチームにして、点 p と同一視すれば、作用させている空間との 1 対 1 対応ができます。すなわち、

$$G/H \simeq M \quad [g] \mapsto gp$$

となるわけです。

¹⁵⁾ これが同値関係であることは非自明ですが、ここでは省略します。

¹⁶⁾ これが well-defined であることも非自明ですが、ここでは省略します。

¹⁷⁾ 実は複素数も、商集合を用いて $k[X]/(X^2+1)$ などと定義できるのですが、今回は紙面の関係上、省略します。

ここで、左辺の G/H とは、 G を、 $g_1 \sim g_2 \Leftrightarrow g_1 g_2^{-1} \in H$ という同値関係で割ったもので、 G の部分群 H による商群と呼ばれます。特に、Lie 群をその中の閉部分群で割った商群 G/H には多様体構造が定まることが知られており、上の同型は微分同相であることが示せます。

このように、Lie 群が推移的に作用している多様体は、必ず Lie 群の商の形で書くことができます。このような多様体を等質空間と言います。

例. 球面

$SO(n+1)$ の作用による球面 S^n 上のある 1 点 $(0, 0, 0, \dots, 0, 1)$ の固定部分群は、

$$\left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| A \in SO(n) \right\} \simeq SO(n)$$

よって、 $S^n \simeq SO(n+1)/SO(n)$ となります。

例. 上半平面

$SL(2)$ の作用による上半平面 H 上のある 1 点 $i (= \sqrt{-1})$ の固定部分群は、

$$\frac{ai+b}{ci+d} = i \Leftrightarrow a=d, b=-c$$

より、

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2, \mathbb{R}) \middle| a=d, b=-c \right\} \simeq SO(2)$$

よって、 $H \simeq SL(2, \mathbb{R})/SO(2)$ となります。 H は複素多様体ですが、実 Lie 群の商でかけます。

この表示の一つのメリットは、ある 1 点に定めた幾何構造を全体に写すことにあります。 G/H の形で書いた場合、当然、原点の同値類 $[e]$ があります。これについて

補題. G/H を等質空間とする。集合として、次の同型がある。

$$\left(\bigotimes_{[e]}^r T_{[e]} M \otimes \bigotimes_{[e]}^s T_{[e]}^* M \right)^H \simeq \left(\Gamma(M, \bigotimes^r TM \otimes \bigotimes^s T^* M) \right)^G$$

ただし、左は、 $Ad(H)$ 不変なテンソルの元、右辺は M からベクトル束への左作用の微分 L_{G*} 不変な切断である。

表示は仰々しいですが、例えば、 $r=1, s=0$ とすれば、 H 不変な接空間のベクトルと、 G 不変なベクトル場が 1 対 1 に対応していることがわかりますし、 $r=0, s=2$ とすれば、 H 不変な接空間上の内積と、 G 不変な計量、 H 不変な複素構造と G 不変な複素構造が 1 対 1 に対応することがわかります。

他にも、等質空間上では測地線を Lie 代数から Lie 群への指数写像でかけたり、曲率テンソルが、Lie 括弧でかなりシンプルにかけたりなど、計算できる具体例を豊富に提供してくれます。

Clifford-Klein 形

Riemann の一意化定理の一般化である、Klein-Poincaré-Koebe の一意化定理より、Riemann 面の普遍被覆は、上半空間 H 、複素数 \mathbb{C} 、複素射影空間 \mathbb{P}^1 のいずれかに正則同値になります。また、特に、種数が 2 以上のコンパクト Riemann 面は、上半平面を、Fuchs 群と呼ばれる $\text{Aut}(H)$ の離散部分群 Γ で割って作られます。 H 自体は上で見たように $SL(2, \mathbb{R})/SO(2)$ とかけますから、コンパクト Riemann 面は、 $\Gamma \backslash SL(2, \mathbb{R})/SO(2)$ という $SL(2, \mathbb{R})$ を 2 回割ったものとして書くことができます。一般に、 G/H に固有不連続かつ自由に作用する G の離散部分群 Γ が存在すれば、

等質空間 G/H をさらに割った $\Gamma \backslash G/H$ を考えられます. これを Clifford-Klein 形といい, 等質空間より豊富な例を含む広いクラスとして, 現在も研究されています.

終わりに

たくさんの例を「割り算」というテーマでざっくばらんに解説してみました. 何を隠そう, この集合の割り算という概念を理解するのに僕自身苦勞したので, あえて書いて見ました. 数学というと, 「イメージではなく, 論理的にのみ考える学問」と考えられがちな気がします. 論理ももちろん大事ですが, 決して論理だけではなく, むしろ, 「イメージをいかに数式という形で正確に伝えられるか」というモチベーションで研究が進むことも多いと思います. 高校や大学で難しい概念に出会ったときは, ただ定義を眺めるだけではなく, 様々な例を見ながら, どういう気持ちで概念が生まれているのかを考えて見るといいと思います.

参考文献

- [1] 数の構成 自然数から複素数まで http://mathematics-pdf.com/pdf/construction_of_numbers.pdf
- [2] S.Helgason. Differential Geometry and Symmetric Spaces. AMS Chelsea Publishing, 2001
- [3] 佐武一郎. 線型代数学. 裳華房, 数学選書 1, 1974
- [4] 松坂和夫. 集合・位相入門. 岩波書店, 1968
- [5] 小林俊行. 数学の最先端 21 世紀への挑戦. vol1. Springer, 2001

$e^{\pi i}$ sode **Vol.3.5**

2015 年 11 月 21 日発行

著 者 ・ ・ ・ ・ ・ 東京大学理学部数学科有志

発行人 ・ ・ ・ ・ ・ 伊藤克哉