

# まえがき

本日は「数学科展示 ますらぼ」にご来場いただき誠にありがとうございます。本企画は2年前に数学科2013年度進学の先輩方(現在多くの方が修士1年生となっています)が始めたもので、それを私達数学科2015年度進学(現在学部3年生)が引き継いだものです。つまり「ますらぼ」という企画名や「 $e^{\pi i}$ sode(えびそーど)」という冊子の名前こそ受け継いでいますし、先輩方からご協力・ご指導は頂いていますが、運営している人間はガラッと変わった企画となっています。数学科や「ますらぼ」という名前に泥を塗らないように頑張りたいと思います。

東京大学理学部数学科・大学院数理科学研究科は駒場キャンパスにある学科・研究科です。数学科には東大中の数学を愛する天才・秀才たち約45名が集まります。私達が日々勉強・研究を行う“数理科学研究棟”(別名数理病棟)では、個性豊かな数学を愛する人達が飛んだりはねたり踊ったりしています。院試にじゃがいもを持ってくる人やインターネット上で女子大生と仮定しても矛盾しない発言を繰り返す人や院試の合格発表から逃げるために山にこもる人やいつも裸足で大学に来る人や友人の誕生日をすべて暗記している人や美術や音楽や経済学などの才能もある山岳ガイドや自称女子小学生などがいます。(もちろん普通の人もたくさんいて多種多様な学科ですが、みな数学が好きという共通点によってまとまりを持っています。)みんなとても面白い人ばかりでここに書いていたらきりがありません。私はこの学科が大好きです。この大好きな学科のありのままの姿を伝えたくて、駒場から本郷まで井の頭線と銀座線と丸ノ内線を乗り継いでやって来ました。

そんな私の大好きな数学科が有志で作り上げたこの冊子 $e^{\pi i}$ sodeも今回でvol.3となりました。vol.1では岡潔やブルバキ、ワイエルシュトラスなどの数学者の伝記、vol.2では古田教授へのインタビューや数学科・大学院数理科学研究科の学生へのアンケートや4年生のセミナーの紹介などをしました。vol.3では、数学的なバックグラウンドを持つ方だけでなく数学好きの高校

生や一般の方などにも読んでもらえるような記事をたくさん揃えました。普段数学に慣れ親しんでいない方には、数式がたくさん並んでいてびっくりしてしまうかもしれませんが、じっくり読んでいただければと思います。

本企画・冊子を通じて数学に興味を持っていただけたのならば、私達にとってこれほどまでに嬉しいことはありません。図書館や大きな書店に行って数学書を手に入れれば家にいながらさらに広い数学の世界を旅する事ができます。東大数学科に興味を持ったという場合は高校生や大学生向けに説明会を開いていますので是非参加してみてください。(伊藤充城)

# 目 次

まえがき	i
トーラスのタイヒミュラー空間I (浅香 猛)	1
非可換幾何の呼び声 (TN)	9
代数学の基本定理でみる数学の世界 (伊藤)	17

# トーラスのタイヒミュラー空間 (浅香 猛)

## 序

形を知りたい 宇宙の形を知りたい, ある特定のタンパク質の形を知りたい というような欲動はおそらく絶えずあって, 調べ始めるにはどの範囲までの形を考えるのか, どの程度似ていたら同じものとみなすのか決めないといけない. ここで考えるのは, 複素平面から作られるトーラス全体で, 双正則同値になっているものは同じとみなす. さらにトーラスにマーキングをつけて, なお厳しい見方で, マーキングされたトーラスを類別する. このようなトーラス全体が, トーラスのタイヒミュラー空間である. この何を言ってるのか分からない話を分かるように, 以下, 努力していきたい. もし分からなかったら著者のせいである.

## トーラス



複素平面からトーラスを作る. 複素平面とは, 実数だけだと数が足りないために 1 乗して  $-1$  になる数  $i$  を加え, 実数を拡張したものである.

$$(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i$$

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (b + d)i$$


( $a, b, c, d$  は実数)

と足し算, かけ算が定義され, 引き算, 割り算もそれから導かれる. 複素平面から何か平行四辺形を切り抜こう. 例えば



を切り抜くことにする. そして, 対辺をそれぞれ貼り合わせると

## 2 トーラスのタイトミューラー空間 (浅香 猛)



実は切り抜くという操作はあまり良くない．なぜなら数学において境界は大事なのに、切り抜くと境界での構造がぐしゃぐしゃしてしまうからである．余裕のある人はもう少し良いイメージで考えてほしいのだが、それはトイレットペーパーである．切り抜いてしまわずに、複素平面全体をくるくると巻いていく．今回の例で行くと、 $0$  と  $2$  を結ぶ線分と  $i$  と  $2+i$  を結ぶ線分がぴたりと一致するように縦に巻き、以降同じ周期でくるくる巻くことにする．複素平面に厚さはないものと考えれば、このように巻ける．複素平面において  $0$  と  $2$  を結ぶ線分より下にある部分もすでに同じように巻かれていたとする．すると無限に重なった巻物が得られ、さらに  $0$  と  $i$  を結ぶ線分と  $2$  と  $2+i$  を結ぶ線分が重なるように横にも周期的に巻いていく．現実の紙だと紙が交差してできないが、この複素平面は自分を通り抜けられると考えれば巻いていける．これによって、平行四辺形が無限個重なったドーナツの表面がえられる．これがトーラスである．

複素平面から作り出したので、トーラスは、詳しくは説明できないが複素平面由来の構造を持っている．このトーラスは長方形の選び方によって形が違う気がする．この話を次の節にもっていく．

## トーラスのモデュライ空間


トーラスの形が同じであるということを双正則同値によって定める．双正則同値の説明は著者の力量不足のためうまくできない．それでも一応、大雑

把に言うと, 双正則同値とは, トーラスの持つ複素平面由来の構造が等しいということである.

また, 別の言い方をしてみると, 2つのトーラス  $A, B$  に対して, 双正則という性質を持つ変換によって  $A$  を  $B$  に変形できるとき, その2つは双正則であるという. これは, 例えば, 長方形に対して, 相似という関係を, 一方を拡大か縮小という変換を行ってもう一方に変形できることと説明するのと同じ言い方である.


双正則同値そのものは難しいが, トーラスをつくる型となった平行四辺形を用いると, 双正則同値となる十分条件は説明できる. 次の事実がある

定理. 複素平面上に2つの平行四辺形  $A, B$  があったとする.  $A$  を縦横比を保ったまま拡大か縮小をして, 平行移動と回転移動をすることで  $B$  と重なるとき,  $A$  からつくられるトーラスと  $B$  からつくられるトーラスは双正則同値である





例. のとき,  $A$  からつくられるトーラスと  $B$  からつくられるトーラスは同じものである.

このことから,  $t$  は複素平面上の実軸より上の領域 (上半平面と名付ける) を自由に動くとして, 以下の平行四辺形



#### 4 トーラスのタイヒミュラー空間 (浅香 猛)

を考えれば, 他のある位置にある平行四辺形からトーラスをつくったとしても, それに応じて  $t$  をうまく定めれば, 双正則同値なトーラスをつくれる. すなわち,  $t$  を動かして,  $0$  と  $1$  を結ぶ線分と  $0$  と  $t$  を結ぶ線分でできる平行四辺形全体を考えれば, すべてのトーラスは考えつくされる. このことを踏まえ, さらに次の双正則同値と同値な条件がある.





定理.  $X$  と  $Y$  からつくられるトーラスが双正則同値

$$\Leftrightarrow s = \frac{at+b}{ct+d} \text{ をみたす整数 } a, b, c, d \text{ が存在して, } ad - bc = 1 \text{ となる}$$



例. 下図の  $A, B$  によってできるトーラスは双正則同値となる. 実際,

$$\frac{3i-4}{4i-5} = \frac{32+i}{42}$$

が成り立っている.



この関係で互いに等しくない  $t$  全体を挙げてみれば, 分かったような気になる. これがトーラスのモデュライ空間と呼ばれるもので以下の様なものである. この灰色部分から点  $t$  をとり, そこから平行四辺形をつくれば, この型を元にトーラスがつくれる.





つまり, この斜線部上の一点一点がトーラスに対応していて, トーラス全体というものを目の当たりにした.


## トーラスのタイヒミュラー空間

トーラス上に向きのある輪をおくと

この2つの輪はトーラスから離れてしまわないようにどう伸び縮みさせて



も一点につぶせない.



このような輪はトーラス上で縮めていけば一点につぶせる.


そのような一点につぶせない輪のかけ方はいくらでもある. ただし, トーラ



## 6 トーラスのタイヒミュラー空間 (浅香 猛)


ス上を移動して, 重ねられるような輪のかけ方は同じとみなす.

この一点につがせない輪のかけ方は, 実は最初の2つを組み合わせですべて



つくれる. 組み合わせるといふ言い方はあいまいだが, なんとなくわかって欲しい.


実は最初の2つとは別のものからでもあらゆる輪のかけ方を作れる. たとえば



でもよい. この輪のかけ方を生み出す元のものを "基本群の標準生成系" と呼ぶことにする. トーラスを一つ選び, さらにその "基本群の標準生成系" をひとつ選ぶことにする. このトーラスと "基本群の標準生成系" のペアを考える. トーラス全体はどのようなものか, 前の章で見た. このトーラス一つ一つに標準生成系とのペアを考えると種類を増やす. トーラスに標準生成系つけた印をマーキングと呼ぶ. もう一度  $t$  の動く範囲を上半平面として考える. 上半平面上のそれぞれ別の場所に  $t, s$  がいても, 前の章で言った条件「 $s = \frac{at+b}{ct+d}$  をみたす整数  $a, b, c, d$  が存在して,  $ad - bc = 1$  となる」を満たせばそこからつくられるトーラスは双正則同値になるのだった. ここで  $0$  と  $1$  を結ぶ線分 (直線でもよい),  $1$  と  $t$  を結ぶ線分 (直線でもよい) に注目すると, これらの線分 (直線) はトーラス上で, "基本群の標準生成系" となっている.  $s$  のトーラスについても同じことを考えると "基本群の標準生成系" が得られる. この2つのトーラスは

「 $s = \frac{at+b}{ct+d}$  をみたす整数  $a, b, c, d$  が存在して,  $ad - bc = 1$  となる」を満たせば, 双正則同値になるのだった. つまり, 双正則な変換によって  $t$  のトーラスは  $s$  のトーラスに変形する. しかし "基本群の標準生成系" はどうかというと, 証明は省くが, 同じになる ( $t$  のトーラスを  $s$  のトーラスでうつす変換によって  $t$  の "基本群の標準生成系" をうつしたものが, トーラス上を動かすことで  $s$  の "基本群の標準生成系" に一致させられる) とは限らないのだ. 今回は, 双正則同値になるだけでなく "基本群の生成元" も含めて一致するものを同じとみなす厳しい見方を採用する.



例えば形は双正則同値でも, 次のように左の基本群の生成元が右の基本群の



生成元に写ってしまうような写像はだめなのである. 次の事実がある.

定理.  $X$  と  $Y$  からつくられるマーキングされたトーラスが同じになる

$$\Leftrightarrow t = s$$



これにより, マーキングされたトーラス全体は上半平面と一致する. この上半平面の一点一点がそれぞれ異なるマーキングされたトーラスに対応する. そして, これがトーラスのタイヒミュラー空間である.

## 参考文献

- [1] 難波誠『微分積分学』(裳華房, 1996)
- [2] 齋藤正彦『齋藤正彦線型代数学』(東京図書, 2014)
- [3] 斎藤毅『線形代数の世界 抽象数学の入り口』(東京大学出版会, 2007)
- [4] 森田茂之『講座 数学の考え方 8 集合と位相空間』(朝倉書店, 2002)
- [5] 斎藤毅『集合と位相』(東京大学出版会, 2009)
- [6] 松本幸夫『多様体の基礎』{東京大学出版会, 1988}
- [7] 野口潤次郎『複素解析概論』(裳華房, 1993)
- [8] 楠幸男『函数論 リーマン面と等角写像』(朝倉書店, 2011)
- [9] 今吉, 谷口『タイヒミュラー空間論』(日本評論社, 2004)

タイヒミュラー空間に関する日本語の本は今のところ [9] しかない。そしてその本までたどりつくには少し長い道のりがある。大学 1 年で習う解析学と線形代数学の初歩をまず学ばなくてははいけない。前者の一例として [1] を, 後者の例として [2], [3] をあげてみた。[2] より [3] の方がより高度に書かれている。そして, 大学 2 年で習う位相については [4], [5] をあげてみた。[4] より [5] の方がまた高度に書かれている。以上を踏まえて大学 3 年で習う, 多様体と複素解析の入門書としてそれぞれ [6], [7] をあげてみた。これらを踏まえ [8] の第 4 章まで読めれば, [9] の第 1 章にあるトーラスのタイヒミュラー空間の内容を数学的にきちんと捉えられるのではないかと思う。

数学書はとても多くあるにも関わらず, ごく少ない知識で選んでしまったので, ぜひ自分で書店で選んでみてください。以上です。

# 非可換幾何の呼び声 (TN)

## はじめに

いきなりで申し訳ないのですが、本稿で非可換幾何学の理論を展開することはありません。タイトル詐欺もいいところですが、幾何と作用素環の間の対応を見て、そこから非可換幾何への着想を紹介いたします。今回の  $e^{\pi i}$  sode のテーマは「わたしのえびそード」です。より数学に興味のある一般の方に向けたものということで、そういった社会人の方、中学生、高校生の方にも雰囲気だけでも感じていただきつつ、私自身の興味のある事柄についてお話させていただきます。

数学において、調べたい対象を別の何かと対応付け、対応付けたものを調べることで元の調べたい対象の性質がわかるようになる、ということしばしばあります。例えば、それなりに良い性質を持つ幾何的な対象である局所コンパクトハウスドルフ空間というものを考えます。例えば、我々の住む空間である (と思われる) 3次元実空間  $\mathbb{R}^3$  などがその例です。数直線や2次元平面も (通常の位相を考えれば) 局所コンパクトハウスドルフ空間とみなせます。さて、この局所コンパクトハウスドルフ空間の上で連続関数を定義することができます。そのような連続関数すべてを集めてくると、その集合には関数の和と積、それから複素数倍を考えることができ、数学で「多元環」、「代数」などという構造が入ります。これを連続関数環といいますが、この代数的な「環」(正確には多元環) を調べることにより、元の空間の性質がよくわかる、ということが知られています。

この連続関数環は実は  $C^*$ -環というもの1つです。 $C^*$ -環は Hilbert 空間上の有界線型作用素のなす多元環ですが、その中でも可換 (積の順序が交換可能) なもので、実は可換な  $C^*$ -環はある局所コンパクト空間上の連続関数環になります。従って一方を調べることはもう一方を調べることになります。

このような対応がありますが、 $C^*$ -環は可換なものだけでなく非可換なもの

がたくさん（それはもうたくさんです）あります。では、その非可換な  $C^*$ -環が対応しているであろう「非可換」な「空間」はどういったものなのでしょう？

今回の記事ではこのようなお話について紹介させていただきます。なお、話題の紹介を優先したため、また紙面と執筆者の気力の都合もあり証明は省略しました。（興味を持っていただけた方は参考文献を参照してください）

## $C^*$ -環

以下では少々式を用いて作用素環論の基礎を述べる。よくわからないという方は流し読みで雰囲気だけでも感じてもらえると幸いです。

### Banach 空間, Hilbert 空間

線形空間  $A$  にノルム  $\|x\|$ （まあ、絶対値みたいなものです）が定義されていて、そのノルムに関して完備である、すなわち

$$\begin{aligned} &\text{Cauchy 列 } \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \lim_{m, n \rightarrow \infty} \|x_m - x_n\| = 0 \text{ に対し} \\ &\text{その極限が存在する: } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = 0 \end{aligned}$$

をみたすとき、 $A$  を Banach 空間 という。

同様に線形空間に内積が定義され (pre-Hilbert 空間, 計量線形空間などという), 内積について完備であるとき, Hilbert 空間 という。ex) 2次元実ベクトル全体の空間

$$\left\{ \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \middle| a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

に和と実数倍を通常のベクトルの和と実数倍で定め、ノルムを通常のベクトルの長さで定めると、これは Banach 空間である。

### $C^*$ -環の定義

$A$  を Banach 空間とする。 $A$  に積  $A \times A \ni (x, y) \mapsto xy \in A$ , 写像  $A \ni a \mapsto$

$a^* \in A$  が定義され, 以下の条件を満たすとき,  $A$  を  $C^*$ -環という.

- $A$  は和と積について  $\mathbb{C}$  上の多元環である. つまり, 積について結合法則と分配法則が成り立つ.
- $\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$
- $(x^*)^* = x$
- $(x + y)^* = x^* + y^*$
- $(xy)^* = y^* x^*$
- $(\alpha x)^* = \bar{\alpha} x^*$
- $\|x^*\| = \|x\|$
- $\|xx^*\| = \|x\| \|x^*\|$

写像  $*$  :  $a \mapsto a^*$  を対合という.  $C^*$ -環  $A$  の積が可換であるとき,  $A$  は可換であるという. また,  $A$  が積について単位元をもつとき,  $A$  は unital であるという.

### \*-準同型写像

$A, B$  を  $C^*$ -環とする. 写像  $\pi : A \rightarrow B$  が

$$\begin{aligned} \pi(x + y) &= \pi(x) + \pi(y), \quad \pi(xy) = \pi(x)\pi(y) \quad \pi(\lambda x) = \lambda\pi(x) \quad \lambda \in \mathbb{C} \\ \pi(x^*) &= \pi(x)^* \end{aligned}$$

をみたすとき,  $\pi$  は\*-準同型であるという.  $\pi$  が全単射\*-準同型であるとき,  $\pi$  は同型であるという.  $C^*$ -環  $A, B$  の間に同型  $\pi$  が存在するとき,  $A, B$  は同型であるといい,  $A \simeq B$  と表す.

### $C^*$ -環の直和

$\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  を  $C^*$ -環の族とする. これに対し, 集合  $A$  を

$$A = \{(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \mid \forall x_\lambda \in A_\lambda, \sup_{\lambda \in \Lambda} \|x_\lambda\| < \infty\}$$

で定める.  $A$  に和と積, スカラー倍, 及びノルムを

- $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} + (y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} = (x_\lambda + y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$
- $(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} (y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} = (x_\lambda y_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$

## 12 非可換幾何の呼び声 (TN)

- $\alpha(x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} = (\alpha x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$
- $\| (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \| = \sup_{\lambda \in \Lambda} \| x_\lambda \|$

で定めると, これは  $C^*$ -環である.  $A$  を  $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$  の直和といい,

$$A = \sum_{\lambda \in \Lambda} \oplus A_\lambda$$

と表す.

### 重要な $C^*$ -環の例

$\Omega$  を局所コンパクト空間とする.  $C_\infty(\Omega)$  を無限遠で消える  $\Omega$  上の連続関数全体の集合とする. これに和・スカラー倍と積, 対合, ノルムを

- $(\lambda x + \mu y)(\omega) = \lambda x(\omega) + \mu y(\omega)$
- $(xy)(\omega) = x(\omega)y(\omega)$
- $x^*(\omega) = \overline{x(\omega)}$
- $\|x\| = \sup\{|x(\omega)| \mid \omega \in \Omega\}$

で定めると,  $C_\infty(\Omega)$  は可換  $C^*$ -環である.  $\Omega$  がコンパクトであるとき, かつその時に限り  $C_\infty(\Omega)$  は unital である.

局所コンパクト空間  $\Omega$  上の連続関数  $x$  が無限遠で消える (vanishing at infinity) : 任意の正数  $\epsilon > 0$  に対し, あるコンパクト集合  $K \subset \Omega$  が存在して,

$$\forall \omega \in \Omega \setminus K, \|x(\omega)\| < \epsilon$$

が成り立つ.

## Gelfand 表現

### 指標

$A$  を可換  $C^*$ -環とする. 写像  $\pi : A \rightarrow \mathbb{C}$  が 0 写像でなく,  $A$  から  $\mathbb{C}$  への  $*$ -準同型であるとき,  $\pi$  を  $A$  の指標といい,  $A$  の指標全体を  $\Omega(A)$  で表し, 指標空間という.  $\Omega(A)$  に弱\*位相, すなわち,  $A$  を  $A^{**}$  の部分空間として考えた時

に, 各  $x \in A$  を連続にする  $\Omega(A)$  上の位相であって, 和, 積, スカラー倍を連続にするようなもののうち最弱なものとする. すると, この位相に関し,  $\Omega(A)$  は局所コンパクト Hausdorff 空間になる. さらに,  $A$  が unital ならば  $\Omega(A)$  はコンパクトである.

### Gelfand 表現

写像  $\mathcal{F} : A \rightarrow C_\infty(\Omega(A))$  を

$$\mathcal{F}(x)(\pi) = \pi(x)$$

で定める.  $\mathcal{F}$  を  $A$  の Gelfand 表現という.

### Gelfand-Naimark の定理その 1

定理 .  $A$  を可換  $C^*$ -環とする.  $A$  の Gelfand 表現  $\mathcal{F}$  は  $A$  から  $C_\infty(\Omega(A))$  への等距離  $*$ -同型である.

この Gelfand-Naimark の定理により, 任意の可換  $C^*$ -環に対し, ある局所コンパクトハウスドルフ空間上の連続関数環が対応することがわかった. 実は局所コンパクトハウスドルフ空間上の連続関数環から元の位相空間を復元することができるので, この定理は可換  $C^*$ -環と局所コンパクトハウスドルフ空間が対応していることを示している. すなわち, 可換  $C^*$ -環の理論は局所コンパクト (ハウスドルフ) 空間の理論と等価とみなしてよいということである. (余談ではあるが, 圏論の言葉を用いれば, 局所コンパクトハウスドルフ空間の圏と可換  $C^*$ -環の圏が圏同値である, ということである)

かくして可換  $C^*$ -環と局所コンパクト空間という幾何学的な概念が繋がった. この定理は Grothendieck のスキーム論にも影響を与えたとされている.

では, 可換ではない  $C^*$ -環は何か幾何学的なものに対応しているとする, それはどんなものであろうか. おそらく  $C^*$ -環の非可換性を反映した, 何らかの変形を施された, いわば「非可換」な「空間」に対応しているのではないだろうか, と推察される. 可換な場合に元の幾何学的な空間の情報を引き出す手段を非可換な場合に適用することで仮想的な「非可換空間」の幾何学的な情



報を引き出すことができると言われている. そこで, もう少し一般の可換とは限らない  $C^*$ -環について調べていく.

## GNS 表現

### $C^*$ -環の表現

$A$  を (可換とは限らない)  $C^*$ -環,  $\mathfrak{H}$  を Hilbert 空間とする.  $*$ -準同型  $\pi: A \rightarrow B(\mathfrak{H})$  に対し, 対  $(\pi, \mathfrak{H})$  を  $A$  の表現という.  $\pi$  が単射であるとき, 表現  $(\pi, \mathfrak{H})$  は忠実であるという.

### 表現の直和

$C^*$ -環  $A$  の表現の族  $(\pi_\lambda, \mathfrak{H}_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$  を考える.  $\mathfrak{H}_\lambda$  の直和 Hilbert 空間を,  $\mathfrak{H};$

$$H := \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} \mathfrak{H}_\lambda$$

とする. これに対し, 表現の直和  $(\pi, \mathfrak{H})$  を

$$\pi(x) \left( (\xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \right) := (\pi_\lambda(x) \xi_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$$

で定める.

### 状態

$A$  を (可換とは限らない)  $C^*$ -環とする.  $A$  の線型汎函数  $\omega: A \rightarrow \mathbb{C}$  が

$$\forall x \in A, \omega(x^*x) \geq 0$$

をみたすとき,  $\omega$  を正線型汎函数という. 正線型汎函数は有界線型作用素である.  $\|\omega\| = 1$  をみたす正線型汎函数を状態という.

### GNS 表現の構成

$A$  を (可換とは限らない)  $C^*$ -環とする.  $A$  の正線型汎函数  $\omega: A \rightarrow \mathbb{C}$  が与えられたとき, これを用いて  $A$  の表現を構成する.

$$N_\omega := \{x \in A \mid \omega(x^*x) = 0\}$$

とすると, これは  $A$  の左イデアルであり, かつ閉集合である.  $N_\omega$  を  $\omega$  の左核という.

$x \in A$  に対し,  $\eta_\omega(x)$  で商空間  $A/N_\omega$  の剰余類  $x + N_\omega$  を表すこととする. 複素線形空間  $A/N_\omega$  に内積を

$$(\eta_\omega(x) | \eta_\omega(y)) = \omega(y^* x)$$

で定める. この内積に関して  $A/N_\omega$  を完備化して得られる Hilbert 空間を  $\mathfrak{H}_\omega$  とする.

各  $a \in A$  に対し線型作用素  $A/N_\omega \ni \eta_\omega(x) \mapsto \eta_\omega(ax) \in A/N_\omega$  を考えると, これは Hilbert 空間  $\mathfrak{H}_\omega$  上の有界作用素  $\pi_\omega(a)$  に拡張できる. そこで写像  $\pi_\omega : A \ni a \mapsto \pi_\omega(a) \in \mathcal{B}(\mathfrak{H}_\omega)$  を考えると, 対  $(\pi_\omega, \mathfrak{H}_\omega)$  は  $A$  の表現である. この表現を  $\omega$  による Gelfand-Naimark-Segal 表現, 略して GNS 表現という. この表現の構成法を GNS 構成法という.

### 普遍表現

$A$  を (可換とは限らない)  $C^*$ -環とする.  $A$  上の状態  $\omega$  全てについての表現の族  $(\pi_\omega, \mathfrak{H}_\omega)$  の直和を,  $A$  の普遍表現という.

### Gelfand-Naimark の定理その 2

定理. 任意の  $C^*$ -環  $A$  の普遍表現は忠実である. 特に,  $A$  の忠実な表現が存在する. したがって, 任意の  $C^*$ -環  $A$  はある Hilbert 空間  $\mathfrak{H}$  上の有界線型作用素のなす  $C^*$ -環  $\mathcal{B}(\mathfrak{H})$  と等距離\*-同型である.

これで可換とは限らない任意の  $C^*$ -環がある Hilbert 空間上の有界線型作用素のなす  $C^*$ -環と対応付けられることがわかった. 実は Hilbert 空間は量子力学が展開される空間であり, 有界線型作用素は量子力学における物理量を表す役割を果たしている. 作用素の積は一般に非可換であり, その非可換性が実際に物理学の中で大きな役割を果たしている. したがって, そのような意味で非可換な  $C^*$ -環は非可換な量子力学的空間と対応しているとみなせる. なお, 状態という言葉は量子力学に由来する.

その他の例として, 局所コンパクト空間上の力学系を考えると, 図形の空間

的な情報と力学系による時間発展の情報の両方を持つ非可換な  $C^*$ -環が得られる.

このように非可換な  $C^*$ -環は非可換な空間の情報を持ったものであり, それを調べることにより, 「非可換な空間」を得ることができる.

## あとがき

あまり「非可換幾何学」及びその入り口に具体的に触れる, ということはできませんでしたが, 作用素環の基礎からはじめて非可換幾何学の着想の元となる定理までを紹介いたしました. 少しでもその雰囲気味わっていただけなら幸いです.

## 参考文献

- [1] Masamichi Takesaki 「Theory of Operator Algebras」, Springer
- [2] Shoichiro Sakai 「 $C^*$ -Algebras and  $W^*$ -Algebras」, Springer
- [3] 梅垣壽春, 大矢雅則, 日合文雄 「復刊 作用素代数入門」, 共立出版株式会社
- [4] 生西明夫, 中神祥臣 「作用素環入門I 函数解析とフォン・ノイマン環」, 岩波書店

# 代数学の基本定理でみる数学の世界 (伊藤)

## はじめに

数学科展示ますらぼにお越しいただきましてありがとうございます。数学科とはどのようなことをやっている学科なのか一般の人に説明するのはなかなか難しく、一般の人に端的な説明を求められるとなかなか四苦八苦してしまうところがあります。この記事では数学科がどのようなことを勉強しているのかについて、代数学の基本定理という定理を題材に出来るだけわかりやすく説明したいと思います。この記事は第7回関西すうがく徒のつどいにおける拙講演「代数学の基本定理でみる数学の世界を更に詳しくして紙面化したものですので、講演に関してまとめたウェブ上の記事 <http://togetter.com/li/878845> も参考にしていいただければと思います。

## 代数学の基本定理とは

代数学の基本定理とは

定理．次数が1以上の複素係数一変数方程式には複素根が存在する

という定理です。具体的にはどういうことを言っているのでしょうか。例を見てみましょう。

例． $2x - 4 = 0$  というのは1次方程式ですが  $x = 2$  という解を持ちます。

例． $ax^2 + bx + c = 0$  というのは2次方程式ですが、この方程式の解の公式も中学校で習ったことでしょう。

例．3次多項式と4次方程式にも、極めて難解ですが解の公式というものがあります。これについては”カルダーノの公式”や”フェラーリの公式”

で調べてください.

これらの解の公式とは 具体的にパッチリと解のありかを求める 公式です. 一方で代数学の基本定理とは複素根が存在すると言っているだけで、どこにあるかは分からないけどとりあえず存在はするよ という定理なんです. しかし、これはどんな方程式にも解があるということを言っているものでそれは強い主張であるともいえます. この定理は1600年ごろに様々な数学者によって予想され、1800年ごろにガウスによって証明がされました. 代数学の基本定理は高校生でも証明できるような定理なのですが、その基本的さ故に様々な証明があり、大学3,4年生で習うようなことを使っても証明することができます. この代数学の基本定理と共に大学の数学とはどのようなものなのかを見てみましょう.

## 大学1年生

大学1年生で習う数学とは”解析学入門”と”線形代数学”の2つです. どちらも数学の基礎であるとともに理系の多くの学科でも使われるものです.

### 解析学入門

解析学入門は東大では”数学1”という科目名で開講されています. 微分と積分について現代数学的に学び直そうという科目です. 意識高く大学で勉強をしようと思っていた東大の1年生たちの多くがこの科目に打ちのめされて俗にいう五月病に罹患します. この解析学のつまづきやすい2つのポイントとして、 $\epsilon - \delta$  論法とコンパクトというものがあります. この2つについて見てみましょう.

#### $\epsilon - \delta$ 論法

高校数学にも極限という概念はあって、 $x$  が0に限りなく近づくとか  $n$  が  $\infty$  に発散するとかいう言葉が使われています. これを厳密に定義しようというのが  $\epsilon - \delta$  論法です. 本格的な  $\epsilon - \delta$  論法に入る前に幾つか練習をしてみましょう.

例．ある  $x$  という実数の絶対値は全ての正の数  $p > 0$  より小さいとします.これを数式で書くと以下ようになります.

$$\forall p > 0 : |x| < p$$

$\forall p$  で全ての  $p$  についてということを行っているわけです. ではこの  $x$  はどんな数なのでしょうか. $p = 0.1$  としても $|x|$  はこれより小さいです. $p = 0.0001$  としても  $|x|$  はこれより小さいです.  $p = 0.000 \cdots (0 \text{ が } 2 \text{ 億個}) \cdots 01$  よりも  $|x|$  は小さいです.これはつまり  $|x| = 0$  ということです  $x$  は  $0$  としたわけではないが, $0$  になってしまった.これが現代数学の”限りなく近い”という概念をつかむのに大事な考え方です.

例．ある  $x$  という数は全ての正の数  $p > 0$  よりも大きいとします.つまり,

$$\forall p > 0 : x > p$$

です.この  $x$  も具体的にはどんな数なのでしょうか. $p = 1000$  としても $x$  はこれより大きいです. $p = 2 \text{ 億}$  としてもこれより大きいです. これもやはり  $x$  は  $\infty$  であるということを示しているのではないのでしょうか. $\infty$  というのはきちんと定義されていませんが,  $x$  は限りなく大きいとはこのような気分なんだなということがイメージできます.

ではここで, $\epsilon - N$  論法というのを見てみましょう.

定義 ( $\epsilon - N$  論法).  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$

$$\iff \forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \quad \text{s.t.} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n > N \Rightarrow |a_n - \alpha| < \epsilon$$

突然数式がたくさん出てきて混乱したかもしれませんが落ち着いて見れば簡単です.

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$  というのを定義しているわけです.

$a_n$  が  $\alpha$  に限りなく近づくとはどういうことをなのでしょうか.

それは, 例で見たとおり, $|a_n - \alpha|$  が限りなく小さくなればいいわけです. それを表すために, $\epsilon > 0$  というとても小さな数を1つ取ってきます. それに対して, ある  $N$  を取ってきて  $N$  以降では  $|a_n - \alpha| < \epsilon$  が成り立っているよとするわけです.

例えば,1000 項目以降では, $|a_n - \alpha| < 0.001$  が,100000 項目以降では, $|a_n - \alpha| < 0.0000000001$  が成り立っていたらどんどん近づいて行くような気がしますよね.これが限りなく近づくよ,ということを言うためにまず  $\forall \epsilon > 0$  としているわけです.

例 .  $a_n = \frac{n+1}{n}$  とすると  $n \rightarrow \infty$  でこれは 1 に収束します.

実際, $|a_n - \alpha| = |\frac{n+1}{n} - 1| = |\frac{1}{n}|$  です.

例えばこの  $|a_n - \alpha|$  を 0.01 より小さくしたい!と思えば, $N = 100$  とし  
てあげれば,  $N$  項目以降では  $|\frac{1}{n}| < 0.01$  が成り立つわけです.

ここでも, $|a_n - \alpha|$  という差は  $n$  が大きくなるに連れてどんどん小さくなっていますね.

このような方法を採用するメリットとして,極限という概念がきちんと定義されて,例えば,次のような明らかに成り立って欲しい極限の性質も厳密に証明する事ができます.

問題 .  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta$  とする.

$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \alpha + \beta, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \alpha \beta$  を示せ.

同様にして  $\epsilon - \delta$  論法も見ましょう.

定義 ( $\epsilon - \delta$  論法による定義).  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

$\iff \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \quad s.t. \forall x \in \mathbb{R}, 0 < |x - a| < \delta \rightarrow |f(x) - b| < \epsilon$

これも同様の考え方です. $x \rightarrow a$  ( $x$  がどんどん  $a$  に近づく) のとき, $f(x) \rightarrow b$  ( $f(x)$  はどんどん  $b$  に近づく) ということを定義しているわけです.また  $|f(x) - b|$  を限りなく小さくするために, $|x - a|$  の幅を限りなく小さくしているわけです.

またこの  $\forall \exists$  という並びは,どんな  $\epsilon$ (とても小さいイメージ) に対しても,いちいち  $\delta$ (さらに小さいイメージ) をとってくるということを表しています.

問題 .  $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$  を証明せよ. $\epsilon > 0$  として, $\delta = \sqrt{\epsilon}$  とすれば, $0 < |x| < \delta$  ならば  $|x^2| < \epsilon = \delta^2$  を示せばよい.

## コンパクト

次に第二のつまづきポイントであるコンパクトについて触れましょう. 高校数学で次のような定理があったことを思い出しましょう.

定理 (最大値最小値の定理).  $[a, b]$  を有界閉区間,  $f$  を  $[a, b]$  上の実数値連続関数とする. このとき  $f$  は最大値および最小値にそれぞれ少なくとも一点で到達する.

これは高校数学では大した有り難みもない定理でしたが現代数学では重要です. ここで重要なのは  $[a, b]$  が有界閉区間であるという仮定と,  $f$  は連続であるという仮定です. 実際

例 (非有界).  $\mathbb{R}$  上で連続な関数  $f(x) = x$  は  $\mathbb{R}$  で最大値, 最小値を持たない.

例 (不連続).  $[-1, 1]$  上の関数  $f(x) = 1/x$  は最大値, 最小値を持たない.

という例が示すように, 有界閉区間または連続という仮定を外すとたちまちこの定理は成り立たなくなります. この有界閉区間という概念を一般化したのがコンパクトです.

定義 (コンパクト).  $X$  空間が (点列) コンパクトである

$\iff X$  内の任意の点列が  $X$  内に収束する部分列を含む

これも例を見てみましょう.

例. 开区間  $(0, 1)$  はコンパクトではない. なぜならば,  $\{1/n\}$  という数列は  $0$  に収束するが, この数列の部分列は  $(0, 1)$  内の点に収束しない.

例. 実数  $\mathbb{R}$  はコンパクトではない. なぜならば,  $\{n\}$  という数列は  $\infty$  に発散するが, この数列の部分列は  $\mathbb{R}$  内の点に収束しない.

定理.  $I \subset \mathbb{R}^n$  がコンパクトであることと有界かつ閉であることは同値

という風にコンパクトは有界閉区間の拡張になっているわけです. そして,

定理.  $I \subset \mathbb{R}^n$  をコンパクト,  $f$  を  $I$  上の実数値連続関数とする. このと



き  $f$  は最大値および最小値にそれぞれ少なくとも一点で到達する.

という定理が成り立ちます. こうして, 2 のポイントをおさらいしたところでその応用として代数学の基本定理を証明してみましょう.

**定理 (代数学の基本定理).** 次数が 1 以上の任意の複素係数一変数多項式  $p(z) = a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n$  には複素根が存在する.

**証明 [初等解析による証明]** これは杉浦光夫「解析入門 1」に載っている証明です. 証明のポイントは 3 つ.

- (1)  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |p(z)| = \infty$
- (2)  $|p(z)|$  はコンパクト集合上で最小値を取る.
- (3)  $|p(a)| > 0 \Rightarrow \exists b \in \mathbb{C} \text{ s.t. } |p(b)| < |p(a)|$  (下には下がいる) です.

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} |p(z)| = \infty$$

という意味をもう一度解釈してみましょう.

$$\forall M \in \mathbb{R} \exists R > 0 \text{ s.t. } |z| > R \Rightarrow |p(z)| > M$$

ということでした. そして  $M$  は任意ですから,  $M = |p(0)|$  として, それに対して  $R > 0$  を一つ取り,  $K = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq R\}$  とおけば,  $K$  の外では  $|p(z)| > M$  が成り立ちます. つまりこの  $K$  の中で最小値を探せばいいわけです. ところで  $K$  はコンパクトであるので

$$|p(z)| \text{ は } K \text{ 上で最小値を取る}$$

と言えます. 最後に,

$$|p(a)| > 0 \Rightarrow \exists b \in \mathbb{C} \text{ s.t. } |p(b)| < |p(a)|$$

が言えて (この証明は杉浦に譲ります) 証明終了. □

代数学の基本定理の証明は 1 年生の解析の大事な部分を使って得られるのでした.

## 大学2年生

### 解析学続論

大学1生では他に線形代数という科目を勉強しますが, この記事には関係ないので割愛します. 大学2年生では1年生で習った解析学と線形代数学の発展について学びます. 解析学では多変数の解析について学びます. ここでは線積分というものについて触れましょう. 今まで積分といえば,  $\int_a^b$  と言ったように区間  $[a, b] \subset \mathbb{R}$  上での積分を考えてきましたが, 例えば, 円周  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x^2 + y^2 = 1\}$  にそってある関数を積分したいということは数学だけでなく多くの理系分野でよくあることです. まず曲線とは何かについて考えてみましょう.

**定義.**  $I \subset \mathbb{R}$  を区間とします.  $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$  が空間曲線であるとは, 一対一の連続写像であることということである.

一対一というのは,  $a \neq b \Rightarrow \phi(a) \neq \phi(b)$  であるということですが, つまりは自己交差をしないということです. 確かに自己交差をしなくてちゃんと繋がっていないでは曲線とはいえませんね.

**例.**  $\phi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  を  $\phi(t) = (t, t)$  で定める. これは  $(0, 0)$  と  $(1, 1)$  を結ぶ直線であり, 空間曲線である.

**例.**  $\phi: [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$  を  $\phi(t) = (\cos t, \sin t)$  で定める. これは単位円周です.

それではこれらの曲線にそった積分というのを次で定めます.

**定義.**  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  を関数,  $\phi: I \rightarrow \mathbb{R}^n$  を滑らかな曲線として, この曲線の像を  $C$  で表す. 曲線  $C$  に沿った  $f$  の線積分を以下で定義する.,

$$\int_C f(x) ds := \lim_{d(\Delta) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^N f(\phi(\xi_i)) |\phi(t_i) - \phi(t_{i-1})|$$

ただし, ここでの  $\Delta$  とは区間  $I$  の分割  $t_0 < t_1 < \cdots < t_{N-1} < t_N$  を考えており  $d(\Delta)$  はその分割の最も大きい幅です.

これはリーマン積分の考え方を使った積分の定義であり, 詳しくは *episode vol.3* の”積分の歩み”を参照していただきたいのですが, 基本的には高校でならった区分求積法の考え方と同じで, 区分求積法はある区間を同じ幅で分割していましたが, それを好きな幅で分割して良いようにしたという話です. またこの積分は収束して以下のようにも表されます.

命題 .  $f, \phi, C$  を上の定義と同様とし,  $I = [a, b]$  となるときに次が成り立つ.

$$\int_C f(x) ds = \int_a^b f(\phi(x)) |\phi'(t)| dt$$

例 .  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  を  $f(x) = 1$  という定数関数にして,  $\phi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$  を  $\phi(t) = (t, t)$  で定める.

このとき

$$\int_C f(x) ds = \int_0^1 |(1, 1)| dt = \int_0^1 \sqrt{2} dt = \sqrt{2}$$

です. この積分は  $(0, 0)$  と  $(1, 1)$  を結ぶ直線の長さ  $\sqrt{2}$  を求めています.

### 複素解析

代数学の基本定理の証明方法に複素解析的な方法を使ったものがあります. 複素解析は今まで実数関数でやってきたことを複素数の範囲に拡張することによって色々な美しい結果が得られる学問です. 複素解析の主な研究対象には正則関数というものがあります. まずそれを定義しましょう.

定義 (正則関数).  $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  が正則であるとは各点で微分係数を持つということである. つまり,

$$f'(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z+h) - f(z)}{h}$$

が各  $z \in \mathbb{C}$  で収束するということである.

注意 . これだけでは普通の実数の微分可能関数と変わらないではないかと思うかもしれませんが次のようなことが成り立つことに注意しなけ

ればなりません. つまり,  $h \rightarrow 0$  としていますがこの  $h$  は複素数なので色々な  $0$  への近づき方をするという事です.  $h = x + yi$  において実部と虚部に分けたとき,  $y = 0, x \rightarrow 0$  として  $0$  に近づけたときこれは偏微分  $\frac{\partial f}{\partial x}$  になります. 一方で  $x = 0, y \rightarrow 0$  として  $0$  に近づけたとき,

$$f'(z) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(z + yi) - f(z)}{yi} = -i \frac{\partial f}{\partial y}$$

であり,

$$f'(z) = \frac{\partial f}{\partial x} = -i \frac{\partial f}{\partial y}$$

が成り立つ必要があります. この関係をコーシー・リーマンの関係式といいます.

次に  $\mathbb{C}$  の部分集合として重要な単連結領域というのを定義しますが, これは”便利な領域”として考えて頂いて構いません.

定義 (単連結領域).  $D \subset \mathbb{C}$  が単連結領域であるとは, 連結な開集合であって  $D$  内の任意の閉曲線は 1 点にホモトピックであるようなものである.

1 点とホモトピックであるとはこの記事の後半を参照していただきたいのですが, 単連結領域とは穴がない領域をイメージしてください. そうすると以下のように重要な定理が成り立ちます.

定理 (コーシーの積分定理と積分公式).  $D$  を単連結領域とし,  $f(z)$  は  $D$  上で正則である複素関数とすると,  $C$  を  $D$  内にある長さを持つ単純閉曲線とする.

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

$a$  をまた  $C$  によって囲まれる領域に属する点とする.

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - a} dz$$

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{(z - a)^{n+1}} dz$$

この定理の意味とは  $f(z)$  が正則であれば, どんな閉曲線上で積分してもその値は 0 になるということと, 逆に  $a$  という一点でだけ正則でないような  $\frac{f(z)}{z-a}$  という関数を積分するときは  $f(a)$  の値のみを考えればよいという意味です. この *episode* にある荒田さんの記事も参考になります. 実際に例を見てみましょう.

例 (コーシーの積分公式の例).  $f(z) = 1, C = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| = r\}$  のときコーシーの積分公式.

$$1^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{|z-a|=r} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz$$

となりますが

$$\int_{|z-a|=r} \frac{1}{(z-a)^{n+1}} dz = \begin{cases} 2\pi i & (n=0) \\ 0 & (n \geq 1) \end{cases}$$

に他ならなりません.

正則関数がどれだけ関数に強い条件を課しているかというのは次の定理でわかります.

定理 (リュービルの定理). 複素平面全体で正則かつ有界な関数は定数関数のみ.

証明

この証明は, 藤本坦孝「複素解析」に載っている証明です. 証明のポイントは以下の 3 つです.

- (1)  $f$  有界つまり  $\forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq M$  かつ  $f$  正則を仮定する.
- (2) 仮定を満たす関数は正則より  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$  とべき級数展開可能
- (3)  $c_n$  は  $\forall R > 0 : |c_n| \leq \frac{M}{R^n}$  をみたす. (ここでコーシーの積分公式が使われている) □

このリュービルの定理を用いて代数学の基本定理を証明する事ができます.

証明 [リュービルの定理を用いた代数学の基本定理の証明]

この証明は Lars Valerian Ahlfors 「Complex Analysis」に載っている証明です. 証明のポイント:

- (1)  $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$  が零点を持たないと仮定する (背理法)
- (2)  $g(z) = \frac{1}{p(z)}$  は  $\mathbb{C}$  上で正則となる
- (3)  $\lim_{|z| \rightarrow \infty} |g(z)| = 0$  となる.
- (4) 上から  $g$ : 有界であることが言え, Liouville より定数となり矛盾.  $\square$

複素解析の一つの目標として留数計算というものがあります. コーシーの積分公式では分数型の 1 点のみで正則でない関数の積分を考えましたが, 今度は他の形の正則でない点が複数ある場合でも積分計算を試みようというものです.

定義 (留数).  $f$  が環状領域  $\Delta(a, r, R) = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - a| < R\}$  で正則とする. このとき

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - a)^n$$

という風に展開できて, これを  $f$  のローラン展開という.

特に  $\Delta(a, 0, R)$  で正則 ( $a$  のみ孤立して正則でない) とき,  $a_{-1}$  のことを  $f$  の  $a$  での留数といい  $\text{Res}_a f$  とかく.

例.  $\frac{1}{z-c}$  という関数を  $|z| > |c|$  でローラン展開すると.

$$\frac{1}{z-c} = \frac{1}{z} + \frac{c}{z^2} + \frac{c^2}{z^3} + \cdots$$

定理 (留数定理).  $D$ : 区分的  $C^1$  境界を持つ領域.  $f: \overline{D} \setminus \{p_1, \dots, p_n\}$  で正則とする.

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} f(z) dz = \sum_{i=1}^n \text{Res}_{p_i} f$$

この留数定理とは,  $f$  という関数を積分する際は,  $p_i$  という点での留数のみを考えればよいと言っているわけです. 留数を計算するのに便利な次の公式を紹介します.

命題 . (1)  $z = a$  に於いて  $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z)$  が有限確定値を持つとき,

$$\operatorname{Res}_a f = \lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z)$$

(2)  $z = a$  に於いて  $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)^m f(z)$  が有限確定値を持つとき,

$$\operatorname{Res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f(z))$$

(3)  $g, h$  を正則関数として,  $g(a) \neq 0, h(a) = 0, h'(a) \neq 0$  ならば

$$\operatorname{Res}_a \frac{g}{h} = \frac{g(a)}{h'(a)}$$

$\lim_{z \rightarrow a} (z - a)^m f(z)$  が有限確定値を持つとき,  $a$  は  $m$  位の極であるといいますが,  $m$  位の極の留数を計算するときは  $(z - a)^m f(z)$  という正則関数のテイラー展開を考えてあげればいいという話です. 正則関数の零点に関して次のような定理が成り立っています.

定理 (偏角の原理).  $D$  : 今までと同様.  $f$  : 正則とする.

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = (f \text{ の } D \text{ 内の重複度込みの零点の個数})$$

定理 (ルーシェの定理).  $D$  : 区分的に  $C^1$  な境界を持つ有界領域  
 $f, g : D$  とその境界上で定義された正則関数.

$\forall z \in \partial D : |f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$  が成り立つとする.

このとき,  $f$  と  $g$  の零点の個数は等しい.

ルーシェの定理は  $f$  と  $g$  の零点の個数を見たいときにその境界上のみで  $f, g$  の様子を考えると上げればいいという定理です.

証明

定理・証明ともに平地健吾先生に教えて頂きました. 証明のポイント

(1)  $F_t(z) = (1-t)f(z) + tg(z)$  は 0 にならない

(2)  $N_t = \int_{\partial D} \frac{F'_t(z)}{F_t(z)} dz$  は偏角の原理より  $F_t$  の零点の個数だがこれは  $t$  について連続.

(3) ( $f$  の零点の個数)  $= N_0 = N_1 = (g$  の零点の個数) □

この定理を用いて代数学の基本定理を証明する事ができます.

証明 [ルーシェの定理を用いた代数学の基本定理の証明]

$f(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$  と  $g(z) = a_n z^n$  とおく.  
 $|f(z) - g(z)|$  は  $n - 1$  次式,  $|f(z)| + |g(z)|$  は  $n$  次式より,  
 十分大きな円周上では  $|f(z) - g(z)| < |f(z)| + |g(z)|$  が成り立つ.  
 よって  $f$  の零点の個数は  $n$  個 □

問題. 実はルーシェの定理まで行かなくても偏角の原理のみで代数学の基本定理を証明する事ができます. 各自考えてみてください.

### 集合と位相

ここでは位相空間論というものについて触れましょう. 今までは  $\mathbb{R}^n$  のみで連続や収束という概念を考えて来ましたが, これを任意の集合に対して扱えるようにするのが位相空間論の一つの目標です.

定義 (位相空間).  $X$  を集合とする.  $X$  の部分集合からなる集合  $\mathcal{O}$  が  $X$  の開集合系である.

$\iff$  (1)  $(U_i)_{i \in I}$  が  $\mathcal{O}$  の族ならば,  $\cup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$   
 (2)  $(U_i)_{i \in I}$  が  $\mathcal{O}$  の有限族ならば,  $\cap_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$

また  $\mathcal{O}$  に属する元を  $X$  の開集合といい,  $(X, \mathcal{O})$  を位相空間という. また閉集合とは開集合の補集合になっているものと定義します.

このようにして任意の集合に対して好きな開集合だけを集めてきて空間の構造を与えられることができるわけです.

例. 自然数の集合  $\mathbb{N}$  に対して次のような位相を与えることができる.

- (1)  $\mathcal{O} = \{\emptyset, \mathbb{N}\}$
- (2)  $\mathcal{O} = \{U \subset \mathbb{N} \mid U \text{ は } \mathbb{N} \text{ の部分集合}\}$
- (3)  $\mathcal{O} = \{\mathbb{N} \setminus I \mid I \subset \mathbb{N} \text{ は有限部分集合}\}$

これらの例は全て開集合系の定義を満たしていますので, これらにより  $\mathbb{N}$  を位相空間とできます.

(1) を密着位相, (2) 離散位相, (3) を補有限位相と言います.



ここで収束を位相空間の言葉で書いてみましょう

定義 . 位相空間  $X$  の点列  $\{x_n\}$  が  $x$  に収束する

$$\iff \forall U : x \text{ を含む開集合 } \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow x_n \in U$$

こう見てみると  $U$  とは  $\varepsilon - \delta$  のように  $\varepsilon$  とっていることがわかります. つまり, 位相空間とは開集合によって, 集合に近いという考え方を与えているわけです. こう考えてみると, (1) の密着位相は全ての点と同じ開集合に属しており, 近いところにいるという意味で”密着”しています. (2) の離散位相は, 全ての 2 点は別々の開集合に入れることができるので”離散”しています.

ここで, 集合に (1)(3) の場合の収束について見て見ましょう.

例 .  $x_n = n$  という  $\mathbb{N}$  内の点列を考える.

このとき, (1)(3) の位相構造において  $x_n$  は任意の点に収束する.

(1) の場合. 例えば, 1 に収束することを示してみましょう. 1 を含む開集合は  $\mathbb{N}$  だけですから,  $n \geq 1 \Rightarrow x_n \in \mathbb{N}$  が成り立ちます. よって,  $x_n$  は 1 に収束します.

(3) の場合.  $U$  を 1 を含む開集合とします. これは  $\{a_1, \dots, a_n\}$  という有限集合の補集合になっています.

よってこれらの最大値を  $N$  とおくと,  $n \geq N + 1 \Rightarrow x_n \notin \{a_1, \dots, a_n\}$  (最大値より大きいので) が成り立つので,

$$\iff \forall U : 1 \text{ を含む開集合 } \exists N \in \mathbb{N} \text{ s.t. } n \geq N \Rightarrow x_n \in U$$

が示せました. 同様にして,  $x_n$  は任意の点に収束することがわかります. 一方で (2) の場合は  $U = \{1\}$  という開集合に対して  $N$  が取ってこれないので任意の点に収束しません.

次のような扱いやすい空間が定義されます.

定義 .  $X$  : 位相空間,  $A \subset X$  がコンパクトである.  $\iff$

$$A \subset \cup_{i \in I} U_i \Rightarrow \exists \{i_1, \dots, i_n\} \subset I \text{ s.t. } A \subset U_{i_1} \cup \dots \cup U_{i_n}$$

例 . (1)(3) はコンパクトである. (2) はコンパクトではない.

位相空間がコンパクトであるという概念については斎藤毅「はじめはコンパクト」や斎藤毅「集合と位相」に詳しく解説されています。また、最初に定義した点列コンパクトとコンパクトという概念は一致します。

定義． $X$  がハウスドルフ空間である． $\Longleftrightarrow$

$x, y \in X, x \neq y \Rightarrow \exists U : x \text{ の開近傍}, \exists V : y \text{ の開近傍 } s.t. U \cap V = \emptyset$

例．(1)(3) はハウスドルフではない．(2) はハウスドルフである。

また連結という概念も位相空間の言葉を使って定式化することができます。

定義． $X$  が連結空間である． $\Longleftrightarrow$

$X$  の部分集合で開集合かつ閉集合であるようなものは、 $\emptyset$  と  $X$  のみ。

例． $(0, 1) \cup (2, 3) \subset \mathbb{R}$  は連結空間ではない。

実際、区間  $(0, 1)$  は開集合でかつ、 $(2, 3)$  という開集合の補集合になっているので閉集合です。

これはこの区間が繋がっていないことによって起こる結果です。

ここで連続写像の概念も極めてシンプルに一般化されます

定義． $f : X \rightarrow Y$  が連続写像である． $\Longleftrightarrow$

$U \subset Y$  が開集合ならば  $f^{-1}(U) \subset X$  は開集合。

次の定理は、連続写像の性質を表すとともに、最大値最小値の定理と中間値の定理を一般化したものとも言えます。

定理． $X, Y$  を位相空間として、 $f : X \rightarrow Y$  を連続写像とする。

(1)  $A \subset X$  がコンパクトならば  $f(A) \subset Y$  もコンパクトである。

(2)  $A \subset X$  が連結ならば  $f(A) \subset Y$  も連結である。

注意．一方で

(3)  $A \subset X$  が開集合ならば  $f(A) \subset Y$  も開集合である。

(4)  $A \subset X$  が閉集合ならば  $f(A) \subset Y$  も閉集合である。

はどちらも一般には成り立ちません. これらが成り立つ写像をそれぞれ, 開写像, 閉写像といいます.

証明 [位相空間論における代数学の基本定理の証明] この証明は斎藤毅「集合と位相」に載っている証明です.

$f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  を多項式が定める写像とすると,

正則関数の一般論から  $f$  は開写像であることが言える.

また  $\mathbb{C}$  の一点コンパクト化である  $\mathbb{C}P^1$  を考えることにより,  $f$  は閉写像であることがわかります.

よって,  $\mathbb{C}$  は連結空間で  $f(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C}$  は開かつ閉であり, 空集合でないので  $f(\mathbb{C}) = \mathbb{C}$  がいえます.

つまり, この多項式には 0 点が存在します. □

## 大学3年生

### 多様体

多様体とは位相空間の中でも特に重要なもので, 幾何学の主な研究対象です.

定義 (多様体).  $M$  が  $n$  次元の ( $C^\infty$  級) 多様体であるとは  $M$  がハウスドルフ空間であり, 次のような開近傍  $U_i$  と同相写像  $\phi_i: U_i \rightarrow \phi_i(U_i) \subset \mathbb{R}^n$  が存在することである.

$$\bigcup_i U_i = M$$

$U_i \cap U_j \neq \emptyset$  のとき, 次の座標変換が  $C^\infty$  級である.

$$\phi_i \circ \phi_j^{-1}|_{\phi_j(U_i \cap U_j)}: \phi_j(U_i \cap U_j) \rightarrow \phi_i(U_i \cap U_j)$$

突然仰々しい定義が出てきましたが, 多様体の 2 目の性質は局所ユークリッド的と言われるものです. つまり, 位相空間で連続写像については考えることが出来ましたが, 微分を考えることはまだ出来ません. そこで, 位相空間のある一部を見てあげればそれはユークリッド空間であるとみなせるものを多様体としたのです. つまり, 多様体は好きなとこ

ろに座標を入れることができ、かつ好きな用にいれた座標はちゃんとうまく合わさっているよというのがこの定義です。幾何学の主な対称と言いましたが、例えば有名なポアンカレ予想は多様体に関する次のような定理です。

定理 (ポアンカレ予想)。

$M$  多様体,  $M$  と  $S^n$  がホモトピー同値ならば  $M$  は  $S^n$  と同相である  
 $n = 2$  については 2 次元多様体の分類は 20 世紀はじめに知られており,  
 $n = 3$  コンパクトかつ単連結ならば 3 次元多様体は  $S^3$  と同相である。と  
 いうことがポアンカレによって予想されました。

$n \geq 5$  のときはスモールが解決,  $n = 4$  はフリードマンが解決,  $n = 3$  のときはペレルマンが解決しました

このように、数学の一つの目標にある概念を 分類 するというものがあります。分類することによって、今まで雑然と広がっていた世界が綺麗に掃除され見通しよくなるというのが数学の 1 つの仕事です。では多様体での微分について定義しましょう。

定義 . 多様体  $M_1, M_2$  を考える . 写像  $F : M_1 \rightarrow M_2$  が  $C^\infty$  級であるとは、 $F(x) \in M_2$  のまわりの座標近傍  $(V, \psi)$ ,  $F^{-1}(V)$  に含まれる  $x \in M_1$  のまわりの座標近傍  $(U, \phi)$  に対して、 $\psi \circ F \circ \phi^{-1} : \phi(U) \rightarrow \psi(V)$  が  $C^\infty$  級となることである。

ユークリッド空間内の多様体のみを考えて  $f : M \rightarrow N, M \subset \mathbb{R}^k, N \subset \mathbb{R}^l$  の微分を考える。

$$df_x = \left( \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right) : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^l$$

という行列で定める。

定義 .  $x \in M$  が正則点  $\iff df_x$  が全射。

$x \in M$  が特異点  $\iff df_x$  が全射でない。

$y \in N$  が正則値  $\iff f^{-1}(y)$  が全て正則点。

$y \in N$  が臨界値  $\iff f^{-1}(y)$  が特異点を元として含む。

証明 [多様体論を用いた代数学の基本定理の証明]

この証明は John Willard Milnor "Topology from the Differentiable Viewpoint" に載っている証明です. 証明のポイント

- (1)  $p(z) : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  を今までどおりの多項式とする.
- (2)  $h : S^2 \rightarrow \mathbb{C}$  というステレオグラフィック射影によって,
- (3)  $h^{-1} \circ p \circ h : S^2 \rightarrow S^2$  を定める.
- (4)  $f$  が  $C^\infty$  級写像であることを示す.
- (5)  $f$  は有限個の臨界点しか持たない.
- (6)  $f$  の球から正則値の集合は有限を除いたものなので連結.
- (7)  $\#f^{-1}(y)$  は開近傍上で定数であるので常に 0 でない.

□

### 群論

代数学が扱う対称として基本的でシンプルなものが群です. 群は集合に掛け算のみが入ったものを考えており, 例えば今まで習ってきた, 整数や実数や群といったものは全て群です. 群の定義は以下の様なものです.

定義 . 集合  $G$  が群であるとは,  $G$  上の二項演算が  $x, y, z \in G$  に対して以下を満たすことである.

- (i)  $(xy)z = x(yz)$
- (ii)  $\exists e \in G \text{ s.t. } xe = ex = x$
- (iii)  $\forall x \in G \exists x^{-1} \in G \text{ s.t. } xx^{-1} = x^{-1}x = e$

さらに,  $xy = yx$  を満たすとき  $G$  をアーベル群という.

また群の部分集合にも同じ演算の構造が入る場合に部分群といいます. つまり次のような定義です.

定義 . 部分集合  $H \subset G$  が

$$\forall x, y \in H : xy \in H, \quad \forall x \in H : x^{-1} \in H, \quad e \in H$$

を満たすとき  $H$  を  $G$  の部分群という.

また部分群の中で扱いやすいものを定義します.

定義 .  $N \subset G$  : 部分が正規部分群である

$$\iff \forall g \in G : gNg^{-1} \subset N$$

例えばアーベル群では全ての部分群は正規部分群です.

定義 . 群  $G, G'$  があったとして,  $f : G \rightarrow G' \forall x, y \in G f(xy) = f(x)f(y)$  をみたす  $f$  を群準同型写像という.

特に  $f$  が準同型で全単射であるとき, 同型写像であるという.

ここで群論で重要なシローの定理について触れておきましょう.

定義 .  $G$  : 有限群,  $p$  : 素数とする.  $G$  が  $p$  群  $\iff |G|$  が  $p$  のべき乗個.  $G$  の部分群でかつ  $p$  群であるものを  $p$  部分群.

$|G| = p^e m, m, p$  は互いに素なとき, 元の個数が  $p^e$  個の群をシロー  $p$  群という.

定理 (シローの定理).  $G$  : 有限群,  $p$  : 素数とする.

(I) シロー  $p$  部分群が存在する.

(II)  $(p \text{ シロー部分群の個数}) \equiv 1 \pmod{p}$

(III)  $\forall P$  : シロー  $p$  群,  $\forall Q$  :  $p$  部分群,  $\exists x \in G$  s.t.  $Q \subset xPx^{-1}$

これは有限群を分類する際にとっても便利な定理です.

## ガロア理論

ガロア論とは, 体という四則演算が入った集合の拡大を考える理論で, 体の拡大とそのガロア群を対応させることができるという理論です.

定義 .  $K \subset L$  に体の構造であるとき,  $L$  は  $K$  の拡大であるという.

定義 .  $L$  の同型で, かつ  $K$  上では恒等写像なもの全体を  $\text{Aut}_K(L)$  とかく.  $\# \text{Aut}_K(L) = [L : K]$  のとき  $L$  は  $K$  のガロア拡大であるといい,  $\text{Aut}_K(L)$  をガロア群という.

例 .

$$[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2, \text{Aut}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}) = \{\sigma_1, \sigma_2\}$$

ただし,  $\sigma_1$  は恒等写像,  $\sigma_2$  は複素共役写像である.

定理 .  $L/K$  を有限次ガロア拡大,  $G$  をそのガロア群とする . (1)  $L/K$  の中間体  $M$  と  $G$  の部分群  $H$  の間に次の一対一対応がある :

$$M \rightarrow G(L/M), F(H) \leftarrow H$$

(2)  $M$  と  $H$  が対応するとき,  $L/M$  はガロア拡大で  $H$  はそのガロア群である . そして

$$[L : M] = |H|, [M : K] = |G : H|$$

(3)  $M$  と  $H$  が対応するとき,  $M/K$  がガロア拡大であることと  $H$  が  $G$  の正規部分群であることは同値である . さらにこのとき

$$G(M/K) \cong G/H.$$

このガロア理論を用いても代数学の基本定理を証明する事ができます.

証明 [Galois 理論による証明のポイント]

雪江明彦「代数学 2 環と体とガロア理論」に同様の証明が載っています.

- (1)  $K/\mathbb{C}$  を有限次拡大とする.(背理法)
- (2)  $K/\mathbb{R}$  は正規拡大であるとして一般性を失わない.
- (3)  $K/\mathbb{R}$  は Galois 拡大になる.
- (4)  $G := \text{Gal}(K/\mathbb{R})$  とする,  $H \subset G$  を 2-Sylow 群とすると, これに対応する拡大は奇数次拡大で,  $\mathbb{R}$  そのものしかない.
- (5)  $[K : \mathbb{C}] > 1$  で  $2^n$  であるとする,  $\text{Gal}(K/\mathbb{C})$  が 2-群になって,  $\mathbb{C}$  が二次拡大をもつことになる.

□

## 代数トポロジー

多様体論では,

定義 .  $X_n$  : 加群,  $\partial_n : X_n \rightarrow X_{n-1}$  の組が複体である.  $\iff \partial_n \circ \partial_{n+1} = 0$

定義 . ここで,  $\text{Ker } \partial_n = \{x \in X_n | \partial_n x = 0\}$ ,  $\text{Im } \partial_{n+1} = \{x_n \in X_n | \exists x_{n+1} \in X_{n+1} \text{ s.t. } x_n = \partial_{n+1} x_{n+1}\}$

とくと,  $\text{Im } \partial_{n+1} \subset \text{Ker } \partial_n$  は部分加群であり,  $H_n(X) = \text{Ker } \partial_n / \text{Im } \partial_{n+1}$  をホモロジー群という.

定義 .  $\{X_n, \partial_n\}, \{X'_n, \partial'_n\}$  : 複体とする. 写像  $f_n : X_n \rightarrow X'_n$  が鎖準同型である.  $\iff f_{n-1} \circ \partial_n = \partial'_n \circ f_n$

定理 .  $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} | |x| = 1\}$  とすると,  $H_k S^n = \mathbb{Z} (k = 0, n), H_k S^n = 0 (k \neq 0, n)$

定理 .  $f : S^n \rightarrow S^n$  を写像とすると, これは  $f_* : H_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$  を引き起こす.

これは  $\mathbb{Z}$  間の準同型であるので,  $f_*(x) = kx$  とおけて, この  $k$  を  $\deg(f)$  と置いて, 写像度という.

命題 . (i)  $\deg(id) = 1$

(ii)  $\deg(f \circ g) = \deg(f) * \deg(g)$

(iii)  $f \simeq g \Rightarrow \deg(f) = \deg(g)$

証明 [代数トポロジー的な代数学の基本定理の証明]

この証明は, Albrecht Dold 「Lectures on Algebraic Topology」 に載っている証明です. 証明のポイント

- (1)  $\hat{p} : S^1 \rightarrow S^1; z \rightarrow \frac{p(z)}{|p(z)|}$  により定める.
- (2)  $|z| \leq 1$  で 零点を持たないならば  $\deg \hat{p} = 0$  をしめす
- (3)  $p_t(z) = \frac{p(tz)}{|p(tz)|}$  による.
- (4)  $|z| \geq 1$  で 零点を持たないならば  $\deg \hat{p} = n$ .
- (5)  $p_t(z) = \frac{t^k p(z/t)}{|t^k p(z/t)|}$  による

□

## 微分幾何学

定義 .  $\{g_p\}_{p \in M}$  が Riemann 計量である.

$\iff (1) g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$  は内積.



(2)  $s_1, s_2 : U \rightarrow TM$  : 切断とすると,  $g_p(s_1(p), s_2(p))$  は  $C^\infty$  級

定理.  $M$ :境界つきコンパクト Riemann 多様体.  $K$  を  $M$  のガウス曲率.  $k_g : \partial M$  の測地曲率.

$$\int_M K \, dA + \int_{\partial M} k_g \, ds = 2\pi\chi(M)$$

証明 [微分幾何学による代数学の基本定理の証明]

この証明は <http://arxiv.org/pdf/1106.0924.pdf> に載っている証明です. 証明のポイント

$p(z)$  が零点を持たないと仮定する.

$p^*(z) = z_n p(1/z) = a_0 z_n + a_1 z_n - 1 + \cdots + a_n$  として,  $f(z) = p(z)p^*(z)$  とする.

$$f\left(\frac{1}{w}\right) = p\left(\frac{1}{w}\right)p^*\left(\frac{1}{w}\right) = w^{-2n}p^*(w)p(w) = w^{-2n}f(w)$$

$$w \in \mathbb{C} : g = \frac{1}{|f(w)|^{\frac{2}{n}}} |dw|^2$$

$$w \in \hat{\mathbb{C}} \setminus \{0\} : g = \frac{1}{|f(1/w)|^{\frac{2}{n}}} |d(1/w)|^2 \text{ とする}$$

$$\frac{1}{|f(w)|^{\frac{1}{n}}} K_g = \frac{1}{n} \Delta \log |f(w)| = \frac{1}{n} \Delta \operatorname{Re}(\log f(w)) = 0 \quad \int_{S^2} K_g = 4\pi \text{ により矛盾.}$$

□

## 確率論

証明 [確率論による代数学の基本定理の証明] この証明は L. C. G. Rogers, David Williams 「Diffusions, Markov Processes, and Martingales: Volume 1, Foundations」に載っている証明です. 証明のポイントは. (1)  $(B_t : t \geq 0)$  をブラウン運動とする.

(2)  $f(z) = 1/p(z)$  とおくと, これは正則で,  $z \rightarrow \infty$  で 0 に収束する.

(3)  $\alpha < \beta$  として  $\{\operatorname{Re} f \leq \alpha\}$  と  $\{\operatorname{Re} f \geq \beta\}$  は開集合を含む.

(4)  $f(B_t)$  はマルチンゲールの収束から,  $f(B_t) \rightarrow f(B_\infty)$  に  $L^1$  収束する

(5) 一方でこれはブラウン運動の再帰性に矛盾する.

□