

1. (a) Komplexa tal läggs ihopp som vektorer.

$$(3 + 4i) + (5 - i) = 8 + 3i$$


- (b) För z_1 så är radien $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ och för z_2 är $\sqrt{5^2 + 1^2} = \sqrt{26}$

Vinkeln räknas ut med den inversa tangent funktionen för lutningen av vektorn som pekar mot talet. För z_1 är denna $\theta = \tan^{-1}(\frac{4}{3})$ och för z_2 är denna $\theta = \tan^{-1}(-\frac{1}{5})$

Så multiplicerar man dom

$$5e^{\tan^{-1}(\frac{4}{3})}\sqrt{26}e^{\tan^{-1}(-\frac{1}{5})} = 5\sqrt{26}e^{\tan^{-1}(4/3)+\tan^{-1}(-1/5)}$$

- (c) från förra uppgiften vet vi att vinkeln för $z_2 = \tan^{-1}(-1/5) = \arg(z_2) \approx -11.31$. Denna vinkel är trovärdig om man kollar på bilden nere.



2. (a) Med radien 5 och vinkeln $\pi/3$ så skrivs den som $5e^{i\pi/3}$


(b)

$$5\cos(\pi/3) + i5\sin(\pi/3) = \frac{5}{2} + i\frac{5\sqrt{3}}{2}$$

3. denna kan skrivas om som $z^2 - 6z + 13 = 0$ vilket är en simpel andragradsekvation som kan lösas med pq-formeln

$$-\frac{-6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 13} = 3 \pm \sqrt{-4} = 3 \pm 2i$$

Grafiskt kan man se detta som två ställen där talen convergerar. Runt de områdena är dom nära noll, och precis vid $3 \pm 2i$ är transformerat den till noll punkten.




4.

$$\frac{10(1-2i)}{1+2i(1-2i)} = \frac{10-20i}{1+4} = 2-4i$$

5. För att utföra detta skrivs formen om till $a+bi$ form.

$$\frac{(2-3i)(1-ai)}{(1+ai)(1-ai)} = \frac{2-2ai-3i-3a}{1+a^2} = \frac{2-3a}{1+a^2} - \frac{2a+3}{1+a^2}i$$

Vilket bildar en cirkel om man plottar alla värden av a , där punkten $2-3i$ är där $a=0$ och där negativa a bildar den övre-högra delen av cirkeln medans positiva ger dom nere till vänster. Interessant att påpeka hur tvåorna och treorna i ekvationen verkar korrelera med där dess intersektion. Gränsvärdet när a närmar sig oändlighet eller minus oändlighet är 0.



Frågan är, vid vilket a skär den reella linjen d.v.s 2? Man tar man ekvationen och sätter att den imaginära delen är 0.

$$-\frac{2a+3}{1+a^2}i = 0 \Rightarrow -2a = 3 \Rightarrow a = -3/2$$

6. Ekvationen löses som

$$z = \sqrt[3]{i27} = -i3$$

. Från den fundamentala satsen av algebra finns det två rötter till. Vi skriver om då

$$27i = 27e^{i\pi/2} \Rightarrow z = \sqrt[3]{27e^{i\pi/2}} = 3e^{i\pi/6}$$

7.

$$z_1 = 2e^{-5\pi/18}$$

$$z_2 = 3e^{4\pi/18}$$

$$\arg(3z_1 \cdot 2z_2) = \arg(2 \cdot 3e^{-5\pi/18+4\pi/18}) = \arg(6e^{-\pi/18}) = -\frac{\pi}{18}$$

Detta är logiskt då vi tar ett tal med vinkeln 40 grader minus ett med vinkeln 50 grader, så att summan blir minus 10 grader.

8. Vi vet att en rot är 0.5, så med hjälp av faktorisering

$$(x - 0.5)(x^2 - 6x - 16)$$

Och sedan löses andragradsekvationen

$$(x - 0.5)(x - 8)(x + 2)$$

Vilket kan konstateras grafiskt

