

1. hi
2. Normalkraften är summan av centripetalaccelerationen och gravitationskraften.

$$A_c + mg = N$$

När N är mindre än noll så kommer bilen att stanna kvar på marken. Annars kommer bilen accelerera uppåt i luften.

$$mg = A_c \rightarrow N = 0$$

$$mg = mv^2/r$$

$$gr = v^2$$

$$\sqrt{gr} = v$$

Och med värdena $g=9.8$ och krökradien $r=80$ meter så får vi

$$\sqrt{80 \cdot 9.8} = 28$$

Alltså, så länge $v = 28$ så stannar bilen på marken. Så den högsta hastigheten den klarar av är då 28 m/s eller runt 100km/h, för då är $N=0$ och då kan ingenting hålla kvar bilen på marken.

3. Ekvationen för det totala arbetet i en fjäder är följande (Fundamentals Of Physics, ,2000, s. 422):

$$W = \frac{1}{2}kx^2$$

Denna ekvation innehåller fjäderkonstanten k som här räknas ut först. Antalet Newtons som krävdes är en bra ledtråd, då ekvationen $F = kx$ blir $105 = k \cdot 0.35$. $0.35 \text{ m} = 35 \text{ centimeter}$ och 105 är kraften i newton som gavs i uppgiften. Då får man att $k = \frac{105}{0.35} = 300 \text{ N/m}$.

Då blir x i följande ekvation 0.5m vilket är en halvmeter.

$$W = \frac{1}{2}300 \cdot 0.5^2 = 37,5$$

Och svaret på frågan blir då 37.5 Joules.

4. (a) För att framställa ekvationen av typ $asin(\omega t)$ som visar fjärdens elongation krävs det att ω , den rotationella hastigheten, löses ut. Detta kräver två fakta:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow \frac{1}{\omega} = \sqrt{\frac{m}{k}}$$

Och

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\frac{1}{\omega}$$

Som då löser ut sig till

$$\omega = 2\pi\frac{1}{T} = 2\pi f$$

Detta ger oss då ekvationen för viktens position i fjädern som en funktion av tid

$$a \sin(2\pi f \cdot t)$$

Newtons andra lag säger att $F = ma = m(x)''$ Så då deriveras ekvationen

$$(x)' = 2\pi f \cdot a \cos(2\pi f \cdot t)$$

$$(x)'' = -4\pi^2 f^2 \cdot a \sin(2\pi f \cdot t)$$

Avståndet från jämnvikten är 0.10 meter. Detta kan även beskrivas som

$$a \sin(2\pi f \cdot t) = 0.1$$

Löser ut för t

$$t = \frac{\sin^{-1}(0.1a^{-1})}{2\pi f} \approx \sin^{-1}(0.67)/(2 \cdot 3.14 \cdot 1/1.5) \approx 0,17s$$

Kraften vid den punkten blir då

$$F = m(x)'' \approx -0.350 \cdot 4\pi^2 \frac{1}{1.5^2} \cdot 0.15 \sin(2\pi \frac{1}{1.5} \cdot 0.17) \approx -0.92 \sin(0.71) \approx -0.61$$

Kraften blir då alltså -0.61 Newtons.

(b) Vi vet att $F=kx$.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow k = 4\pi^2 \frac{m}{T^2} \approx 39.5 \frac{0.350}{1.5^2} \approx 6,14$$

Vi vet från uppgiften att $x = 0.1$ Så då blir kraften $0.1 \cdot 6.14 = 0.614$ Newtons.

5. om dom är likadana så antar jag att detta innebär att $k_1 = k_2 = k$ och $a_1 = a_2 = -g$ och $x_1 = x_2 = x$. $-mg = kx$. $mg/x = k$