


1. I uppgiften görs ett antagande att den även begränsas av y-axeln.



Eftersom rotationen sker kring x-axeln så blir värdet på y radien, och då används formeln

$$\pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

I figuren så kan man observera att integralen går från 0 till 5


$$\pi \int_0^5 (x^2)^2 dx = \pi \int_0^5 x^4 dx$$

Som då integreras

$$\Rightarrow \pi \left( \frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^5 = \pi 5^5 / 5 = \pi 625 v.e$$

2. Radien i denna uppgift blir istället radien  $x$ . Då hamnar  $x$  på  $x = y^2$ . Vilket grafiskt kan tänkas som att funktionerna  $x^2$  och  $\sqrt{x}$  har en rotationel symetri. Då används formeln

$$\pi \int_a^b f(y)^2 dy$$




I figuren ser vi att integralen går från 0 till 4.

$$\pi \int_0^4 (y^2)^2 dy = \pi \int_0^4 y^4 dy$$

$$\Rightarrow \pi \frac{y^5}{5} \Big|_0^4 = \pi \frac{4^5}{5} = \pi \frac{1024}{5} \text{ v.e}$$


3. Följande area ska utberäknas



Med sådana integraler räknar man rektanglarna mellan funktionerna, dvs  $g(x) - f(x)$ , och integrerar sedan över den nya funktionen som i detta fall blir

$$4\cos(3x) - 2\sin(3x)$$

Som då blir den här arean



Integralen som räknas ut blir då mellan 0 och intersektionspunkten. Intersektionspunkten är när

$$4\cos(3x) = 2\sin(3x) \Rightarrow 2 = \frac{\sin(3x)}{\cos(3x)} = \tan(3x) \Rightarrow x = \frac{\tan^{-1}(2)}{3}$$


$$\begin{aligned} \int_0^{\tan^{-1}(2)/3} 4\cos(3x) - 2\sin(3x) dx &= \left. \frac{4\sin(3x) + 2\cos(3x)}{3} \right|_0^{\tan^{-1}(2)/3} \\ &= \frac{4\sin(\tan^{-1}(2)) + 2\cos(\tan^{-1}(2)) - 2}{3} \approx \frac{4\sin(1.11) + 2\cos(1.11) - 2}{3} \approx 0.824 a.e \end{aligned}$$

Detta är rimligt med tanke på att området är väldigt tunt.

4. Differentialekvationen kan skrivas om som  $y' = -3y$ . Som då kan integreras och lösas ut som

$$dx = \frac{1}{-3y} dy \Rightarrow x = -\frac{1}{3} \ln(y) + C$$

Funktionen den här bildar är väldigt lik en bakvänd  $e^x$  funktion



Löser man ut y får man ekvationen.

$$x - C = -\frac{1}{3} \ln(y) \Rightarrow 3C - 3x = \ln(y) \Rightarrow y = e^{3c-3x}$$

Antar man att  $c=0$  så blir konstanten  $a = -3$ .

- 5.

$$\begin{aligned} \sin(x) + \frac{\cos(2x)}{2} \Big|_0^{\pi/2} \\ 1 - 1/2 = 0.5 \end{aligned}$$

6. Man kan sätta in lösningen i den originella differnetialekvationen.


$$y' = A - 2B/x^3$$

$$y'' = 6B/x^4$$

Sedan sätts dom in i ekvationen.

$$\begin{aligned} & x^2 6B/x^4 + 2x(A - 2B/x^3) - 2(Ax + B/x^2) \\ &= 6B/x^2 + 2xA - 4B/x^2 - 2xA - 2B/x^2 \\ &= \frac{B}{x^2}(6 - 4 - 2) + 2xA(2 - 2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

7. Följande områden ska bilda rotationsvolymen där area A är lila och area B är röd.



Där den lila linjen visar vart  $y=b$  är och den röda linjen visar vart  $x=a$  är. Rotationsvolymen  $V_a$  roterar på x-axeln och går mellan 0 och a, så då blir det  $V_a = \pi \int_0^a x^4 dx$  medans för den som roterar runt y axeln blir  $V_b = \pi \int_0^b y dy$ . Sambandet mellan dom räknas då ut som följande.

$$\begin{aligned} \pi \int_0^a x^4 dx &= \pi \int_0^b y dy \Rightarrow \frac{x^5}{5} \Big|_0^a = \frac{y^2}{2} \Big|_0^b \Rightarrow \frac{a^5}{5} = \frac{b^2}{2} \Rightarrow 2a^5 = 5b^2 \\ \Rightarrow b &= \sqrt{\frac{2a^5}{5}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} a^{5/2} \end{aligned}$$

Enligt ekvationen åvan, vid större värden av a, så måste b växa väldigt fort. Detta är logiskt då rotationsvolymen som bildas av b (den lila delen av bilden nedan) växer mycket långsammare än den som är begränsad av a (röda delen). En liten förändring db bildar en mycket större förändring da.

