

1 Abstract

Vad är den mest optimala strategin för yatzee?

2 Regler och Definitioner

Det finns fem tärningar t med värden mellan 1 till 6

$$\Omega = \{t_1, \dots, t_5 : t_i \in \{1, \dots, 6\}\} \quad (1)$$

Ett sett av tärningskastningar kommer kallas för T

Reglerna går ut så här:

- Första rundan kastar man alla fem tärningar.
- Sedan får man själv välja vilka tärningar som ska kastas. Man får två sådana försök på sig.
- Det finns då en hel lista av olika kategorier spelaren kan sätta in på resultaten. Ett exempel kanske är $d_1 = 2, d_2 = 2$, då kan man antingen välja att sätta in det i "par" kategorin eller i "två" kategorin.

Listan på alla kategorier k och deras accepterade konfigurationer:

- $K_{N,n} \rightarrow n = t_i = t_{i+1} \dots = t_{i+N}$
- $K_N \rightarrow t_i = t_{i+1} \dots = t_{i+N}$
- $K_{lagrestege} \rightarrow t_0 > t_1 > \dots t_{N-1}$
- $K_{hogrestege} \rightarrow t_1 > t_2 > \dots t_N$

K_3 är ett exempel på "triss", d.v.s man får tre av samma figur. $K_{4,1}$ betyder att man har fått 4 stycken tärningar med 1.

Poängen man får för varje konfiguration förutom yatzee ($|K_{N,n}| = N$) är

$$\sum_{t_i \in K} t_i \quad (2)$$

3 Simpelt Spel

Vi börjar med att simulera ett två tärnings spel

$$\Omega = \{t_1, t_2 : t_i \in \{1, \dots, 6\}\} \quad (3)$$

Funktionen $P : T_i \times T_j \rightarrow \mathbb{R}$ är probabiliteten att man går från T_i till T_j

Vi konstruerar en transitions matris för markov kedjan

$$\begin{pmatrix} P(\{1,1\}, \{1,1\}) & \dots & P(\{1,1\}, \{1,6\}) \\ \vdots & \dots & 5 \end{pmatrix}$$

Vad är den bästa strategin om man får $\{1,1\}$? Ta par: 2 poäng men förlorar möjligheten att få 4,6,8,10 och 12 poäng Ta ettor: 2 poäng och förlorar inget