



යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් සමග අනුකූල වන පරිදි  
**මෑ වගාකිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශය**  
**(ශුරෝපා රටවල් වෙත අපනයනය සඳහා)**



කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් සමග අනුකූල වන පරිදි මෑ වගා කිරීම සඳහා වන

මාර්ගෝපදේශය (යුරෝපා රටවල් වෙත අපනයනය සඳහා)

|                         | කාර්යය                                  | එක් එක් කාර්යයට අදාළ වූ විශේෂිත කරුණු                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ගුණාත්මක බීජ තෝරා ගැනීම | මෑ වගාවේදී සලකා බැලිය යුතු වැදගත් කරුණු | <p>1. සුදුසු ප්‍රභේදයක් තෝරා ගැනීම</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• වගා කරන ප්‍රදේශයට සුදුසු හොඳින් වැවෙන, ඉහළ අස්වැන්නක් ලබාදෙන, හොඳ ඉල්ලුමක් ඇති ප්‍රභේදයක් වීම</li> </ul> <p>2. උසස් ගුණාත්මක බීජ භාවිතය</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• විශ්වාසවන්ත ස්ථානයකින් නිර්දේශිත, ගුණාත්මයෙන් උසස් බීජ ලබා ගැනීම</li> <li>• හැකිතාක් අලුත් බීජ භාවිතා කරන්න</li> </ul> |

|                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| මූලික බිම් සැකසීම | බිම් සැකසීම                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>නව භූමියක් නම් අවට හා භූමිය හොඳින් පිරිසිදු කර ගන්න. සෙවන අවම කර ගන්න, රෝග පළිබෝධවල ධාරක ශාක ඉවත් කරගන්න</li> <li>පෙර කන්නයේ මෑ වගා කළ ක්ෂේත්‍රයක් නම් ඉතිරි වූ / මැරුණු වැල් ඉවත් කරන්න</li> <li>භූමිය එළිපෙහෙලි කරගත් පසුව පස අඟල් 12ක් පමණ ගැඹුරට පස පෙරලා කැට පොඩිකර තරමක් සියුම්ව පස සකසා ගන්න.</li> <li>පස් පරීක්ෂාවකින් පසුව pH අගය 5.0 ට අඩු නම්, අළුත් 1-2 t/ha (100-200 kg/ 1000 m<sup>2</sup>) බිම් සැකසීමට පෙර පසට මිශ්‍ර කරන්න (පසට මිශ්‍රකර වරින් වර ජලය යොදමින් දින 14ක් තැබීම වඩා සුදුසුයි)</li> <li>වර්ෂාව අධික කාලයක් නම් හොඳින් ජලය බැසයන ලෙස පාත්ති හා කාණු සකසා ගන්න.</li> <li>වැසි සමයේදී, පස ජලයෙන් යටවී ඇත්නම්, උස් පාත්ති සකසා ගන්න (අඩි 4 ක් පළල සහ අඩි 0.5 ක් උස හෝ දේශීය තත්ත්වයන්ට අනුව)</li> <li>පාත්තිවල දිග භූමිය අනුව සුදුසු පරිදි සකසා ගත හැකිය</li> <li>පරතරය <ul style="list-style-type: none"> <li>පළුරු ආකාරයේ වර්ග - පැල අතර සෙ.මි. 20 , ජෙලි අතර සෙ.මි. 60 – 75</li> <li>වැල් ආකාරයේ වර්ග - පැල අතර සෙ.මි. 30 , ජෙලි අතර සෙ.මි. 90</li> </ul> </li> <li>ඉහත පරතරයට අනුව පාත්තිවල වලවල් සකසා ගන්න.</li> <li>පසේ හොඳින් ජලය බැස යාම සඳහා බීජ සිටුවන වලකට (මණ්ඩියකට) කර කරන ලද දහයියා ග්‍රෑම් 100 ක් පමණ (වැඩුණු පුද්ගලයකුගේ දෝතක ප්‍රමාණයේ කොටස් දෙකක්) පමණ බීජ සිටුවීමට පෙර යොදන්න</li> </ul> |
|                   | ක්ෂේත්‍රය වටා කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැල් ආවරණ ගැසීම (තැනිතලා බිම් සඳහා, අක්කර ¼ හෝ ½ වගා සඳහා) | <ul style="list-style-type: none"> <li>බිම් සැකසීම සිදු කිරීමෙන් පසු ක්ෂේත්‍රය ආවරණය වන පරිදි ක්ෂේත්‍රය වටා කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැලක් ස්ථාපනය කිරීම මගින් අවට පරිසරයේ සිට කෘමි පළිබෝධ ක්ෂේත්‍රයට ඇතුළු වීම පාලනය කළ හැකිය</li> <li>මේ සඳහා පොළවේ සිට මීටර් 2.5- 3 ක් දක්වා උසකට විහිදෙන සේ දැල ස්ථාපනය කරන්න</li> <li>කෘමි ප්‍රතිරෝධී දැලෙහි සිට පැළ දක්වා මීටර් 1.5 ක පමණ පරතරයක් සිටින සේ ස්ථාපනය කරන්න</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | ජීවී කෘමි බාධක වැටක් යෙදීම (බිම් සකස් කර බීජ සිටුවීමට සති 2- 3 කට පෙර)                   | සිග්- සැග් ආකාරයට බඩඉරිඟු වැනි ජීවී කෘමි බාධක වැටක් යෙදීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | පස පරීක්ෂා කිරීම හා පොහොර යෙදීම        | <p>සාර්ථක මෑ වගාවක් සඳහා බෝගයට අවශ්‍ය පොහොර ලබාදීම වැදගත් වේ. මෑ වගාව ඇරඹීමට පෙර වගා බිමේ පස පරීක්ෂා කර ඇත්නම්, එම වාර්තාවට අනුව පොහොර යෙදිය යුතුයි.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>පස් පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු නොකරයි නම් මෑ වගාව සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පොදු නිර්දේශය, (Blanket Recommendation) අනුගමනය කිරීම සුදුසුය (වගු අංක 1 පරිශීලනය කරන්න)</li> <li>කොම්පෝස්ට් / වියළි ගොම පොහොර අක්කරයට කි.ග්‍රෑම් 4000 ක් (වලකට ගොම පොහොර පොල් කටු 2ක් / කොම්පෝස්ට් පොල් කටු 2 ක්)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| බීජ සංස්ථාපනය කිරීම | බීජ ප්‍රතිකාර කිරීම හා සංස්ථාපනය කිරීම | <ul style="list-style-type: none"> <li>බීජ අවශ්‍යතාවය <ul style="list-style-type: none"> <li>පළුරු ආකාරයේ වර්ග - හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 17-20</li> <li>වැල් ආකාරයේ වර්ග - හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 16-20</li> </ul> </li> <li>මෙහිදී සෘජු බීජ සිටුවීම සිදු කෙරේ.</li> <li>බීජ කි.ග්‍රෑම් 1 කට කැප්ටාන් 50% WP ග්‍රෑම් 6.0 ක් හා තයාමෙතොක්සාම් 70% WS ග්‍රෑම් 1.5 ක් බීජ සිටුවීමට පැය 24 කට කලින් බීජවලට දමා ජලය ස්වල්පයක් එක්කර, හොඳින් බීජවල තැවරෙන ලෙස මිශ්‍ර කරන්න</li> <li>පැය 24 කට පසු එකිනෙකට තරමක් දුරින් එක් වලක බීජ 3- 4 ක් පමණ සිටුවන්න</li> </ul> <p>ට්‍රයිකොඩර්මා ප්‍රතිකාරකය පසට යෙදීම;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>බීජ සිටුවූ දින සිට සතියකට වරක් බැගින් තුන් වතාවක් (සති 2 ක් දක්වා) ට්‍රයිකොඩර්මා ජෛව ප්‍රතිකාරකය මි.ලී. 1ක් ජලය ලීටර් 10 අනුපාතයට දිය කර සාදා ගත් ද්‍රාවණයෙන් ලීටර් 10 ක් වර්ග මීටර් 10 ක භූමි ප්‍රමාණයකට පස හොඳින් තෙමෙන සේ යොදන්න.</li> </ul> <p>සටහන: ජෛව පළිබෝධනාශක භාවිතා කරනවිට රසායනික පළිබෝධනාශක භාවිතයෙන් වැළකී සිටින්න.</p> |
|                     | වල් පැලෑටි මර්දනය                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ක්ෂේත්‍රය වල්පැලෑටිවලින් තොරව තබා ගන්න.</li> <li>වර්ධනයේ ආරම්භක අවධියේදී වල් පැලෑටි පාලනය කිරීම සඳහා දෙතුන් වතාවක් වල් කැපීම හෝ පස් දැමීම කළ හැකිය.</li> </ul> <p>සටහන: වසුන් යෙදීම මගින් වල්පැලෑටි පාලනයක් සිදු කළ හැකි වුවද පොලිතින් වසුන් භාවිතයේදී පාංශු උෂ්ණත්වය සහ පාංශු තෙතමනය ඉහළ යාමෙන් බැක්ටීරියා සහ දිලීර රෝග ඇති වීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇත.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ජෛව පළිබෝධ පාලකයන් ක්ෂේත්‍රයට නිදහස් කිරීම</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>පරිසරයේ සිටින යුෂ උරා බොන කෘමීන් බීජ පැළ මතුවන අවධියේ සිටම වගාවට ඇතුල් විය හැකිය. එම පළිබෝධ ගහණය පාලනය කිරීම සඳහා වගාව ආරම්භයේ සිටම වගාවට ජෛව පළිබෝධ පාලකයන් නිදහස් කිරීම ආරම්භ කළ හැකිය. සති දෙකකට වරක් බැගින් පස් වතාවක් මෙම ජෛව පළිබෝධ පාලකයන් නිදහස් කිරීම සිදු කළ යුතුය (ඇමිණුම 01).</li> </ul> <p>සටහන: මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ගන්නොරුව, උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයේ කීට විද්‍යා අංශය සමඟ සම්බන්ධ වන්න.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p>ආධාරක සිටුවීම</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>බීජ සිටුවීමෙන් පසු සති 02 හෝ 03 කදී ආධාරක සිටුවීම කළ යුතුය (උස අඩි 7)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <p>රෝග හා පළිබෝධ පාලනය</p>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>මුල් කුණු වීම පාලනය<br/>රෝග ලක්ෂණ දුටු වහාම, කැප්ටන් 50% WP ග්‍රෑම් 32.0 ක් ජලය ලීටර් 16.0 ක දියකර පැළයේ මුල හා ඒ අවට පස හොඳින් තෙමෙන ලෙස පාංශු ප්‍රතිකාර කරන්න</li> <li>වෛරස රෝග හා ෆයිටොප්ලාස්මා රෝගවලට ලක්වීමේ ඉඩකඩ ඇති බැවින් වාහකයින් පාලනය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන්න (වගු අංක 03)</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">     </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <p>මලකඩ රෝගය</p> <p>කෝණාකාර පත්‍ර ලප</p> <p>වෛරස් රෝග</p> <p>මුල් කුණුවීමේ රෝගය</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>වගු අංක 02 හා 03 පරිශීලනය කරන්න.<br/>(මෑ වගාව සඳහා පළිබෝධනාශක යෙදීම මල්පිපෙන අවස්ථාවේ සිට ආරම්භ කළ හැකි අතර, දින 10- 14 ක පරතරයකින් වාර 1-2 යෙදිය හැකිය. අස්වැන්න නෙලීමට ආසන්නව පළිබෝධනාශක යෙදීමේදී, පෙර අස්වනු කාලය පිළිබඳව සැලකිය යුතුය.)<br/>අස්වනු නෙලීමට ආසන්න හෝ අස්වනු නෙළන අතරතුරේදී රෝග හා පළිබෝධ පාලනය සඳහා Azadirachtin A 7.5 g/l EC හෝ සුදුසු කාබනික පළිබෝධනාශකයක් යොදන්න (වගු අංක 03)</li> </ul> |

|                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | මතු පිට පොහොර යෙදීම              | කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශයට අනුව මෑ කරල් වගාවේදී මතුපිට පොහොර එක් වනාවක් පමණක් නිර්දේශ කර ඇතත් (වගු අංක 01) බෝගයේ ආයු කාලය සහ වෙළෙඳපොළ මිල සැලකිල්ලට ගනිමින් මතු පිට පොහොර තව වාර කීපයක් යෙදිය හැකිය [සති දෙකක පරතරයක් සහිතව මාස තුනක් දක්වා පමණ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | ජල සම්පාදනය සහ වැල් පුහුණු කිරීම | <ul style="list-style-type: none"> <li>වර්ෂාපතනය අඩුවීම ජල සම්පාදනය කර පසේ තෙතමනය උචිත ලෙස පවත්වා ගැනීමෙන් වැඩි අස්වැන්නක් ලැබේ.</li> <li>මල් හා කරල් හට ගන්නා අවධියේදී විශේෂයෙන් හොඳින් ජල සම්පාදනය කිරීම ඉතා වැදගත්ය.</li> <li>නමුත් භූමියේ මතුපිට දිගු වෙලාවක් ජලය රඳා සිටීම අවම කළ යුතුය (පස මඩ වීමෙන් මුල් පද්ධතියට හානි වීම හා කුණුවීම සිදුවේ).</li> <li>පසේ තෙතමනය අඩු වූ විට මල් හා කරල් කුඩා වීම සිදුවේ.</li> <li>අධාරක කෝටු දිගේ වැල් පුහුණු කළ යුතු අතර එසේම වැල් වර්ධනය වැඩිනම් ලණු ආධාරක මත පුහුණු කළ යුතුය.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| අස්වනු නෙලීම<br>(බීජ සිටුවා දින 55-60 පමණ) | අස්වනු නෙලීම                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>නියමිත පරිණත තත්ත්වයට පැමිණ ඇති, එනම් බීජ පරිණත වීමට පෙර අස්වනු නෙලීම සිදු කළ යුතු අතර හැකි තරම් භෞතික හානිවලින් තොරව නියමිත ප්‍රමිතියට මේරූ කරල් පමණක් තෝරා අස්වනු නෙලීම අතින් සිදු කරන්න (බීජ සිටුවා දින 55-60 පමණ).</li> <li>අධික උෂ්ණත්වය සහ හිරු එළිය නිසා සිදුවන හානි අවම කර ගැනීම සඳහා අස්වනු නෙලීම උදෑසන (පෙරවරු 8.00 – 11.00) කාලයේදී සිදු කරන්න.</li> <li>කරල් කැපියාම්, සිරිම් සහ තැලිම් ආදියට ලක් වීම අවම කිරීම සඳහා අස්වනු එකතු කිරීමේ දී තියුණු දාර සහිත අස්වනු බහාලුම් භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න.</li> <li>නෙළාගත් අස්වනු සැහැල්ලු ලෙස ප්ලාස්ටික් කුඩවල හෝ පෙට්ටිවල තැන්පත් කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. මෙම ඇසුරුම් පිරිසිදු තත්ත්වයේ පැවතීම ඉතා වැදගත් වේ.</li> <li>කරල් නෙලා ගත යුත්තේ නටුව සෙ.මී. 1.0 ක් පමණ දිගට පවතින ලෙසය. ශාකයට හා කරල්වලට වන හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා අස්වැන්න නෙලීම මෘදු ආකාරයෙන් සිදු කරන්න</li> <li>අස්වන්න නෙලීම සඳහා භාවිතා කරන උපකරණ සහ බහාලුම් පළිබෝධනාශක මගින් දූෂණය නොවී පිරිසිදු තත්ත්වයේ පැවතීම ඉතා වැදගත් වේ.</li> </ul> |

**වගු අංක 01:**

**මෑ වගාව සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පොහොර නිර්දේශය (blanket recommendation)**

| පොහොර යොදන කාලය                                             | පොහොර ප්‍රමාණය<br>(හෙක්ටයාරයට කි.ග්‍රෑ) |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| මූලික පොහොර (Basel dressing) බීජ<br>සිටුවීමට දින 2-3 කට පෙර | යූරියා - 35                             |
|                                                             | ටී.එස්.පී-130                           |
|                                                             | එම්.ඕ.පී.- 35                           |
| මතුපිට පොහොර (top dressing)<br>බීජ සිටුවා සති 4 දී          | යූරියා-55                               |
|                                                             | එම්.ඕ.පී.-35                            |

නිර්දේශය : .....

අනුමැතිය: .....



වග්‍ර අංක : 02

දිලීර රෝග පාලනය

| රෝගය                                                                 | දිලීරනාශකය                                               | සාන්ද්‍රණය           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| කෝණාකාර පත්‍ර ලප<br><i>Phaeoisariopsis griseola</i>                  | ටෙබ්‍රකොනසෝල් 250 g/l EW                                 | මි.ලී. 6 /ලීටර් 16   |
|                                                                      | ටෙබ්‍රකොනසෝල් 200 g/l +<br>ඇසොක්සිස්ටරොබින් 120 g/l SC   | මි.ලී. 5.6 /ලීටර් 16 |
| මලකඩ රෝගය<br><i>Uromyces appendiculatus</i>                          | ටෙබ්‍රකොනසෝල් + ටරයිල්ලොක්සිස්ටරොබින්<br>500+250 g/kg WG | ශ්‍රේණි 10 /ලීටර් 16 |
|                                                                      | ඇසොක්සිස්ටරොබින් 250 g/l SC                              | මි.ලී. 16 /ලීටර් 16  |
|                                                                      | ටෙබ්‍රකොනසෝල් 200 g/l +<br>ඇසොක්සිස්ටරොබින් 120 g/l SC   | මි.ලී. 6.4 /ලීටර් 16 |
|                                                                      | ටෙබ්‍රකොනසෝල් 250 g/l EW                                 | මි.ලී. 6 /ලීටර් 16   |
| ඇන්ත්‍රැක්නෝස්<br><i>Coletotrichum lindemuthianum</i>                | ටෙබ්‍රකොනසෝල් + ටරයිල්ලොක්සිස්ටරොබින්<br>500+250 g/kg WG | ශ්‍රේණි 10 /ලීටර් 16 |
|                                                                      | ටෙබ්‍රකොනසෝල් 250 g/l EW                                 | මි.ලී. 6 /ලීටර් 16   |
| මුල් කුණුවීම ( <i>Fusarium oxysporum</i><br><i>Fusarium solani</i> ) | කැප්ටාන් 50% WP                                          | ශ්‍රේණි 32/ලීටර් 16  |

නිර්දේශය : .....

අනුමැතිය: .....



වගු අංක 03:

කෘමි පළිබෝධ පාලනය.

| වගා භාතිය / පාලනය                 | රසායනික කෘමිනාශක යෙදීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:1 බෝංචි මැස්සා පාලනය            | <ul style="list-style-type: none"> <li>සිටුවීමට පෙර බීජ ප්‍රතිකාර කළ යුතුයි.</li> <li>බීජ කිලෝග්‍රෑම් 01 ක් සඳහා තයමෙතොක්සැම් (Thiamethoxam 70% WG) ග්‍රෑම් 1.5 ක් ජලය මි.ලී. 8-10 ක දියකර බීජ සහිත බඳුනට හෝ බැගයට දමා මිශ්‍ර කර පැය 24 ක පමණ කාලයක් තබා සිටුවීම කරන්න.</li> </ul>                                                              |
| 1:2 සුදු මැස්සා සහ කුඩිත්තා පාලනය | <ul style="list-style-type: none"> <li>වල් පැලෑටි සියල්ල ඉවත් කර ක්ෂේත්‍රය පිරිසිදුව තබාගත යුතුයි.</li> <li>පහත කෘමිනාශක, සිටුවා දින 10-12 ට වරක් මාරුවෙන් මාරුවට ඉසීම කළ හැකිය.</li> </ul> <p>කොහොඹ සාරය හෝ (Azadirachtin A 7.5 g/l EC) – මි.ලී. 80 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br/>කොහොඹ සාරය (Azadirachtin 50 g /l EC ) මි.ලී. 32 ක් ජලය ලී. 16 ක</p> |
| 1.3 පැලමැක්කන් පාලනය              | <p>ඇබමෙක්ටින් (Abamectin) 18 g/l EC- මි.ලී. 10 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br/>ඇසිටැම්ප්‍රිඩ් (Acetamiprid) 200 g/l SL- මි.ලී. 16 ක් ජලය ලී. 16 ක</p>                                                                                                                                                                                                    |
| 1:4 පත්‍ර කනින්නා පාලනය           | <p>හානි කළ පත්‍ර කපා ඉවත් කර<br/>කොහොඹ සාරය හෝ (Azadirachtin A 7.5 g/l EC) – මි.ලී. 80 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br/>කොහොඹ සාරය (Azadirachtin 50 g/l EC ) මි.ලී. 32 ක් ජලය ලී. 16 ක<br/>ඇබමෙක්ටින් (Abamectin) 18 g/l EC- මි.ලී. 10 ක් ජලය ලී. 16 ක</p>                                                                                                |

නිර්දේශය : .....

අනුමැතිය: .....

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1:5 පත්‍ර කීඩුවා පාලනය  | කොහොඹ සාරය හෝ (Azadirachtin A 7.5 g/l EC) – මි.ලී. 80 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br>කොහොඹ සාරය (Azadirachtin 50 g/l EC) මි.ලී. 32 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br>ඇසිටැමිප්‍රයිඩ් (Acetamiprid) 200 g/l මි.ලී. 16 ක් ජලය ලී. 16 ක                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1:6 මයිටාවා පාලනය       | ඇබමෙක්ටින් (Abamectin) 18 g/l EC- මි.ලී. 10 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br>ස්පිරොමෙසිෆෙන් (Spiromesifen) 24% SL- මි. ලී.12 ක් ජලය ලී.16 ක හෝ<br>හෙක්සිතයසෝක්ස් (Hexythiazox) 50 g/l EC -මි. ලී.24 ක් ජලය ලී.16 ක<br>කොහොඹ සාරය හෝ (Azadirachtin A 7.5 g/l EC) – මි.ලී. 80 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br>කොහොඹ සාරය (Azadirachtin 50 g/l EC) මි.ලී. 32 ක් ජලය ලී. 16 ක                                                                                              |
| 1:7 කරල් විදින්නා පාලනය | කොහොඹ සාරය හෝ (Azadirachtin A 7.5 g/l EC) – මි.ලී. 80 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br>කොහොඹ සාරය (Azadirachtin 50 g/l EC) මි.ලී. 32 ක් ජලය ලී. 16 ක හෝ<br>කහ බල්බ භාවිතය (සටහන: මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ගන්නෝරුව, උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන<br>ආයතනයේ කීට විද්‍යා අංශය සමග සම්බන්ධ වන්න 081 2388011/12)<br>ක්ලෝරැන්ට්‍රැනිලිප්‍රෝල් (Chlorantraniliprole) 200 g/l මි.ලී. 03 ක් ජලය ලී. 16 ක<br>එටොෆෙක්ස් (Etofenprox 100 g/l EC) මි.ලී. 24 ක් ජලය ලී. 16 ක |

**උපදේශකත්වය සහ සංස්කරණය:**

1. ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඒ. ආර්. ටී. වික්‍රම ආරච්චි මයා (අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව)
2. ආචාර්ය ජේ. ඒ. සුමිත් මයා (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්- පර්යේෂණ)
3. ආචාර්ය රොෂනි එම්. හරිල් මිය (අධ්‍යක්ෂ - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය)

**තාක්ෂණික දායකත්වය :**

1. සී. මාගමගේ මිය - අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (විශ්ලේෂණ රසායනික විද්‍යා)
2. එන්. ආර්. එන්. සිල්වා මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (පාංශු විද්‍යා)
3. ආචාර්ය කේ. එම්. ඩී. ඩබ්. පී. නිශාන්ත මයා - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (කීට විද්‍යා) - අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය)
4. ඩී. පී. කරුණානන්ද මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශාක විද්‍යා)
5. ආචාර්ය එම්. ජී. එස්. පී. පතිරණ මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශාක අභිජනන)
6. ආචාර්ය අයි. ඩබ්. එම්. අයි. ඩබ්. ටී. කේ. ඉලංගකෝන් මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (වල් පැළෑටි වෙනත් බෝග)
7. එම්. එස්. ඩබ්. ප්‍රනාන්දු මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශාක ව්‍යාධි විද්‍යා) සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
8. එන්. බී. යූ. දිසානායක මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
9. පී. ජී. එච්. එම්. එස්. එන්. හේරත් මයා - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
10. ආචාර්ය පී. එච්. රණවිර මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
11. ආචාර්ය එම්. ඒ. පී. මායාකඩුව මෙය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

**සම්පාදනය :**

01. එන්. එම්. උබේසේකර මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
02. එච්. එච්. එම්. එන්. කේ. හපුකොටුව මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
03. එස්. ඩී. එච්. දුලංජලා මෙය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)