



# යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් සමග අනුකූල වන පරිදි ගොටුකොළ වගාකිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශය (ශුරෝපා රටවල් වෙත අපනයනය සඳහා)

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් සමග අනුකූල වන පරිදි

ගොවුකොළ වගා කිරීම සඳහා වන මාර්ගෝපදේශය (යුරෝපා රටවල් වෙත අපනයනය සඳහා)

| දින                               | කාර්යය              | එක් එක් කාර්යයට අදාළ වූ විශේෂිත කරුණු                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| මූලික බිම් සැකසීම                 | ක්ෂේත්‍රය තෝරාගැනීම | <ul style="list-style-type: none"> <li>පහත් බිම්වල තනි වගාවක් ලෙසත්, උස් බිම්වල පොල්, කෙසෙල්, කතුරුමුරුංගා ආදී වෙනත් වගාවන් අතර යටි වගාවක් ලෙසත් ගොවුකොළ පහසුවෙන් වගා කළ හැකිය.</li> <li>පහසුවෙන් හා හොඳින් ජල සම්පාදනය කළ හැකි බිමක් විය යුතුය.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | බිම් සැකසීම         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ක්ෂේත්‍රය සහ අවට හොඳින් පිරිසිදු කර ගැනීම.</li> <li>බිම පෙරළා (සෙ.මී. 30 පමණ ගැඹුරට) වල්පැළෑටි දිරාපත්වීමට ඉඩහැර කැට පොඩිකර බිම සමතලා කරන්න.</li> <li>ඉන්පසු කැට පොඩි කර සමතලා කර සියුම්ව සකසා ගන්න.</li> <li>පහත්බිම් නම් වර්ෂා කාලයේ දී ජලය රඳා පැවැතීමට ඉඩ ඇති නිසා, ජලය බැස යාම සඳහා ලියැදි වට්ට සහ අවශ්‍ය පරිදි ලියැදි මැද ස්ථාන කීපයක සෙන්ටිමීටර 30ක පමණ ගැඹුරු කාණු සකස්න්න.</li> <li>උස් බිම්වලද වැඩි ජලය ඉවත් කිරීමට සෙ.මී. 15ක පමණ ගැඹුරු කාණු සකස් කරන්න.</li> </ul> |
|                                   | පස පරීක්ෂා කිරීම    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතා දැනුවත් කර ඔහුගේ උපදෙස් පරිදි පස් සාම්පල ලබාගෙන අදාළ පරීක්ෂණාගාර මගින් පස් සාම්පල පරීක්ෂාව සිදුකර ගැනීම සුදුසු වේ.</li> <li>පී.එච්. (pH) 6-7 අතර සුළු වශයෙන් ආම්ලික වූ පස වඩාත් සුදුසුය.</li> <li>පී.එච්. (pH) 5.0 ට වඩා අඩු වන විට අළුහුණු හෝ ඩොලමයිට් (අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම් 800 පමණ)</li> </ul>                                                                                                                                                |
| (පැළ/ පළුරු සිටුවීමට දින 3-6 පෙර) | කාබනික පොහොර යෙදීම  | <ul style="list-style-type: none"> <li>හොඳින් දිරාපත් වූ ගොම පොහොර, කොම්පෝස්ට් හෝ කොළ පොහොර කාබනික පෝෂක ලෙස යෙදිය හැකිය. කාබනික පොහොර යෙදීමේ දී පැළ සිටුවීමට දින 3 - 4කට පෙර යෙදීම ප්‍රමාණවත් වේ. (ගොම පොහොර හෝ කොම්පෝස්ට් පොහොර අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම් 4000)</li> <li>කාබනික පොහොර හෝ ගොම පොහොර ද, අක්කරයට කිලෝග්‍රෑම් 4000 ක් පමණ (වර්ග මීටර් 1 කට ග්‍රෑම් 500 ක් හෝ පොල්කටු 4 ක ප්‍රමාණයක්) තෙත් වූ පසට යොදන්න.</li> </ul>                                                                                            |

|                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( සිටුවීමට දින 1 -2 පෙර) | මූලික පොහොර යෙදීම<br>(දඬු සිටුවීමට දින 1 -2 පෙර) | <ul style="list-style-type: none"> <li>අක්කරයකට යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 36 ක්, ත්‍රිපල් සුපර් පොස්පේට් (TSP) කිලෝග්‍රෑම් 54 ක් හා මියුරේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) කිලෝග්‍රෑම් 40 ක් මිශ්‍ර කර ඒකාකාරීව යොදන්න.</li> <li>සිටුවීමට දින, 1- 2 කට පෙර නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණ යොදා පස සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර කර ජලය සපයන්න.</li> </ul> <p>එසේ වුවද, පස පරීක්ෂා කර බලා පසට ස්ථානීය පොහොර නිර්දේශයක් ලබා ගැනීම වඩාත් උචිත වේ.</p> <p>පස් පරීක්ෂා කිරීම - ප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීම මගින් පහසුවෙන් සිදු කර ගත හැකිය.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | වටපණුවන් පාලනය                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>පෙර වටපණු හානි වාර්තා වූ ඉඩමක හෝ බාහිරින් ආසාදනය වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ඇබමැක්ටින් 20 ග්‍රෑ./ලී. එස්. සී. (Abamectin 20 g/l SC) මිලි ලීටර 3.75 ක් ජලය ලීටර 10 ක මිශ්‍ර කර වර්ග මීටර 10 ක ප්‍රදේශයක පස හා මිශ්‍ර කිරීම හෝ ෆ්ලුවොපයිරාම් 400 ග්‍රෑ./ලී. එස්.සී. (Fluopyram 400 g/l SC) 0.625 ml ක් වර්ග මීටර 10 ක ප්‍රදේශයක පස හා මිශ්‍ර කිරීම.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | රෝපණ ද්‍රව්‍ය                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>රෝග හා පළිබෝධ හානිවලින් තොර රෝපණ ද්‍රව්‍ය පමණක් භාවිතා කරන්න.</li> <li>වටපණු හානියට ගොදුරු වී නොමැති නිරෝගී පළුරුවලින් හෝ ධාවකවලින් ලබා ගන්නා මුල් සහිත මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට මේරූ පැළ තෝරා ගන්න (මුල් පරීක්ෂා කිරීමේදී ගැටිති නිරීක්ෂණය වේ නම් වටපණු හානිය ඇති බවට සැක කළ හැකිය).</li> <li>මුල් සහිත මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට මේරූ පැළ හෝ පළුරු මගින් වර්ධනයක් ලබා ගත හැකිය.</li> <li>වර්ග මීටර 100 ක් සඳහා <ul style="list-style-type: none"> <li>විශාල කොළ සහිත ගොටුකොළ (පළුරු ආකාරය / යෝධ ගොටුකොළ ) සඳහා රෝපණ ද්‍රව්‍ය 5000 – 7500 අවශ්‍ය වේ.</li> <li>මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයේ කොළ (වැල් ආකාරය) සහිත ගොටුකොළ සඳහා රෝපණ ද්‍රව්‍ය 9000 – 10000 අවශ්‍ය වේ.</li> </ul> </li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>රෝග හා පළිබෝධ හානිවලින් තොර රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා වෙනමම මාතෘ ශාක වගා භූමියක් පවත්වාගෙන යාම කළ හැකිය. මෙම වගාව රෝග හා පළිබෝධවලින් තොරව පවත්වාගෙන යා යුතු අතර ඒ සඳහා නිර්දේශිත කෘමිනාශක / දිලීරනාශක භාවිතා කළ හැකිය.</li> <li>මෙම වගා කොටස සඳහා කෘමිනාශක / දිලීරනාශක නිතර යෙදීමට සිදු විය හැකි බැවින් මෙම වගාව අපනයනය සඳහා වගා කරනු ලබන භූමියේ සිට මීටර 30 පමණ දුරින් පවත්වා ගෙන යාම සුදුසු වේ.</li> </ul> |

|                                                         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ධාවකවලින් ලබා ගන්නා මුල් සහිත පැළ/ පඳුරු සිටුවීම</p> | <p>සිටුවීම</p>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>පරතරය : පඳුරු ආකාරය / යෝධ ගොටුකොළ - සෙ.මී. 20 x 20 පරතරය සහිතව හෝ වැල් ආකාරය - සෙ.මී. 15 x 15 පරතරය සහිතව සිටුවන්න. එසේ නොමැති නම් අහඹු ලෙසද සිටුවිය හැකිය.</li> <li>ධාවකවලින් ලබා ගන්නා මුල් සහිත පැළ / පඳුරු සිටුවීමේ දී එක් ස්ථානයක පැළ 2 - 3ක් සිටුවිය හැකිය. පැළ වියළී යාම අඩු කර ගැනීමට පැළ සිටුවීම සඳහා සවස් කාලය තෝරා ගන්න. සෑම විටම පැළ සිටුවීමට පෙර පස හොඳින් තෙත් කරන්න.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | <p>කෘමි හානි හා රෝග හඳුනා ගැනීම</p> | <p>කෘමි හානි: කීඩෑ හානි</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>මෙම කෘමීන් යුෂ උරා බීම නිසා ශාකවල වර්ධනය බාල වීම, පත්‍ර යටි අතට රෝල්වීම, කහවීම හා මැලවීම වැනි ලක්ෂණ ඇතිවේ.</li> <li>වෛරස් රෝග වාහකයන් ලෙස ක්‍රියා කරයි.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div> <p style="text-align: center;"><b>පිම් කීඩෑවා Flea Hopper- (<i>Halticus bractatus</i>)</b></p> <p>රෝග:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>දුඹුරු පුල්ලි රෝගය - රතු හෝ දම් පැහැයට හුරු දුඹුරු පුල්ලි (මැද වියළීමක් සහිත) ඇතිවී පත්‍රය පුරාම පැතිරේ. ශාක ආසාදිත කොටස් හා සුළඟ මගින් පැතිරේ.</li> <li>මළකඩ රෝගය - පත්‍ර යටි පැත්තේ මළකඩ වැනි පැල්ලම් ඇතිවේ. සුළඟ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය මගින් පැතිරේ.</li> <li>මුල් කුණු වීමේ රෝගය - තැනින් තැන ගොටුකොළ පඳුරු මුල් හා කඳ කුණු වීම. ශාකයේ පාදස්ථයේ සුදු පැහැ දිලීර ජාල දක්නට ලැබේ.</li> </ol> |



|                        |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                         | <p>4. බැක්ටීරියන් හිටු මැරීම - ගස කොළ පැහැයෙන් තිබියදීම ක්ෂණිකව මැලවී යාම සහ පසුව කුණුවී යාම, ආසාදිත ශාක වල රයිසෝමයේ කැපු හරස්කඩක් ජල වීදුරුවකට දැමූ විට බැක්ටීරියා ශ්‍රාවය දක්නට ලැබීම.</p> <p>5. පොට් වයිරස් - පත්‍ර තලය සහ වීම සහ දම් පැහැති පුල්ලි දක්නට ලැබීම.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>මලකඩ රෝගය</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>මුල් කුණුවීමේ රෝගය</p> </div> </div> <p>රෝග පාලනය:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• නිරෝගී රෝපණ ද්‍රව්‍ය භාවිතය.</li> <li>• ක්ෂේත්‍රයේ සනීපාරක්ෂාව පවත්වාගෙන යාම.</li> <li>• ජල වහනය දියුණු කිරීම මගින් ව්‍යාධිජනකයින්ගේ ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම</li> <li>• බෝග මාරුව අනුගමනය කිරීම (මුල් කුණුවීමේ රෝගය පාලනය සඳහා)</li> <li>• එක යායට වගා කිරීමේදී, තෙතමනය වැඩිවීම හේතුවෙන් දිලීර රෝග වැඩිවිය හැකිය. එබැවින්, පාත්ති වෙන් කිරීම මගින් මෙම තත්ත්වය යම් ප්‍රමාණයකට පාලනය කරගත හැකිය.</li> <li>• මුල් කුණුවීමේ රෝගය පාලනය සඳහා - ආසාදිත ශාක පස සමඟම ඉවත් කර විනාශ කළ යුතුවේ.</li> <li>• හොඳින් වල් මර්දනය කිරීම.</li> </ul> |
| සිටුවා දින 1- 14 දක්වා | වල් මර්දනය              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• මුල් කාලයේදී බෝගය භූමිය ආවරණය කර නොමැති බැවින් වල්පැළෑටි වැඩිම සීඝ්‍රයෙන් සිදු වේ.</li> <li>• මෙම වල්පැළෑටි අතින් ගලවා ඉවත් කිරීම සිදු කළ යුතුය.</li> <li>• මීට අමතරව අවශ්‍ය සෑම විටම වල් මර්දනය කළ යුතුය.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | කෘමි හානි හා රෝග මර්දනය | <p>කෘමිනාශක / දිලීරනාශක යෙදීම.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• රට තුල ලියාපදිංචි පළිබෝධනාශකයක් ද යන්න තහවුරු කර ගන්න.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>කෘමිනාශක යෙදීම <ul style="list-style-type: none"> <li>කීඩෑ හානි සඳහා 1 සටහනට අනුව එහි සඳහන් කෘමිනාශකයක් නිර්දේශිත ප්‍රමාණ වලින් භාවිතා කරන්න (1.1 කොටස).</li> </ul> </li> <li>දිලීරනාශක යෙදීම <ul style="list-style-type: none"> <li>දුඹුරු පුල්ලි රෝගය පාලනය සඳහා 1 සටහනට අනුව එහි සඳහන් දිලීරනාශක නිර්දේශිත ප්‍රමාණවලින් භාවිතා කරන්න (1.2 කොටස).</li> </ul> </li> </ul> <p>සැලකිය යුතුයි :-</p> <p>යුරෝපා රටවලට අපනයනය සඳහා වගා කිරීමේදී, යුරෝපා රටවල් සඳහා අනුමත පළිබෝධනාශක පමණක් භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ අනුව, සටහන 1හි දක්වා ඇති පළිබෝධනාශක භාවිතා කළ හැකිය. එම නිර්දේශයන් වරින් වර සංශෝධනවලට ලක්විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් දැනුවත්වීම ඉතා වැදගත් වේ.</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| සිටුවා දින 15 – 27<br>දක්වා |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ක්ෂේත්‍රය තුල හා අවට හොඳින් පිරිසිදු කර ගන්න.</li> <li>වල්පැළෑටි අතින් ගලවා ඉවත් කිරීම සිදු කළ හැකිය.</li> <li>වල්පැළෑටි, බෝග අවශේෂ, අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කරන්න (සුදුසු පරිදි අපහරණය කරන්න).</li> <li>කෘමිනාශක/ දිලීරනාශක යෙදීම (අදාල නිර්දේශ අනුව මුලදී යොදන ලද පළිබෝධනාශක දෙවන වටය සඳහා පමණක් යෙදිය හැකිය).</li> <li>අවශ්‍යතාවය අනුව රෝග පාලනය සඳහා 1 සටහනට අනුව එහි සඳහන් පළිබෝධනාශක භාවිතා කරන්න ( කීඩෑ හානි සඳහා කෘමිනාශකවලින් එක් වර්ගයක් හා දුඹුරු පුල්ලි රෝගය පාලනය සඳහා දිලීරනාශක වලින් එක් වර්ගයක් ද භාවිතා කරන්න).</li> </ul> |
| දින 28 -30                  | පළමු මතුපිට පොහොර යෙදීම<br>(සිටුවා සති 04) | <ul style="list-style-type: none"> <li>යුරියා කිලෝග්‍රෑම් 34 ක් අක්කරයකට යොදන්න. මෙය ද තෙත් වූ පසට යෙදිය යුතු අතර, හැකි තාක් පස සමඟ කලවම් කරන්න.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| දින 31 - 54                 |                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ක්ෂේත්‍රය අවට පිරිසිදු කරන්න.</li> <li>වල්පැළෑටි අතින් ගලවා ඉවත් කිරීම සිදු කළ හැකිය.</li> <li>වල්පැළෑටි, බෝග අවශේෂ, අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කරන්න (සුදුසු පරිදි අපහරණය කරන්න).</li> <li>ඇසඩ් ෫෦ ක් 50 ග්‍රෑ./ ලී ඊ.සී. (Azadirachtin 50 g/l EC) මිලිලීටර් 32 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර වර්ග මීටර 500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                           | <p>ක වපසරියකට යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට ඇසඩ්‍රැක්ටින් 50 mg/ ලී.ඊ.සී.මිලිලීටර් 640ක් යෙදිය යුතුවේ).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>අත්‍යාවශ්‍ය නම් පමණක් රෝග පාලනය සඳහා 1 සටහනට අනුව එහි සඳහන් පළිබෝධනාශක භාවිතා කරන්න. (කීඩු හානි සඳහා කෘමිනාශකවලින් එක් වර්ගයක් හා දුඹුරු පුල්ලි හා (සුදු) මළකඩ රෝග පාලනය සඳහා දිලීරනාශකවලින් එක් වර්ගයක් ද භාවිතා කරන්න).</li> </ul>    |
| දින 55 - 70             | කෘමි පළිබෝධයන් පාලනය                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>අස්වනු නෙළීමට ආසන්න බැවින්, අවශ්‍යම අවස්ථාවකදී නිර්දේශිත කාබනික පළිබෝධනාශක පමණක් යෙදීමට කටයුතු කරන්න.</li> <li>ඇසඩ්‍රැක්ටින් 50 ග්‍රෑම්/ලී. ඊ.සී. (Azadirachtin 50 g/l EC) මිලිලීටර් 32 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර වර්ග මීටර 500ක වපසරියකට යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට ඇසඩ්‍රැක්ටින් 50 ග්‍රෑම්/ලී. ඊ.සී. මිලිලීටර් 640 ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> </ul> |
| දින 56 - 60             | දෙවැනි මතුපිට පොහොර යෙදීම (සිටුවා සති 08) | යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 34 ක් අක්කරයකට යොදන්න. මෙය ද තෙත් වූ පසට යෙදිය යුතු අතර, හැකිතාක් පස සමඟ කළවම් කරන්න.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| දින 70 - 80             | පළමු අස්වැන්න නෙළීම                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>පරිණත වීමට පෙර අස්වැන්න නෙළීම.</li> <li>උදය කාලයේ අස්වනු නෙළන්න.</li> <li>පොළව මට්ටමට මඳක් ඉහළින් පසුර කපා ගැනීම හෝ මුල් සමඟ පැළ ආකාරයට ගැලවීම සිදු කළ හැකිය.</li> <li>නෙලූ අස්වැන්න පිරිසිදු ස්ථානයක ගබඩා කරන්න.</li> <li>නියමිත ලෙස අසුරා අප්‍රමාදව වෙළෙඳපොළට යවන්න.</li> </ul>                                                                 |
| අස්වනු නෙළීමෙන් පසු දින | පොහොර යෙදීම (සෑම අස්වනු නෙළීමකටම පසුව)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>අක්කරයකට යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 18 ක්, මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් (MOP) කිලෝග්‍රෑම් 6 ක් සමඟ මිශ්‍ර කර ඒකාකාරීව යොදන්න.</li> <li>පස සමඟ හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න.</li> <li>සෑම විටම තෙත් වූ පසට පොහොර යොදන්න.</li> </ul>                                                                                                                                        |
|                         | වටපණුවන් පාලනය                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>වගාවේ වටපණු හානි ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරයි නම් අදාළ ස්ථානයේ පසත් සමඟ ආසාදිත ශාක කොටස් ඉවත් කර සුදුසු වටපණු නාශකයක් යොදන්න (සටහන 1හි පරිදි)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| අස්වනු නෙළීමෙන්         | කෘමි හානි හා වල් මර්දනය                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ක්ෂේත්‍රය තුළ හා අවට හොඳින් පිරිසිදු කරන්න.</li> <li>වල්පැළෑටි අතින් ගලවා ඉවත් කිරීම සිදු කළ හැකිය.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| පසු දින 1 - 14                 |                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>වල්පැළෑටි, බෝග අවශේෂ, අනෙකුත් අපද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් කරන්න (සුදුසු පරිදි අපහරණය කරන්න).</li> <li>ඇසඩ්‍රැක්ටින් 50 ග්‍රෑ./ ලී.ඊ.සී. (Azadirachtin 50 g/l EC) මිලිලීටර් 32 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර වර්ග මීටර 500 ක වපසරියකට යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට ඇසඩ්‍රැක්ටින් 50 ග්‍රෑ./ ලී.ඊ.සී. මිලිලීටර් 640ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> <li>අවශ්‍යතාවය අනුව කෘමි හානි පාලනය සඳහා 1 සටහනට අනුව එහි සඳහන් කෘමිනාශකවලින් එක් වර්ගයක් පමණක් භාවිතා කරන්න (1.1).</li> </ul> <p><b>සැලකිය යුතුයි :-</b></p> <p>යුරෝපා රටවලට අපනයනය සඳහා වගා කිරීමේදී, යුරෝපා රටවල් සඳහා අනුමත පළිබෝධනාශක පමණක් භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ අනුව, සටහන 1හි දක්වා ඇති පළිබෝධනාශක භාවිතා කළ හැකිය. එම නිර්දේශයන් වරින් වර සංශෝධනවලට ලක්විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් දැනුවත්වීම ඉතා වැදගත් වේ.</p> |
|                                | දුඹුරු පුල්ලි හා පාදස්ථ කුණුවීම රෝග පාලනය | <ul style="list-style-type: none"> <li>අවශ්‍යතාවය අනුව රෝග පාලනය සඳහා 1 සටහනට අනුව එහි සඳහන් දිලීරනාශකවලින් එක් වර්ගයක් පමණක් භාවිතා කරන්න (1.2).</li> </ul> <p><b>සැලකිය යුතුයි :-</b></p> <p>යුරෝපා රටවලට අපනයනය සඳහා වගා කිරීමේදී, යුරෝපා රටවල් සඳහා අනුමත පළිබෝධනාශක පමණක් භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ අනුව සටහන 1හි දක්වා ඇති පළිබෝධනාශක භාවිතා කළ හැකිය. එම නිර්දේශයන් වරින් වර සංශෝධනවලට ලක්විය හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳ නිරන්තරයෙන් දැනුවත්වීම ඉතා වැදගත් වේ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| අස්වනු නෙළීමෙන් පසු දින 15 -30 | කෘමි පළිබෝධයන් පාලනය                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>අස්වනු නෙළීමට ආසන්න බැවින්, අවශ්‍යම අවස්ථාවකදී කාබනික පළිබෝධනාශක පමණක් යෙදීමට කටයුතු කරන්න.</li> <li>ඇසඩ්‍රැක්ටින් 50 ග්‍රෑ./ලී.ඊ.සී.(Azadirachtin 50 g/l EC) මිලිලීටර් 32 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර වර්ග මීටර 500 ක වපසරියකට යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට ඇසඩ්‍රැක්ටින් 50 ග්‍රෑ. /ලී.ඊ.සී. මිලිලීටර් 640 ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> <li>ඕනෑම වර්ගයක අනෝදා ඇට ග්‍රෑම් 25 - 30 ක් හොදින් අඹරා හෝ තලා පැය 24 ක් ජලය ලීටර් 1/2 ක පමණ පෙගෙන්න තබා එයට සබන් , ග්‍රෑම් 3 ක් පමණ දියකර ගත් ජලය ලීටර් 1/2 ක් පමණ එක්කර පෙරා ඉසින්න.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| දින 30 - 40                    | දෙවන අස්වනු නෙළීම                         | ඉහත පළමු අස්වැන්න නෙළීම සිදු කළ පරිදි කටයුතු කරන්න. පළමු අස්වැන්න දින 70-80 අතර ලබා ගත හැකි අතර, එය දින 35-40 කට වරක් අඛණ්ඩව වසර 4 කට ආසන්න කාලයක් නෙළාගත හැකිය.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



සටහන 01 (කෘමිනාශක හෝ දිලීරනාශක යෙදීම)

| වගා භානිය                                                  | රසායනික කෘමිනාශක හෝ දිලීරනාශක යෙදීම                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1.1) කෘමි පළිබෝධයන් වන පැළ මැක්කන් හා කීඩුවන් පාලනය       | <p><b>කෘමිනාශක යෙදීම:</b> පහත කෘමිනාශකවලින් <u>එක් වර්ගයක්</u> අදාළ නිර්දේශ අනුව ජලය ලීටර් 16 ක දිය කර නැප්සැක් දියර ඉසිනයක් භාවිතයෙන් ඉසින්න.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. සල්ෆොක්සර්ෆ්ලෝර් 50% ඩබ්.ජී. (Sulfoxaflor 50% WG) ග්‍රෑම් 5 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර (වර්ග මීටර 500 ක වපසරියකට) යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට සල්ෆොක්සර්ෆ්ලෝර් 50% ඩබ්.ජී. ග්‍රෑම් 100ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> <li>2. පයිරිඩබෙන් 20% ඩබ්. පී. (Pyridaben 20% WP) ග්‍රෑම් 12 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර (වර්ග මීටර 500 ක වපසරියකට) යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට පයිරිඩබෙන් 50% ඩබ්.ජී ග්‍රෑම් 250 ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> </ol> <p>පහත සඳහන් (කාබනික) කෘමිනාශකද ඉහත කෘමිනාශක සමඟ මාරුවෙන් මාරුවට පළිබෝධ පාලනය සඳහා යොදාගත හැකිය.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. කාබොක්සිලික් අම්ල (C<sub>14</sub>-C<sub>20</sub>) පොටෑසියම් ලවණ 479.8 ග්‍රෑ./ලී. ඊ. ඩබ් (Unsaturated Carboxylic acid (C<sub>14</sub> – C<sub>20</sub>) Potassium Salt 479.8 g/l EW මිලිලීටර් 100 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දිය කර යොදන්න (3.2 l/ha).</li> <li>2. එම්-පීඩ් 500 ග්‍රෑ./ලී. එස්.එල්. පොටෑසියම් ඔෆ් සෝල්ට් ෆැටි ඇසිඩ් 500 ග්‍රෑ./ලී. එස්.එල්. (M-PEDE – Potassium salts of fatty acid 500 g/l SL) – මිලිලීටර් 150 ක් ජලය ලීටර් 10 ක දියකර යොදන්න (4.8 l/ha).</li> </ol> |
| (1.2) දුඹුරු පුල්ලි, සුදු මළකඩ රෝග හා පාදස්ථ කුණුවීම පාලනය | <p><b>දිලීරනාශක යෙදීම:</b> පහත දි දිලීරනාශකවලින් <u>එක් වර්ගයක්</u> අදාළ නිර්දේශ අනුව ජලය ලීටර් 16 ක දිය කර නැප්සැක් දියර ඉසිනයක් භාවිතයෙන් ඉසින්න.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ඇසොක්සිස්ට්‍රොබින් 250 ග්‍රෑ./ලී. එස්. සී. (Azoxystrobin 250 g/l SC) මිලි ලීටර් 16 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර (වර්ග මීටර 500 ක වපසරියකට) යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට ඇසොක්සිස්ට්‍රොබින් 250 ග්‍රෑ./ලී. එස්. සී මිලි ලීටර් 320 - 500 ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> <li>2. කොපර් ඔක්සික්ලෝරයිඩ් 50% ඩබ්.පී (Copper Oxychloride 50% WP) ග්‍රෑම් 40 ක් ජලය ලීටර් 16 ක දියකර වර්ග මීටර 500ක වපසරියකට යෙදීම කළ හැකිය (හෙක්ටයාරයකට කොපර් ඔක්සික්ලෝරයිඩ් ග්‍රෑම් 800 - 1250 ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>පහත සඳහන් කාබනික දිලීරනාශක ද ඉහත දිලීරනාශක වෙනුවට යෙදිය හැකිය.</p> <p>පාදස්ථ කුණුවීම හා කොළ පුල්ලි රෝග පාලනය සඳහා ට්‍රයිකොඩර්මා අඩංගු ද්‍රව ආමුකුලනය භාවිතා කළ හැකිය.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• රෝපණ ද්‍රව්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා: සිටුවීමට පෙර ට්‍රයිකොඩර්මා අඩංගු ද්‍රව ආමුකුලනයක (මිලිලීටර 100 ක් ජලය ලීටර 10ක ) මිනිත්තු 10 ක් ගිල්වා තබා සිටුවීම.</li> <li>• සිටුවීමෙන් සෑම සතියකට වරක් උක්ත ට්‍රයිකොඩර්මා අඩංගු ද්‍රාවණය පැල හා පස හොඳින් තෙමෙන ලෙස ඉසින්න.</li> </ul> <p><b>සටහන:</b> ජෛව පළිබෝධනාශක භාවිතා කරනවිට රසායනික පළිබෝධනාශක භාවිතයෙන් වැළකී සිටින්න.</p> |
| (1.3) වටපණුවන් පාලනය | <p>පහත වටපණුනාශකය යෙදිය හැක.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ඇබමැක්ටින් 20 ග්‍රෑ./ලී. එස්. සී. (Abamectin 20 g/l SC) මිලිලීටර 3.75 ක් ජලය ලීටර 10 ක මිශ්‍ර කර වර්ග මීටර 10 ක ප්‍රදේශයක පස හා මිශ්‍ර කිරීම. මෙය නැවත අස්වැන්න නෙළීමෙන් පසු (දින 30කට පසු) යෙදීම සිදු කරන්න (හෙක්ටයාරයකට ඇබමැක්ටින් 20 ග්‍රෑ./ලී. එස්. සී. මිලිලීටර් 3750 ක් යෙදිය යුතුවේ).</li> </ol>                                                                                                                                                                                                               |

#### අමතර සටහන්

##### ජල සම්පාදන සහ පොහොර යෙදීම

- රසායනික/කාබනික පොහොර යෙදීමට පෙර හොඳින් ජල සම්පාදනය කරන්න.
- අස්වැන්න නෙළීමට පෙර හොඳින් ජල සම්පාදනය කිරීම මගින් වෙළෙඳපොළ අස්වැන්න වියළීම අඩුවීමෙන් පසු අස්වනු භානිය අවම වේ.

##### පළිබෝධනාශක යෙදීමේදී සැලකිය යුතු කරුණු

- අධික වටපණු භානියක් සහිත වගා ක්ෂේත්‍ර සඳහා වටපණුනාශක යෙදීමෙන් වළකින්න. එවැනි ක්ෂේත්‍ර මුළුමනින්ම ඉවත් කර ආසාදිත ශාක කොටස් පුළුස්සා අළුත් වගාවක් ආරම්භයේදී වටපණු පාලනයට අදාළ වගා පිළිවෙත් අනුගමනය කරන්න.
- පළිබෝධනාශක නියමිත මාත්‍රාවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් යෙදීම සහ එකම පළිබෝධනාශකය එක දිනටම යෙදීම මගින් මෙම පළිබෝධනාශක සඳහා ප්‍රතිරෝධී සතුන් හෝ රෝග කාරක ඇතිවිය හැකිය. එබැවින් නිර්දේශිත පළිබෝධනාශක මාරුවෙන් මාරුවට නියමිත මාත්‍රාව යෙදීමට වගබලා ගන්න.
- පෙර අස්වනු කාලය සැලකිල්ලට ගනිමින් අස්වනු නෙළීම සිදු කළ යුතුය.

**උපදේශකත්වය සහ සංස්කරණය:**

1. ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඒ.ආර්.ටී.වික්‍රමආරච්චි මයා (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව)
2. ආචාර්ය ජේ. ඒ. සුමිත් මයා (අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්- පර්යේෂණ)
3. ආචාර්ය රොෂනි එල්. හලිල් මිය (අධ්‍යක්ෂ - උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය)

**තාක්ෂණික දායකත්වය :**

1. සී. මාගමගේ මිය - අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (විශ්ලේෂණ රසායනික විද්‍යා)
2. එන්. ආර්.එන්. සිල්වා මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (පාංශු විද්‍යා)
3. ආචාර්ය කේ. එම්.ඩී.ඩබ්.පී. නිශාන්ත මයා - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (කීට විද්‍යා) - අතිරේක අධ්‍යක්ෂ (පැළෑටි සංරක්ෂණ සේවය)
4. ඩී.පී. කරුණානන්ද මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශාක විද්‍යා)
5. ආචාර්ය එම්. ජී.එස්.පී. පතිරණ මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශාක අභිජනන)
6. ආචාර්ය අයි. ඩබ්.එම්.අයි.ඩබ්.ටී.කේ. ඉලංගකෝන් මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (වල් පැළෑටි වෙනත් බෝග)
- 7.එම්. එස්.ඩබ්. ප්‍රනාන්දු මිය - ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ (ශාක ව්‍යාධි විද්‍යා) සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
8. එන්.බී.යූ. දිසානායක මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
9. පී.පී. එච්.එම්.එස්.එන්. භේරත් මයා -සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
10. ආචාර්ය පී. එච්. රණවීර මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
11. ආචාර්ය එම්.ඒ.පී. මායාකඩුව මෙය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

**සම්පාදනය :**

01. එන්.එම්.උබේසේකර මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
02. එච්.එච්.එම්.එන්.කේ.හපුකොටුව මිය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
03. එස්.ඩී.එච්.දුලංජලා මෙය - සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)