

七年级4班 晏语佳 周末错题复习

范围：周六 2026 - 05 - 23、周日 2026 - 05 - 24

使用说明

- 每道错题先读原题和原图，再完成“方法提醒”和“挖空复盘”。
- 公式类题目保留原始题图，订正时请把关键条件重新抄写一遍。
- 订正时不要只写答案，要写出定义、化简依据或方程步骤。

本次错题概况

- 可复习错题：6 条。
- 题型分布：平方根与算术平方根 3 条；立方根 / 方程 2 条；循环小数化分数 1 条
- 复习重点：平方根、立方根、实数分类和根式应用题要先写规则，再计算。

周六 | 2026-05-23

这一天共有 6 条可复习错题。

周日 | 2026-05-24

这一天暂无可用错题记录。

周六 | 2026-05-23 错题 1 | 循环小数化分数 | 记录 wechat-6f11e991f314c1b0

原题：下列各数：1.56791， $(\frac{2}{3})\pi$ ，3.14，-1.234567...， $5\frac{2}{7}$ ，5.82（循环小数）中，无理数有____个，分数有____个。

原始题图

1. 下列各数 1.56791, $\frac{2}{3}\pi$, 3.14, -1.234567..., $5\frac{2}{7}$, $5.\dot{8}\dot{2}$ 中, 无理数有____个, 分数有____个.

方法提醒

- 先设循环小数为x，再乘10、100或1000让循环节对齐。
- 两式相减消掉循环部分，最后把方程化为最简分数。
- 循环节位数不同，乘的10的幂也不同。


挖空复盘

- 设循环小数为x后，要乘 _____ 的幂让循环节对齐。
- 两式相减的目的是消去 _____ 部分。
- 最后结果要化成 _____ 分数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原題：下列各式中，正确的是（ ）。A. $-\sqrt{-49} = -(-7) = 7$ ；B. $\sqrt{2\frac{1}{4}} = 1\frac{1}{2}$ ；C. $\sqrt{4+\frac{9}{16}} = 2+\frac{3}{4} = 2\frac{3}{4}$ ；D. $\sqrt{0.25} = \pm 0.5$ 。

原始題圖



方法提醒

- 平方根通常有两个，互为相反数；算术平方根只取非负值。
- $\sqrt{(a^2)} = |a|$ ，需要根据a的符号去掉绝对值。
- 用平方根条件列方程时，先判断两个平方根是否互为相反数。

挖空复盘

- 一个正数的平方根有 _____ 个。
- 算术平方根必须是 _____ 数。
- $\sqrt{(x^2)}$ 应先写成 _____，再按x的符号化简。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题： $\pm 9/14$ 是____的平方根，0.0169的平方根是____，13的算术平方根是____。

原始题图

$\pm \frac{9}{14}$ 是____的平方根，0.0169的平方根是____，13的算术平方根是____。

方法提醒

- 平方根通常有两个，互为相反数；算术平方根只取非负值。
- $\sqrt{(a^2)}=|a|$ ，需要根据a的符号去掉绝对值。
- 用平方根条件列方程时，先判断两个平方根是否互为相反数。

挖空复盘

- 一个正数的平方根有 _____ 个。
- 算术平方根必须是 _____ 数。
- $\sqrt{(x^2)}$ 应先写成 _____，再按x的符号化简。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：一个数的算术平方根为 $2M-6$ ，平方根为 $\pm(M-2)$ ，求这个数。

原始题图

一个数的算术平方根为 $2M-6$ ，平方根为 $\pm(M-2)$ ，求这个数。

方法提醒

- 平方根通常有两个，互为相反数；算术平方根只取非负值。
- $\sqrt{a^2}=|a|$ ，需要根据 a 的符号去掉绝对值。
- 用平方根条件列方程时，先判断两个平方根是否互为相反数。

挖空复盘

- 一个正数的平方根有 _____ 个。
- 算术平方根必须是 _____ 数。
- $\sqrt{x^2}$ 应先写成 _____，再按 x 的符号化简。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：求下列各数的立方根：(1)729；(2) $-4\frac{17}{27}$ ；(3) $-\frac{125}{216}$ ；(4) $(-5)^3$ 。

原始题图

4. 求下列各数的立方根：

$$(1)729;(2)-4\frac{17}{27};(3)-\frac{125}{216};(4)(-5)^3.$$

方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则a是b的_____。
- 解三次根号方程时，两边可以同时_____。
- 负数的立方根仍是_____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区

原题：若 $x < 0$ ，则 $\sqrt{x^2} - \sqrt[3]{x^3}$ 等于（ ）。A. x ；B. $2x$ ；C. 0 ；D. $-2x$ 。

原始题图

若 $x < 0$ ，则 $\sqrt{x^2} - \sqrt[3]{x^3}$ 等于()

A. x

B. $2x$

C. 0

D. $-2x$

方法提醒

- 立方根可以是正数、0或负数，负数也有立方根。
- 解含立方根的方程时，先把三次根号单独放一边再立方。
- 计算前注意负号、括号和带分数的转化。

挖空复盘

- 若 $a^3=b$ ，则 a 是 b 的_____。
- 解三次根号方程时，两边可以同时_____。
- 负数的立方根仍是_____数。
- 我这题真正错在：_____。
- 下次看到同类题，我先做：_____。

订正区
