

第 1 题

谢雨彤 | 数学· 初2020级· 六年级· 1班· 小衔初 | 上传：2026-06-23 19:11:40

记录：wechat-e74ca9d4325ded6d

$$(2) -3^2 \times \left| \frac{1}{3} - 1 \right| - (-7) + 5$$

方法提醒 | 有理数计算

- 计算顺序先乘方和绝对值，再乘除，最后加减；负号和括号单独标出来。
- 每一步只改一个运算，箭头标明符号变化，防止 -3^2 与 $(-3)^2$ 混淆。


任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：223x77

第2题

谢雨彤 | 数学·初2020级·六年级·1班·小衔初 | 上传：2026-06-23 19:11:41

记录：wechat-17b855a9a1899ad6

18. 如图，直线 l 与直线 a, b 分别交于点 A, B ，点 C 在直线 a 上，点 D 和点 E 在直线 b 上，连接 AD, CE 。若 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ ， $\angle 3 = \angle 4$ ，求证： $AD \parallel CE$ 。阅读下面的证明过程，并填空。



证明： $\because \angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ （已知），
 $\angle 1 + \angle 5 = 180^\circ$ （邻补角的定义），
 $\therefore \angle 2 = \angle 5$ （_____）。
 $\therefore$ _____ $\parallel$ BE （_____）。
 $\therefore \angle 3 + \angle ADE = 180^\circ$ （_____）。
 $\because \angle 3 = \angle 4$ （已知），
 $\therefore \angle 4 +$ _____ $= 180^\circ$ （等量代换）。
 $\therefore AD \parallel CE$ （同旁内角互补，两直线平行）。

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，箭头连接“已知条件 $\rightarrow$ 中间结论 $\rightarrow$ 所求结论”。

任务状态：ready | 识别：recognized | 图片：842x647

第 3 题

谢雨彤 | 数学· 初2020级· 六年级· 1班· 小衔初 | 上传：2026-06-23 19:11:41

记录：wechat-765ca6b134e6b818

19. 列方程解下列问题：

某电商用 22000 元从厂家购进了 A 、 B 两种商品共 500 件，其中 A 商品每件进价 80 元， B 商品每件进价 20 元.

(1)求购进 A 、 B 两种商品各多少件.

(2)该电商以每件 30 元的价格销售 B 商品，售出 $\frac{1}{3}$ 后开展促销活动，剩下的 B 商品在原来售价基础上降价售完. 已知 B 商品共获利润 1800 元，求促销活动中， B 商品降价了多少元.


方法提醒 | 方程应用

- 先设未知数并列表：数量、单价、总价、速度、时间或路程要分别写清。
- 列方程前先写等量关系，解完要回到题目单位和限制条件检查。

第 4 题

四、单选题

20. 按下面的程序计算：当输入 $x=10$ 时，输出结果是 86；当输入 $x=5$ 时，输出结果是 122；
如果输入 x 的值是正整数，输出结果是 158，那么满足条件的 x 的值最多有（ ）



- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

方法提醒 | 程序逆推

- 先把程序每一步写成代数式，再用已知输入输出反求参数或判断分支。
- 如果问最多值，从输出结果反推所有可能输入，再筛正整数限制。

第 5 题

五、多选题

21. 已知关于 x,y 的代数式 $A=2x^3y+2x^2+xy+x$ ，代数式 $B=x^3y+x^2-xy-x$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 代数式 A 为三次四项式
- B. 当 $x=2$ ， $y=-1$ 时， $A+B=-12$
- C. 当 $x=2$ 时， $|A+B|=10$ ，则 $y=-\frac{1}{12}$
- D. 若 $A-2B$ 与 x 无关，则 $y=-1$

方法提醒 | 代数定义

- 先把题目定义翻译成式子，至少写出前两步操作或前几个对象。
- 判断说法时逐条代入定义，别凭字面感觉；限制条件要单独圈出。

第 6 题

26. 列方程解决问题：

小维和小浩分别从甲、乙两地同时出发，小维骑自行车，小浩步行，沿同一条道路相向匀速而行，出发 0.5 小时后两人相遇。已知小维骑自行车比小浩步行每小时多行进 10 千米，甲、乙两地相距 7.5 千米。

(1)两人每小时分别行进多少千米？

(2)相遇后，两人保持原速度原方向继续前进，小维到达乙地后休息 0.4 小时，再沿原路以 15 千米/小时的速度返回甲地，求小维返回甲地时，小浩距离甲地的距离。

方法提醒 | 方程应用

- 先设未知数并列表：数量、单价、总价、速度、时间或路程要分别写清。
- 列方程前先写等量关系，解完要回到题目单位和限制条件检查。