

2020级·六年级·1班·衔接 杨雨晴 6月5日错题复习

范围：2026-06-05（左闭右开查询：2026-06-05 00:00:00 至 2026-06-06 00:00:00）

老师：何姝健 可复习错题总数：4

使用说明：每题先看题面区，按老师提示重新找入口，再补完复盘空格，最后在书写区完整重做。提示不是答案，订正时要把条件、关系式、计算和检验补完整。

本次错题概况

本次共 4 题，全部来自微信小程序错题库，状态为 recognized + active。记录时间集中在 2026-06-05 18:11 至 18:17。

错因分布

审题问题 1 题；细节问题 2 题；知识点问题 1 题

复习重点

重点关注转动几何中的分段讨论、代数式代入时的符号与指数检查、相遇问题的速度和关系，以及数轴线段题中绝对值去括号的变号。

每日题量说明


2026-06-05：4 题

6月5日 | 2026-06-05 错题 1 | 审题问题 | 记录
wechat-e47f05abccf7dabe

原题 / 原图

15 千米/小时的速度返回甲地，求小维返回甲地时，小浩距离甲地的距离。

27. 如图 1，已知直线 $AB \parallel CD$ ，点 E, F 是直线 CD 上两点，点 E 在点 F 左侧，点 G 是直线 AB 上一点，连接 FG ， FH 平分 $\angle EFG$ 交 AB 于点 H 。



(1) 若 $\angle HGF = \alpha$ ，则 $\angle HFD =$ _____；

(2) 如图 2，点 M 是线段 HF 上一点，连接 EM ， FN 平分 $\angle EFH$ 交 EM 于点 N 。作 FR 交 AB 于点 R ，点 R 在线段 HG 上，且满足 $\angle HFR = \frac{1}{4} \angle FHG$ ，当 $\angle HMN + \frac{4}{3} \angle NFR = 180^\circ$ 时，求证：
 $EM \parallel FG$ ；

(3) 如图 3，若 $\angle HGF = 36^\circ$ ，点 I 是射线 HA 上一点，射线 FG 以每秒 4° 的速度绕点 F 逆时针转动，射线 HI 以每秒 16° 的速度绕点 H 逆时针转动，当射线 HI 转至与射线 HB 重合时立即以相同速度绕点 H 顺时针回转，若它们同时开始转动，设转动时间为 t 秒，当射线 HI 回到出发时的位置时，射线 FG ， HI 同时停止转动，则在转动过程中，当射线 FG 所在直线与射线 HI 所在直线互相垂直时，请直接写出所有符合条件的 t 的值，并写出求解 t 的值的其中一种情况的过程。

题干摘要：27. 如图1，已知直线 $AB \parallel CD$ ，点 E, F 是直线 CD 上两点，点 E 在点 F 左侧，点 G 是直线 AB 上一点，连接 FG ， FH 平分 $\angle EFG$ 交 AB 于点 H 。(1) 若 $\angle HGF = \alpha$ ，则 $\angle HFD =$ _____；(2) 如图2，点 M 是线段 HF 上一点，连接 EM ， FN 平分 $\angle EFH$ 交 EM 于点 N 。作 FR 交 AB 于点 R ，点 R 在线段 HG 上，且满足 $\angle HFR = \dots\dots$

学生自述：第三小温的那个线段屏一下来的时候,方向错了

方法提醒

先把转动过程按时间分段，标出逆时针、顺时针和临界位置。

孩子没有正确理解射线 HI 的转动规则：先逆时针转动，与 HB 重合后立即顺时针回转。在求解两线垂直时，只考虑了逆时针阶段，遗漏了顺时针阶段可能出现……

下次遇到类似转动问题，先画出时间轴分段，分别列出逆时针和顺时针阶段的角度表达式，再根据垂直条件列方程求解，并验证解是否在对应时间段内。

挖空复盘

【转动分段检查】

这题要先分清射线 HI 的两个阶段：先是 _____，到达 HB 后改为 _____。列垂直条件时，每个 t 都要检查它属于 _____。

这题的具体提醒：孩子没有正确理解射线 HI 的转动规则：先逆时针转动，与 HB 重合后立即顺时针回转。在求解两线垂直时，只考虑了逆时针阶段，遗漏了顺时针阶段可能出现的解。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

6月5日 | 2026-06-05 错题 2 | 细节问题 | 记录
wechat-8b20e1daf3685032

原题 / 原图

21. 已知关于 x, y 的代数式 $A = 2x^3y + 2x^2 + xy + x$ ，代数式 $B = x^3y + x^2 - xy - x$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 代数式 A 为三次四项式
- B. 当 $x = 2$ ， $y = -1$ 时， $A + B = -12$
- C. 当 $x = 2$ 时， $|A + B| = 10$ ，则 $y = -\frac{1}{12}$
- D. 若 $A - 2B$ 与 x 无关，则 $y = -1$

题干摘要：21. 已知关于 x, y 的代数式 $A = 2x^3y + 2x^2 + xy + x$ ，代数式 $B = x^3y + x^2 - xy - x$ ，下列说法正确的是（ ）
A. 代数式 A 为三次四项式 B. 当 $x = 2$ ， $y = -1$ 时， $A + B = -12$ C. 当 $x = 2$ 时， $|A + B| = 10$ ，则 $y = -(1)/(12)$ D. 若 $A - 2B$ 与 x 无关，则 $y = -1$

学生自述：判断B选项的时候，算错了，导致判断错误

方法提醒

先把 $A + B$ 或 $A - 2B$ 化简，再把 x, y 的值逐步代入。

在计算 $A + B$ 并代入 $x = 2, y = -1$ 时，未能正确进行合并同类项或符号运算，导致数值结果错误。

下次做此类题时，先化简代数式再代入，并分步计算，每步检查符号和指数。

挖空复盘

【代入计算复核】

判断 B 选项前，先把 $A + B$ 合并成 _____，再代入 $x = 2, y = -1$ 。遇到负数和指数时，最容易漏查的是 _____。

这题的具体提醒：在计算 $A + B$ 并代入 $x = 2, y = -1$ 时，未能正确进行合并同类项或符号运算，导致数值结果错误。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

6月5日 | 2026-06-05 错题 3 | 知识点问题 | 记录

wechat-6fc08237ac33055a

原题 / 原图

(2)当CD运动到图2的位置时，用“ m ”和“ n ”表示MN的长。

26. 列方程解决问题：

小维和小浩分别从甲、乙两地同时出发，小维骑自行车，小浩步行，沿同一条道路相向匀速而行，出发 0.5 小时后两人相遇。已知小维骑自行车比小浩步行每小时多行进 10 千米，甲、乙两地相距 7.5 千米。

(1)两人每小时分别行进多少千米？

(2)相遇后，两人保持原速度原方向继续前进，小维到达乙地后休息 0.4 小时，再沿原路以

题干摘要：26. 列方程解决问题：

小维和小浩分别从甲、乙两地同时出发，小维骑自行车，小浩步行，沿同一条道路相向匀速而行，出发 0.5 小时后两人相遇。已知小维骑自行车比小浩步行每小时多行进 10 千米，甲、乙两地相距 7.5 千米。(1) 两人每小时分别行进多少千米？(2) 相遇后，两人保持原速度原方向继续前进，小维到达乙地后休息 0.4 小时，再沿原路以原速度返回甲地。求小维从出发到返回甲地共用多少时间？

学生自述：立方承解雲幼姬没有立方承

方法提醒

先圈出速度差、总路程和相遇时间，再设一个未知数列等量关系。

孩子没有理解题目中“两人速度差为10千米/时”和“相距7.5千米”的条件，未能建立关于速度之和的方程，导致无法求出各自的速度。

下次先读题划出等量关系（速度和与路程），设未知数后根据“速度和 $\times$ 时间=总路程”列方程，然后求解并检验单位。

挖空复盘

【相遇关系建模】

设小浩每小时行进 x 千米，则小维每小时行进 _____ 千米。相遇时使用的等量关系是 _____ $\times 0.5 = 7.5$ 。

这题的具体提醒：孩子没有理解题目中“两人速度差为10千米/时”和“相距7.5千米”的条件，未能建立关于速度之和的方程，导致无法求出各自的速度。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区

6月5日 | 2026-06-05 错题 4 | 细节问题 | 记录

wechat-a38623031e17e1f4

原题 / 原图

24. 对于数轴上的两条线段，给出如下定义：若一条线段 l 的中点恰好是另一条线段 m 的一个三等分点，则称线段 l 是线段 m 的和谐线段. 在数轴上，点 A, B, C, D 表示的数分别为 $2x, -4-2x, \frac{1-x}{3}, \frac{10-x}{3}$ ，且 A, B 不重合. 若线段 AB 是线段 CD 的和谐线段，则 x 的值为_____.

题干摘要：24. 对于数轴上的两条线段，给出如下定义：若一条线段 l 的中点恰好是另一条线段 m 的一个三等分点，则称线段 l 是线段 m 的和谐线段。在数轴上，点 A, B, C, D 表示的数分别为 $2x, -4-2x, (1-x)/3, (10-x)/3$ ，且 A, B 不重合。若线段 AB 是线段 CD 的和谐线段，则 x 的值为_____。

学生自述：计算错误，去绝对值的时候没有变号，导致第二个答案错了

方法提醒

先写出中点和三等分点对应的数，再分情况处理绝对值或位置关系。

在解绝对值方程时，没有正确考虑绝对值内表达式的正负性，导致去绝对值后符号错误，从而得到错误的解。

下次遇到绝对值方程时，先判断绝对值内表达式的符号，然后分情况讨论去绝对值，注意符号变化。

挖空复盘

【绝对值符号辨析】

线段 AB 的长度要写成

_____。去绝对值时，需要按表达式的正负分情况，第二种情况变号时特别检查_____。

这题的具体提醒：在解绝对值方程时，没有正确考虑绝对值内表达式的正负性，导致去绝对值后符号错误，从而得到错误的解。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区
