
Gene-level mediation of the treatment effect on the global TE axis
point = estimate; bar = bootstrap 95% CI; grey = 95% range of matched random genes
* BH-FDR < 0.05 vs matched random genes
gill, developmental (total effect -0.90 SD)
atf7ip
atrx
chaf1a
daxx
dnmt1
dnmt3ab
dnmt3bb.1
ehmt2
ezh2
kdm1a
mettl3
morc2
mov10a
mphosph8
myca
pphln1
rb1
runx3
safb
setdb1a
setdb1b
smarcad1a
tasora
tasorb
tp53
uhrf1
ythdc1
yy1a
yy1b
znf438
gabra1
gabra2a
gabra4
gabra5
gabra6a
gabrb2a
gabrb3
gabrd
gabrg2
gabrr2a
gabbr1a
gabbr1b
gabbr2
gad2
abat
slc6a1b
slc6a11b
slc6a13
slc12a2
tshr
trh
trhra
trhr2
tg
slc5a5
duox
duox2
pax8
dio1
dio2
dio3a
thrb
slc16a2
slc16a10
thrsp
slc2a1a
slc2a1b
slc2a2
slc2a3a
slc2a3b
slc2a6
slc2a8
slc2a9l1
slc2a9l2
slc2a10
slc2a11b
slc2a12
slc2a15a
95% range, matched random genes
−1.5
−1.0
−0.5
0.0
0.5
indirect effect on TE axis (SD) = a × b