
Treatment effects on candidate genes
** BH-FDR < 0.05 (per tissue × contrast), · p < 0.05
atf7ip
atrx
chaf1a
daxx
dnmt1
dnmt3ab
dnmt3bb.1
ehmt2
ezh2
kdm1a
mettl3
morc2
mov10a
mphosph8
myca
pphln1
rb1
runx3
safb
setdb1a
setdb1b
smarcad1a
tasora
tasorb
tp53
uhrf1
ythdc1
yy1a
yy1b
znf438
gabra1
gabra2a
gabra3
gabra4
gabra5
gabra6a
gabra6b
gabrb1
gabrb2
gabrb3
gabrb4
gabrd
gabrg1
gabrg2
gabrp
gabrr2a
gabrr3a
gabbr1a
gabbr1b
gabbr2
gad2
abat
slc32a1
slc6a1a
slc6a1b
slc6a11b
slc6a13
slc12a2
slc12a5b
tshba
tshr
trh
trhra
trhr2
tg
slc5a5
duox
duox2
pax8
dio1
dio2
dio3a
thrb
slc16a2
slc16a10
thrsp
slc2a1a
slc2a1b
slc2a2
slc2a3a
slc2a3b
slc2a6
slc2a8
slc2a9l1
slc2a9l2
slc2a10
slc2a11b
slc2a12
slc2a15a
brain dev
brain intergen
gill dev
gill intergen
liver dev
liver intergen
log2 fold change vs control
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0