回帰分析

データから数値を予測する

テーマ3

前回の「予測できるかも」を確かめる

前回は、気温とアイスの購入額を **散布図と回帰直線** で表しました。

関係を見る
散布図・相関係数

→

式を求める
Pythonで学習・予測

→

確かめる
別の期間で誤差を評価

今回は、自分で実行し、予測がどのくらい当たるか確かめます。

ペンギンで操作を確認 → アイスで予測を評価 → 電力需要で演習

回帰で予測するもの

回帰は、入力から **数値** を予測する方法です。

例	説明変数（入力）	目的変数（予測する値）
ペンギン	翼の長さ	体重
アイスクリーム	気温や湿度	平均購入額
電力需要	気温・相対湿度・日照時間	1時間平均の電力需要

予測値と実測値は、一般には一致しません。

講義と実習の進め方

スライドで、考え方と図の見方を確認します。

「Notebookで実習」 が出たら、指定の見出しへ移ります。

本文は上から順に実行し、結果を確認したら戻ります。

> コードの暗記より、入力・出力と結果の意味を押さえます。


相関係数

前回の復習：相関係数 r は、**直線的な関係の向きと強さ** を表します。

値	散布図の傾向
$+1$ に近い	強い右上がり
-1 に近い	強い右下がり
0 に近い	直線的な関係が弱い

負の相関でも、絶対値が大きければ強い相関です。

散布図と相関係数の対応



人工データの例。右下は相関係数がほぼ0でも、曲線の関係があります。

相関から分かることの範囲

相関係数と散布図を一緒に確認します。

- 曲線の関係は、相関係数だけでは捉えにくい
- 少数の極端な値が、相関係数に影響する場合がある
- 相関だけで、原因と結果の関係は証明できない

気温と購入額には、季節など共通の要因も関わります。

Notebookで実習 ①

2. 散布図と相関係数

1. 6つの散布図を表示する
2. 正負の相関と、絶対値の大きさを比べる
3. 曲線の図で、相関係数だけでは分からないことを考える

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。

前回の記号と、今回の記号

同じ意味でも、資料やライブラリによって記号が変わります。

意味	前回の資料	今回のスライド・Notebook
入力	x	x
実測値（観測値）	t	y
予測値	y	$\hat{y}$（ワイハット）
傾き・切片	a, b	w, b

実測値 y と予測値 $\hat{y}$ を区別して読みます。

単回帰の式

説明変数が1つの線形回帰を **単回帰** と呼びます。

$$\hat{y} = wx + b$$

記号	意味	ペンギンの例
x	入力	翼の長さ（mm）
$\hat{y}$	予測値	体重の予測値（g）
w	傾き	1mm長い入力での予測値の変化
b	切片	入力が0のときの式の値

ペンギンの翼の長さと体重

Palmer Penguinsの **Adelieだけ** を使います。

- 1行は1羽の記録
- 入力は翼の長さ、予測するのは体重
- この2列の欠損を除いた151羽を使用
- 種による違いを混ぜないよう、1種類に絞る

出典: Palmer Penguins。観測はKristen Gorman氏とPalmer Station LTER。データはCC0。


「式を求める」と「式に入力する」

```
X = adelie[['flipper_length_mm']]  # 表: (151, 1)
y = adelie['body_mass_g']          # 1列: (151,)
model = LinearRegression()
model.fit(X, y)
model.predict(X)
```

操作	渡すもの	得られるもの
`fit(X, y)`：学習	入力と実測値	傾き `coef_` と切片 `intercept_`
`predict(X)`：予測	入力だけ	体重の予測値 $\hat{y}$

この例は学習した151羽への当てはまりを見ます。未知データでの評価は後半で行います。

ペンギンの回帰直線



点は1羽の実測値。直線上の同じ翼の長さの位置が予測値です。

点と直線の縦の距離が、実測値と予測値のずれを表します。

傾きと切片の読み取り

体重の予測値（g） ≈ **32.83 × 翼の長さ（mm） − 2535.84**

- 傾きは約32.83 g/mm
- 翼が1mm長い入力では、予測値が約32.83g大きくなる
- 190mmでの予測は約3702.2g

切片は翼の長さ0mmでの式の値です。

観測範囲外なので、実際の体重として解釈しません。

学習：二乗したずれを小さくする

前回の **平均二乗誤差** を小さくするように、傾きと切片を求めます。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

- $y_i - \hat{y}_i$ は、i 番目の実測値と予測値のずれ
- ずれを2乗して足し、件数 n で割る
- `fit(X, y)` が、この計算に基づいて係数を求める

この方法を **最小二乗法** と呼びます。

同じデータでは、2乗の合計を最小にしても、平均を最小にしても同じ係数になります。

Notebookで実習 ②

3. ペンギンの翼の長さと体重で単回帰を試す

1. 回帰式と、図の縦方向のずれを確認する
2. 翼の長さを172〜210mmの範囲で変えて予測する
3. 傾きの単位と、予測値の変化を説明する

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。

内挿と外挿

予測する入力	呼び方	注意点
観測した範囲の中	内挿	範囲内でも予測にはずれがある
観測した範囲の外	外挿	同じ関係が続くとは限らない

翼の長さ0mmで式を計算できても、妥当な予測とは限りません。

次はアイスのデータで、学習に使わなかった期間の予測を試します。

アイスクリームのデータ

`ice.csv` ：2003〜2012年の120か月。**1行は1か月** です。

役割	使用する値
目的変数	アイスクリームの平均購入額（円）
説明変数	日最高気温の平均（℃）、月の降水量の合計（mm）
説明変数	平均湿度（%）、日最高気温25℃以上の日数（日）

地域・購入額の集計対象・一次出典は元教材に記載がありません。
店舗の売上や個人の購入額とは断定せず、教材のデータとして扱います。

式を作る期間と、確かめる期間を分ける

学習：2003〜2010年

96か月の気象 ＋ 購入額

↓ `fit`

回帰式の係数を決める

テスト：2011〜2012年

24か月の気象

↓ `predict`

購入額を予測

式を固定してから、テスト期間の実測値と予測値を比べます。

時間順に分けます。相関・係数・比較用の平均は、学習期間だけで求めます。


Notebookで実習 ③

4. アイスクリームのデータを読む／5. 学習期間とテスト期間を分ける

1. 表の列名・単位・欠損を確認する
2. 学習96件、テスト24件になっていることを確認する
3. なぜ未来のデータを学習に混ぜないか考える

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。

気象と購入額の関係



1点は学習期間の1か月。横軸の気象値と、縦軸の購入額を組にしています。
気温との図は右上がりですが、同じくらいの気温でも購入額には幅があります。


気温による単回帰

```
x_col = '日最高気温の平均(℃)'
single_model = LinearRegression()
single_model.fit(train_df[[x_col]], y_train)
new_weather = pd.DataFrame({x_col: [25.0]})
single_model.predict(new_weather)
```

25℃は、その月の日最高気温の平均 を表します。

ある1日の気温から、個人の購入額を予測する例ではありません。

気温と平均購入額の回帰直線



横軸で気温を選び、直線の高さを読むと購入額の予測値になります。
点は実測値です。直線と点が一致しない分だけ、予測にずれがあります。

Notebookで実習 ④

6. 気象データと購入額の関係を見る／7. 気温から購入額を予測する（単回帰）

1. 散布図と相関係数の向きを確かめる
2. 回帰式の傾きと単位（円/℃）を確認する
3. 学習範囲内で入力する気温を変え、予測値を比べる

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。

気温だけでなく、他の気象も使うと？

単回帰では、気温が同じなら同じ購入額を予測します。

1か月の4つの入力
気温・降水量
湿度・高温日数

→

重回帰の式
各入力 × 係数
を足し、切片を加える

→

1つの出力
その月の
購入額の予測値

目的変数は購入額のまま、説明変数を1つから4つに増やします。

重回帰の式とコード

説明変数を複数使う線形回帰を **重回帰** と呼びます。

$$\hat{y} = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_p x_p + b$$

p は説明変数の数で、今回は $p = 4$ です。

気温・降水量・湿度・高温日数を使います。

```
multi_model = LinearRegression()
multi_model.fit(train_df[feature_columns], y_train)
```

説明変数を増やしても、未知データの誤差が必ず減るとは限りません。

重回帰の係数の意味

気温の係数は、基本設定で **約17.52円/℃** です。

> 他の3つの入力を固定すると、気温が1℃高い入力で
> 購入額の予測値が約17.52円増える。

- 他の変数も含めた式の性質を表す
- 単位が異なる係数の絶対値だけで、重要度を比べない
- 係数を、その変数の因果効果とは解釈しない

相関と重回帰の係数

学習期間では、湿度と購入額の相関は正、重回帰の湿度の係数は負です。

見ているもの	関係の捉え方
相関	2つの変数だけの関係
重回帰の係数	他の説明変数を固定した式の関係

2つの変数を見るときと、他の入力も含めた式では、符号が違う場合があります。

補足：説明変数どうしに強い直線的な関係がある状態を多重共線性と呼びます。係数が不安定になることがあるため、係数の符号だけで原因を判断しません。

Notebookで実習 ⑤

8. 複数の気象変数を使う（重回帰）

1. 4つの説明変数の係数と切片を表示する
2. 気温の係数の意味を、単位付きで説明する
3. 説明変数どうしの相関を確認する

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。

小さな例で誤差を確かめる

前回の「誤差」と同じく、**実測値 − 予測値** を残差と呼びます。

実測値（円）	予測値（円）	残差（円）	残差の2乗（円²）
500	400	+100	10,000
500	600	−100	10,000
500	200	+300	90,000

+100円は100円の過小予測、−100円は100円の過大予測です。
正負が打ち消し合わないよう、学習時と同じく2乗して集計します。

二乗誤差で評価する：RMSE

前回の平均二乗誤差に **平方根をとり、元の単位に戻した値** です。
学習と同じ二乗誤差に基づき、**テスト期間**の予測を評価します。

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- ずれ → 2乗 → 平均 → 平方根、の順に計算する
- 小さいほど良い。大きなずれの影響を強く受ける
- 先ほどの例：$\sqrt{(10000 + 10000 + 90000)/3} \approx 191.5$ 円

RMSEが100円でも、すべての月の誤差が100円以内という意味ではありません。

比較する簡単な予測方法

回帰モデルと一緒に、**平均を使う2つの基準** も評価します。

方法	予測に使う値
学習期間の平均	96か月の購入額の平均を毎月予測
学習期間の同じ月の平均	例えば7月なら、学習期間の7月の平均

平均の計算にも、テスト期間の購入額は含めません。

季節性を使うだけで、どこまで予測できるかを比べます。

テスト期間の評価結果

方法	RMSE（円）
学習期間の平均	327.0
学習期間の同じ月の平均	67.5
単回帰	146.1
重回帰	108.4

- 単回帰 → 重回帰：146.1円から108.4円へ、誤差が小さくなった
- 同じ月の平均：67.5円で、この期間では最も誤差が小さい

重回帰は改善しましたが、簡単な基準も含めて比べる必要があります。


Notebookで実習 ⑥

9. 学習に使わなかった期間で評価する

1. 小さな例で、残差・2乗誤差からRMSEを計算する
2. テスト期間の4つの方法のRMSEを比べる
3. 「変数を増やせば必ず良い」と言えるか考える

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。


予測と実測の比較



左：横軸は実測、縦軸は予測。対角線上なら一致、上なら過大予測、下なら過小予測。

右：横軸は年月。同じ月の実測と予測の高さを比べ、ずれが大きい時期を探します。

残差からずれを読む



残差 = 実測値 − 予測値。0の線に近いほどずれが小さい。

正なら予測が低すぎる（過小予測）、負なら予測が高すぎる（過大予測）。

Notebookで実習 ⑦

10. 予測と実測を図で比べる／残差から予測のずれを読む

1. 対角線の上・下が、過大予測・過小予測のどちらか確認する
2. 重回帰でずれが大きい月を、図と表から探す
3. その月の残差の符号を説明する

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。

評価結果の限界

前回の「求めた直線が正解とは限らない」を、評価でも意識します。

- 今回の結果は2011〜2012年のもの。別の年や地域で同じ精度とは限らない
- テスト結果を見て何度も調整すると、その期間に合わせてしまう
- 調整には、学習期間の中に別の検証期間を設ける

今回は実際に観測された気象値を入力しています。
月が始まる前に予測する場合は、気象予報の誤差も加わります。

演習は東京エリアの電力需要

気象データから、電力需要をどこまで推定できる？

- 2024〜2025年の2年分。元データの1行は1時間
- 目的変数は東京エリアの電力需要（万kW）
- 入力は東京の気温・相対湿度・日照時間
- 演習A：2年分全体で関係を見る。学習・テストには分けない
- 演習B：2024年で学習し、2025年で予測を評価する

出典：東京電力パワーグリッド・気象庁。各演習は単独で実行できます。

演習A：気象と電力需要の関係

2年分の散布図・回帰直線・相関係数を確認します。

1. 演習Aのコードセルをそのまま実行する
2. 気温・相対湿度・日照時間から1つ選ぶ
3. 相関係数・回帰直線の向き・点のばらつきを説明する

提出：コード・回帰直線を重ねた散布図・相関係数の表と説明。

演習B：単回帰と重回帰の予測結果

2024年だけでモデルを作り、2025年の予測を比べます。

1. 演習Bのコードセルをそのまま実行する
2. 単回帰と重回帰のRMSEを、具体的な数値で比較する
3. 時系列図か比較図を1つ選び、読み取れたことを2〜3文で説明する

折れ線は日平均、散布図とRMSEは1時間ごとの値を使います。

提出：コード・時系列図・RMSEの表・比較図と説明。

レポートの構成と提出

提出物はWord形式のレポート1本です。

節	書く内容
1. 学んだことの要約	学んだ概念を自分の言葉で説明
2. 演習の結果と説明	演習A・Bのコード・表・図・数値と説明
3. 分からなかった点	詰まった場所や疑問。なければ「なし」

Notebookのテンプレートを使い、氏名・提出日・出典を記入します。

提出先：大学の電子メール kazuhisa_fujita@komatsu-u.ac.jp

Notebookで実習 ⑧

まとめとレポート／演習A・B／レポート本文（テンプレート）

1. 演習A・Bのコードをそれぞれ実行する
2. 各欄にコード・結果と、自分の説明を入れる
3. 単位・Bの期間の分け方・提出前チェックを確認する

実行したらスライドに戻り、結果を確認します。

今日のまとめ

データの関係を調べ、式を作り、学習に使わなかった期間で確かめました。

- 相関係数は、散布図と一緒に読む
- 単回帰と重回帰は、入力から数値を予測する
- 予測のずれは、RMSEと比較図で調べる
- 平均による基準と比べ、結果が通用する範囲を考える

レポートでは、自分の図や数値を根拠に説明しましょう。

資料とデータの出典

- 本文・演習コード：`notebook/lesson03_regression_basic_template.ipynb`
- ペンギン：Palmer Penguins（CC0）
- アイスクリーム：既存教材から引き継いだ `ice.csv`
- 電力需要：東京電力パワーグリッド「でんき予報」
- 気象：気象庁「過去の気象データ・ダウンロード」

前回の講義資料：`03_regression.pdf`（回帰分析、2026年10月27日版）

図と評価値は、教材の同梱データと初期設定から計算しています。

列の説明・取得条件：`notebook/datasets/README.md`