

Questionnaire sur les cybermalaises*

Laboratoire de Cyberpsychologie de l'UQO (Traduit de Kennedy, R.S.et al., 1993)

Νι	ıméro	Date			
Consignes : Encerclez à quel point chaque symptôme ci-dessous vous affecte <u>présentement</u> .					
1.	Inconfort général	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	<u>Sévèrement</u>
2.	Fatigue	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
3.	Mal de tête	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
4.	Fatigue des yeux	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
5.	Difficulté à faire le focus	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
6.	Augmentation de la salivation	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	<u>Sévèrement</u>
7.	Transpiration	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
8.	Nausées	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	<u>Sévèrement</u>
9.	Difficulté à se concentrer	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	<u>Sévèrement</u>
10	. Impression de lourdeur dans la tête	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
11	. Vision embrouillée	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	<u>Sévèrement</u>
12	. Étourdissement les yeux ouverts	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
13	. Étourdissement les yeux fermés	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
14	. *Vertiges	Pas du tout	<u>Un peu</u>	<u>Modérément</u>	<u>Sévèrement</u>
15	. **Conscience de l'estomac	Pas du tout	<u>Un peu</u>	Modérément	Sévèrement
16	. Rots	Pas du tout	Un peu	Modérément	Sévèrement

Dernière version: Mars 2013

^{*} Les vertiges sont vécus comme une perte de l'orientation par rapport à la position verticale.

^{**} L'expression « conscience de l'estomac » est habituellement utilisée pour désigner un sentiment d'inconfort sans nausée.

^{***}Version originale: Kennedy, R.S., Lane, N.E., Berbaum, K.S., & Lilienthal, M.G. (1993). Simulator Sickness Questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness. *International Journal of Aviation Psychology*, *3*(3), 203-220

Questionnaire sur les Cybermalaises

Laboratoire de Cyberpsychologie de l'UQO


Cotation de la version canadienne-française du Questionnaire sur les cybermalaises :

- Faire le Total des items 1 à 16 : échelle de 0 (pas du tout) à 3 (sévèrement).
 - \circ Sous-échelle « *Nausée* » : items 1 + 6 + 7 + 8 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16.
 - \circ Sous-échelle « *Oculo-moteur* »: items 2+3+4+5+9+10+11.

Pour consulter les articles scientifiques sur la validation canadienne-française de ce questionnaire, veuillez-vous référer aux articles suivants :

- BOUCHARD, S., Robillard, & Renaud, P. (2007). Revising the factor structure of the Simulator Sickness Questionnaire. Acte de colloque du *Annual Review of CyberTherapy and Telemedicine*, 5, 117-122.
- BOUCHARD, S., St-Jacques, J., Renaud, P., & Wiederhold, B.K. (2009). Side effects of immersions in virtual reality for people suffering from anxiety disorders. *Journal of Cybertherapy and Rehabilitation*, 2(2), 127-137.
- BOUCHARD, S. Robillard, G., Renaud, P., & Bernier, F. (2011). Exploring new dimensions in the assessment of virtual reality induced side-effects. *Journal of Computer and Information Technology*, 1(3), 20-32.

Basée sur les résultats de l'étude de Bouchard, St-Jacques, Renaud, & Wiederhold (2009), voici la moyenne des scores reportés dans l'étude de validation:



Note. Pour la cotation et validation de la version originale anglaise, veuillez consulter l'article suivant : Kennedy, R.S., Lane, N.E., Berbaum, K.S., & Lilienthal, M.G. (1993). Simulator Sickness Questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness. *International Journal of Aviation Psychology*, *3*(3), 203-220.