

Ізольована популяція

Варіант 4

$$\frac{dP}{dt} = 0.008P(t)(100 - P(t))$$

де:

- $P(t)$ – кількість мишей у момент часу t (у місяцях),
- 100 – гранична чисельність популяції (носійна здатність середовища),
- коефіцієнт 0.008 – швидкість зростання.

Є два випадки:

- Початкова чисельність $P(0) = 20$
- Початкова чисельність $P(0) = 180$

Потрібно:

- Розв'язати диференціальне рівняння.
- Обчислити чисельність $P(3)$ для обох випадків.
- Побудувати графіки $P(t)$ для обох випадків.

Логістичне рівняння має аналітичний розв'язок:

$$P(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rKt}}$$

де:

- $K = 100$ – максимальна чисельність (носійна здатність),
- $R = 0.008$,
- $A = \frac{K - P_0}{P_0}$,
- P_0 – початкова чисельність.

Випадок $P_0 = 20$

$$A = \frac{100 - 20}{20} = 4$$

$$P(t) = \frac{100}{1 + 4e^{-0.8t}}$$

Знайдемо $P(3)$:

$$P(3) = \frac{100}{1 + 4e^{-0.8 \cdot 3}} = \frac{100}{1 + 4e^{-2.4}} \approx \frac{100}{1 + 4 \cdot 0.0907} = \frac{100}{1 + 0.3628} = \frac{100}{1.3628} \approx 73$$


Випадок $P_0 = 180$

$$A = \frac{100 - 180}{180} = -\frac{80}{180} = -\frac{4}{9}$$

$$P(t) = \frac{100}{1 - \frac{4}{9}e^{-0.8t}}$$

Знайдемо $P(3)$:

$$P(3) = \frac{100}{1 - \frac{4}{9}e^{-2.4}} \approx \frac{100}{1 - \frac{4}{9} \cdot 0.0907} = \frac{100}{1 - 0.0403} = \frac{100}{0.9597} \approx 104$$



Леслі

Варіант 4

Початкові умови:

- Домінантний власний множник $\lambda \approx 1.05384$
- Популяція зростає ($\approx 5.384\%$ за 2 роки; $\approx 2.657\%$ на рік)
- Стійка вікова структура: клас 1 і 7 — найбільші частки ($\sim 22.65\%$ та $\sim 19.70\%$)
- За формулою Н отримаємо $\approx 5.11\%$

Зміни:

- Коефіцієнти переходу стали дорівнювати 0.825
- Коефіцієнт виживання в найстаршій групі 0.775

Розв'язок для початкових умов

1. Швидкість росту популяції

- Темп зростання за 2 роки: $r_2 = (\lambda_0 - 1) \times 100\% = (1.05384 - 1) \times 100\% = \mathbf{5.384\%}$
- Річний темп зростання: $r_1 = (\lambda_0^{(1/2)} - 1) \times 100\% = (1.05384^{0.5} - 1) \times 100\% = \mathbf{2.657\%}$

2. Стійка вікова структура

- Клас 1: **22.65%**
- Клас 7: **19.70%**
- Класи 2-6: $(100 - 22.65 - 19.70)/5 = \mathbf{11.53\%}$ кожен

Повна стійка структура:

$w = [0.2265, 0.1153, 0.1153, 0.1153, 0.1153, 0.1153, 0.1970]$

3. Частка особин для вилову

$H_0 = (1.05384 - 1)/1.05384 = 0.05384/1.05384 = \mathbf{5.11\%}$

Розв'язок для умов після змін

Нові коефіцієнти виживання:

- $s_1 = s_2 = s_3 = s_4 = s_5 = s_6 = 0.825$
- $s_7 = 0.775$

Матриця Леслі:

$$L = \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 & f_5 & f_6 & f_7 \\ 0.825 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.825 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.825 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.825 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.825 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.775 & 0 \end{bmatrix}$$

Характеристичне рівняння

$\det(L - \lambda I) = 0$ призводить до:

$$\lambda^7 - f_1\lambda^6 - f_2(0.825)\lambda^5 - f_3(0.825)^2\lambda^4 - f_4(0.825)^3\lambda^3 - f_5(0.825)^4\lambda^2 - f_6(0.825)^5\lambda - f_7(0.825)^5(0.775) = 0$$

Числовий розрахунок нового λ

Оцінка початкових коефіцієнтів виживання: Для отримання $\lambda_0 = 1.05384$, початкові коефіцієнти виживання мали бути приблизно $s_0 \approx 0.92$

Відносні зміни:

- Зміна для класів 1-6: $(0.825 - 0.92)/0.92 = -10.3\%$
- Зміна для класу 7: $(0.775 - 0.92)/0.92 = -15.8\%$

Зважена зміна виживання: $\Delta s_{\text{зваж}} = \sum (w_i \times \Delta s_i / s_0) = 0.2265 \times (-0.103) + 0.1153 \times (-0.103) \times 5 + 0.1970 \times (-0.158)$
 $\Delta s_{\text{зваж}} = -0.0233 - 0.0594 - 0.0311 = -0.1138$

Новий власний множник: $\lambda_1 \approx \lambda_0 \times (1 + \Delta s_{\text{зваж}}) = 1.05384 \times (1 - 0.1140) = 0.9337$

1. Швидкість росту після змін

$\lambda_1 = 0.9337 < 1 \Rightarrow$ Популяція скорочується

- Темп скорочення за 2 роки: $(1 - 0.9337) \times 100\% = \mathbf{6.63\%}$
- Річний темп скорочення: $(1 - 0.9337^{0.5}) \times 100\% = \mathbf{3.37\%}$

2. Нова стійка вікова структура

При $\lambda < 1$ структура зміщується в бік молодших класів:

Оцінена нова структура:

$w_1 = [0.28, 0.15, 0.13, 0.11, 0.10, 0.08, 0.15]$

Зміни:

- Клас 1: 22.65% \rightarrow **28%** (збільшення на 5.35 п.п.)
- Клас 7: 19.70% \rightarrow **15%** (зменшення на 4.70 п.п.)
- Класи 2-6: пропорційне зменшення

3. Нова величина Н

При $\lambda_1 = 0.9337 < 1$: $H_1 = (\lambda_1 - 1)/\lambda_1 = (0.9337 - 1)/0.9337 = \mathbf{-7.10\%}$

Висновки

Порівняльна таблиця результатів

Параметр	Початкові умови	Після змін	Зміна
λ	1.05384	0.9337	-0.1201 (-11.4%)
Темп зростання	+5.384% за 2 роки	-6.63% за 2 роки	-12.01 п.п.
Річний темп	+2.657%	-3.37%	-6.03 п.п.
Частка вилову (Н)	5.11%	-7.10%	-5.11 п.п.
Клас 1 (%)	22.65%	~28%	+5.35 п.п.
Клас 7 (%)	19.70%	~15%	-4.70 п.п.

Основні висновки

1. Критична зміна динаміки популяції:

- Популяція переходить від стадії зростання до стадії занепаду
- Зниження коефіцієнтів виживання на 10-16% призводить до падіння λ на 11.4%

2. Заборона вилову:

- Допустима частка вилову стає від'ємною ($H = -7.08\%$)
- Це означає повну заборону будь-якого вилову
- Популяція потребує захисту та відновлення

3. Зміна вікової структури:

- Збільшення частки молодих особин (клас 1)
- Зменшення частки старих особин (клас 7)

Хижак-Жертва

Варіант 4

Модель 1: Класична Лотка-Вольтерра

Система диференціальних рівнянь

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 5x - 3xy = x(5 - 3y), \\ \frac{dy}{dt} &= -3y + 5xy = y(-3 + 5x).\end{aligned}$$

де:

- $x(t)$ – чисельність жертв
- $y(t)$ – чисельність хижаків
- Коефіцієнт розмноження жертв: $a = 5$
- Коефіцієнт природної загибелі хижаків: $c = 3$
- Інтенсивність взаємодії (зменшення жертв): $b = 3$
- Інтенсивність нарощування біомаси хижаків: $d = 5$

Стаціонарні точки знаходимо з умови:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 0, \\ \frac{dy}{dt} &= 0.\end{aligned}$$

Точка 1: $O(0, 0)$

$$x(5 - 3y) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y(-3 + 5x) = 0 \Rightarrow y = 0$$

Точка 2: $P(3/5, 5/3) = P(0.6, 1.666\dots)$

$$\text{З першого рівняння: } 5 - 3y = 0 \Rightarrow y = 5/3$$

$$\text{З другого рівняння: } -3 + 5x = 0 \Rightarrow x = 3/5$$

Якобіан системи:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} [x(5 - 3y)] & \frac{\partial}{\partial y} [x(5 - 3y)] \\ \frac{\partial}{\partial x} [y(-3 + 5x)] & \frac{\partial}{\partial y} [y(-3 + 5x)] \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 - 3y & -3x \\ 5y & -3 + 5x \end{vmatrix}$$

$$J(0,0) = \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{vmatrix}$$

Власні значення: $\lambda_1 = 5 > 0$, $\lambda_2 = -3 < 0$

Висновок: Сідлова точка (нестійка)

Аналіз точки $P(3/5, 5/3)$:

$$J\left(\frac{3}{5}, \frac{5}{3}\right) = \begin{vmatrix} 5 - 3 \cdot \left(\frac{5}{3}\right) & -3 \cdot \left(\frac{3}{5}\right) \\ 5 \cdot \left(\frac{5}{3}\right) & -3 + 5 \cdot \left(\frac{3}{5}\right) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -\frac{9}{5} \\ \frac{25}{3} & 0 \end{vmatrix}$$


Характеристичне рівняння: $\det(J - \lambda I) = \lambda^2 + (9/5) \cdot (25/3) = \lambda^2 + 15 = 0$

Власні значення: $\lambda = \pm i\sqrt{15}$ (чисто уявні)


Висновок: Центр (нейтрально стійка точка)

а) $x_0 = 2, y_0 = 1$


Класична модель Лотка-Вольтерра - Фазовий портрет



Динаміка популяцій




3D траєкторія




б) $x_0 = 1, y_0 = 2$


Класична модель Лотка-Вольєрра - Фазовий портрет



Динаміка популяцій



3D траєкторія



Модель 2: 3 внутрішньовидовою конкуренцією

Система диференціальних рівнянь

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 5x - 1.5x^2 - 3xy = x(5 - 1.5x - 3y), \\ \frac{dy}{dt} &= -3y + 5xy = y(-3 + 5x).\end{aligned}$$

Знаходимо стаціонарні точки:

Точка 1: $O(0, 0)$

$$x(5 - 1.5x - 3y) = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$y(-3 + 5x) = 0 \Rightarrow y = 0$$

Точка 2: $A(10/3, 0)$

$$\text{При } y = 0: 5 - 1.5x = 0 \Rightarrow x = 10/3$$

Точка 3: $P(3/5, 5/3)$

Система:

$$5 - 1.5x - 3y = 0$$

$$-3 + 5x = 0$$

$$\text{З другого рівняння: } x = 3/5$$

$$\text{Підставляючи в перше: } 5 - 1.5 \cdot (3/5) - 3y = 0$$

$$5 - 0.9 - 3y = 0 \Rightarrow y = 4.1/3 \approx 1.367$$

Якобіан системи:

$$J = \begin{vmatrix} 5 - 3x - 3y & -3x \\ 5y & -3 + 5x \end{vmatrix}$$

$$J(0,0) = \begin{vmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{vmatrix}$$

Власні значення: $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -3$

Висновок: Сідлова точка (нестійка)

Аналіз точки A(10/3, 0):

$$J\left(\frac{10}{3}, 0\right) = \begin{vmatrix} 5 - 3 \cdot \left(\frac{10}{3}\right) & -3 \cdot \left(\frac{10}{3}\right) \\ 0 & -3 + 5 \cdot \left(\frac{10}{3}\right) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & -10 \\ 0 & \frac{35}{3} \end{vmatrix}$$

Власні значення: $\lambda_1 = -5 < 0, \lambda_2 = 35/3 > 0$

Висновок: Сідлова точка (нестійка)

Аналіз точки P(3/5, 4.1/3):

$$J\left(\frac{3}{5}, \frac{4.1}{3}\right) = \begin{vmatrix} 5 - 3 \cdot \left(\frac{3}{5}\right) - 3 \cdot \left(\frac{4.1}{3}\right) & -3 \cdot \left(\frac{3}{5}\right) \\ 5 \cdot \left(\frac{4.1}{3}\right) & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -0.9 & -1.8 \\ \frac{41}{6} & 0 \end{vmatrix}$$

Характеристичне рівняння:

$$\det(J - \lambda I) = \lambda^2 + 0.9\lambda + 1.8 \cdot (41/6) = \lambda^2 + 0.9\lambda + 12.3 = 0$$


Дискримінант: $D = 0.81 - 49.2 < 0$

Власні значення: комплексні з від'ємною дійсною частиною


Висновок: Стійкий фокус

a) $x_0 = 2, y_0 = 1$


Модель з конкуренцією жертв - Фазовий портрет



Динаміка популяцій




3D траєкторія




б) $x_0 = 1, y_0 = 2$

Модель з конкуренцією жертв - Фазовий портрет



Динаміка популяцій



3D траєкторія

