

Математическое приложение

Нугманов Булат

27 ноября 2022 г.

Данный документ является наброском математического приложения, результаты которого точно выполняются численно. А ещё надо будет это перевести.

1. Переписывание ряда через интеграл
2. Нахождение перевальных точек
3. Асимптотика кривых постоянной фазы через перевальные точки — не знаю, надо ли об этом писать?
4. Деформация контура в зависимости от знака Γ — пока нет
5. Подсчёт вкладов по методу перевала
6. Вставка с полиномами Белла и числами Стирлинга для явного подсчёта коэффициентов в методе перевала
7. Слова о том, что при $|\Gamma| \ll 1$ достаточно учитывать лишь одно слагаемое
8. Точное значение в максимуме
9. Выбор \bar{k}
10. Граница выбора \bar{k}
11. Итог: асимптотика ряда

Вступление

In this section we will find the asymptotics of the series of the following form:

$$F(A, e^{i\Gamma}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n e^{i\Gamma n^2}}{n!}, \quad (1)$$

when $\Gamma \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{C}$, $|\Gamma| \ll 1$ and $|A\Gamma| \gtrsim 1$.

Наметим примерный план дальнейшего рассказа. Первым делом мы перейдём от суммы к расчёту интеграла по действительной оси. Далее мы воспользуемся отсутствием полюсов подынтегральной функции и деформируем контур так, чтоб он проходил через перевальные точки по кривым постоянной фазы. Перевальных точек будет бесконечное количество, однако наиболее существенный вклад будет вносить интеграл только одна из кривых постоянной фазы. Для пущей точности мы найдём все остаточные члены метода перевала.

Переход от суммы к интегралу

Первым делом избавимся от $\exp(i\Gamma n^2)$.

$$\exp(i\Gamma n^2) = \frac{e^{i\frac{\pi}{4} \operatorname{sign} \Gamma}}{2\sqrt{\pi|\Gamma|}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{4\Gamma} + inz\right) dz \quad (2)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n e^{i\Gamma n^2}}{n!} = \frac{e^{i\frac{\pi}{4} \operatorname{sign} \Gamma}}{2\sqrt{\pi|\Gamma|}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{4\Gamma} + iAz\right) dz \quad (3)$$

$$Z = -2iA\Gamma = Re^{i\Phi} \quad (4)$$

$$\Phi \in (-\pi, \pi]$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n e^{i\Gamma n^2}}{n!} = \frac{e^{i\frac{\pi}{4} \operatorname{sign} \Gamma}}{2\sqrt{\pi|\Gamma|}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{-i\frac{z^2}{2} + iZe^{iz}}{2\Gamma}\right) dz \quad (5)$$

Нахождение перевальных точек

$$f(z) = \frac{z^2}{2i} + iZe^{iz} \quad (6)$$

$$e^{iz_k} = \frac{z_k}{iZ} \Rightarrow z_k = iW_k(Z) \quad (7)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(\frac{f(z)}{2\Gamma}\right) dz = \sum_{k=0}^{-\operatorname{sign} \Gamma \cdot \infty} \int_{\gamma_k} \exp\left(\frac{f(z)}{2\Gamma}\right) dz \quad (8)$$

$$f(z) = \underbrace{\frac{z_k^2}{2i} + z_k}_{f(z_k)} + \underbrace{\frac{-i - z_k}{2}}_{a_0} (z - z_k)^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\frac{-i^n z_k}{(n+2)!}}_{a_1, a_2, \dots} (z - z_k)^{n+2} \quad (9)$$

Подсчёт вкладов по методу перевала

$$\int_{\gamma_k} \exp\left(\frac{f(z)}{2\Gamma}\right) dz = \exp\left(\frac{f(z_k)}{2\Gamma}\right) \sqrt{\frac{2\Gamma}{a_0}} \sum_{n=0}^{\infty} \Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) (2\Gamma)^n c_{2n} \quad (10)$$

$$c_{2n} = \sum_{j=0}^{2n} \frac{C^j}{a_0^{n+j}} \hat{B}_{2n,j}(a_1, a_2, \dots, a_{2n-j+1})$$

Полезная формула

Итогом должно стать:

$$\hat{B}_{n,k} \left(\frac{1}{r!}, \frac{1}{(r+1)!}, \dots, \frac{1}{(n-k+r)!} \right) = \frac{k!}{(n+(r-1)k)!} S_r(n+(r-1)k, k) \quad (11)$$

где далее можно использовать

$$S_r(n+1, k) = k S_r(n, k) + C_n^r S_r(n-r+1, k-1) \quad (12)$$

Полиномы Белла

$$\exp \left(u \sum_{j=1}^{\infty} x_j t^j \right) = \sum_{n \geq k \geq 0} \hat{B}_{n,k} (x_1, x_2, \dots, x_{n-k+1}) t^n \frac{u^k}{k!} \quad (13)$$

$$\begin{aligned} \hat{B}_{2n,j}(\zeta x_1, \zeta x_2, \dots, \zeta x_{2n-j+1}) &= \zeta^j \hat{B}_{2n,j}(x_1, x_2, \dots, x_{2n-j+1}) \\ \hat{B}_{2n,j}(\zeta^2 x_1, \zeta^2 x_2, \dots, \zeta^{2n-j+1} x_{2n-j+1}) &= \zeta^{2n} \hat{B}_{2n,j}(x_1, x_2, \dots, x_{2n-j+1}) \end{aligned} \quad (14)$$

В нашем случае:

$$\begin{aligned} \hat{B}_{2n,j}(a_1, a_2, \dots, a_{2n-j+1}) &= \hat{B}_{2n,j} \left(\frac{-iz_k}{3!}, \frac{-i^2 z_k}{4!}, \dots, \frac{-i^{2n-j+1} z_k}{(2n-j+3)!} \right) \\ &= (-1)^n (-z_k)^j \hat{B}_{2n,j} \left(\frac{1}{3!}, \frac{1}{4!}, \dots, \frac{1}{(2n-j+3)!} \right) \end{aligned} \quad (15)$$

Числа Стирлинга

$$\exp \left(u \left(\frac{t^r}{r!} + \frac{t^{r+1}}{(r+1)!} + \dots \right) \right) = \sum_{n=(r+1)k, k=0}^{\infty} S_r(n, k) u^k \frac{t^n}{n!} \quad (16)$$

Сравнивая данную строчку с определением полиномов Белла,

$$\begin{aligned} \sum_{n \geq k \geq 0} \hat{B}_{n,k} \left(\frac{1}{r!}, \frac{1}{(r+1)!}, \dots, \frac{1}{(n-k+r)!} \right) t^n \frac{u^k}{k!} &= \exp \left(\frac{u}{t^{r-1}} \left(\frac{t^r}{r!} + \frac{t^{r+1}}{(r+1)!} + \dots \right) \right) \\ &= \sum_{n,k}^{\infty} S_r(n, k) \frac{u^k}{t^{(r-1)k}} \frac{t^n}{n!} \\ &= \sum_{n,k}^{\infty} S_r(n+(r-1)k, k) u^k \frac{t^n}{(n+(r-1)k)!} \end{aligned} \quad (17)$$

Наилучшее \bar{k}

Используя всё выше перечисленное и обозначение для z_k :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{iZ}{2\Gamma} \right)^n \frac{e^{i\Gamma n^2}}{n!} = e^{\frac{i\pi}{4}} \sum_{k=0}^{-\text{sign } \Gamma \cdot \infty} \frac{\exp \left(\frac{-i-i(z_k+i)^2}{4\Gamma} \right)}{(-i-z_k)^{\frac{1}{2}}} \sum_{n=0}^{\infty} (2\Gamma)^n \sum_{j=0}^{2n} \left(-\frac{1}{2} \frac{z_k}{i+z_k} \right)^{n+j} \frac{S_3(2n+2j, j)}{(n+j)!}, \quad (18)$$

Далее мы переходим к менее точным оценкам.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{iZ}{2\Gamma} \right)^n \frac{e^{i\Gamma n^2}}{n!} \approx e^{\frac{i\pi}{4}} \frac{\exp\left(\frac{-i-i(z_k+i)^2}{4\Gamma}\right)}{(-i-z_k)^{\frac{1}{2}}} \quad (19)$$

Выпишем действительную часть показателя экспоненты:

$$\operatorname{Re}(f(z_k)) = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(-i(z_k+i)^2) = -\operatorname{Im}(W_k(Z)) (1 + \operatorname{Re}(W_k(Z))) \quad (20)$$

Точное поведение $\operatorname{Re} f(z_k)$

Найдём поведение $\operatorname{Re} f(z_k) \operatorname{sign} \Gamma$ как функцию от Φ в окрестности точки максимума. Для сокращения дальнейших формул используем в данном параграфе сокращение $W = W_k(Z = Re^{i\Phi})$. Для этого нам понадобится:

$$\frac{\partial W}{\partial \Phi} = \frac{iW}{1+W} \quad (21)$$

$$\frac{\partial}{\partial \Phi} \operatorname{Re}(f(z_k)) = -\operatorname{Re}(W) \quad (22)$$

В точке максимума $\frac{\partial}{\partial \Phi} \operatorname{Re}(f(z_k)) = 0$. Отсюда из определения W -функции Ламберта

$$i \operatorname{Im} W e^{i \operatorname{Im} W} = R e^{i\Phi_{\max}} \Rightarrow |\operatorname{Im} W| = R \quad (23)$$

$$\operatorname{sign} \left(\frac{f(z_k)}{2\Gamma} \right)_{\Phi=\Phi_{\max}} = 1 \Rightarrow \operatorname{Im} W = R \operatorname{sign} k \Rightarrow \left(\frac{f(z_k)}{2\Gamma} \right)_{\Phi=\Phi_{\max}} = \frac{R}{2|\Gamma|} \quad (24)$$

$$i R \operatorname{sign} k e^{i R \operatorname{sign} k} = R e^{i\Phi_{\max}} \Rightarrow \Phi_{\max} = \left(R + \frac{\pi}{2} \right) \operatorname{sign} k \mod 2\pi \quad (25)$$

Взятием производных более высоких порядков можно получить, что:

$$\operatorname{Re} f(z_k) = R \operatorname{sign} \Gamma - \sum_{m=1}^{\infty} \operatorname{Re} \left(\frac{i^m q_m(-i R \operatorname{sign} \Gamma)}{(1 - i R \operatorname{sign} \Gamma)^{2m-1}} \right) \frac{(\Phi - \Phi_{\max})^{m+1}}{(m+1)!} \quad (26)$$

$$\operatorname{Re} f(z_k) = R \operatorname{sign} \Gamma + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(\Phi - \Phi_{\max})^{m+1}}{(m+1)!} \sum_{k=0}^{m-1} \left\langle \left\langle \begin{matrix} m-1 \\ k \end{matrix} \right\rangle \right\rangle \operatorname{Re} \left(\frac{i^m (i R \operatorname{sign} \Gamma)^{k+1}}{(1 - i R \operatorname{sign} \Gamma)^{2m-1}} \right) \quad (27)$$

где принято обозначение $\left\langle \left\langle \begin{matrix} m-1 \\ k \end{matrix} \right\rangle \right\rangle$ — Эйлеровы числа второго рода

Асимптотика W при $R \rightarrow \infty$

Несмотря на заявленное в заголовке, асимптотика хорошо работает и при небольших R .

$$W_k(z) = \log z + 2\pi i k - \log(\log z + 2\pi i k) + \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} c_{km} \log^m(\log z + 2\pi i k) (\log z + 2\pi i k)^{-k-m}$$

$$c_{km} = \frac{(-1)^k}{m!} c(k+m, k+1), \quad (28)$$

где $c(k+m, k+1)$ — беззнаковые числа Стирлинга первого рода.

Пренебрегая членами $O\left(\frac{\log(\log R + 2\pi i k)}{\log R + 2\pi i k}\right)$ в разложении функции Ламберта:

$$\begin{aligned} W_k(Z) &\approx \log R + i\Phi + 2\pi i k - \log(\log R + i\Phi + 2\pi i k) \\ &\approx \log R - \frac{1}{2} \log(\log^2 R + (2\pi k)^2) + i \left(\Phi + 2\pi k - \arctan\left(\frac{2\pi k}{\log R}\right) \right) \\ \operatorname{Re}(f(z_k)) &\approx - \left(\Phi + 2\pi k - \arctan\left(\frac{2\pi k}{\log R}\right) \right) \left(1 - \frac{1}{2} \log\left(\left(\frac{2\pi k}{R}\right)^2 + \frac{\log^2 R}{R^2}\right) \right) \end{aligned} \quad (29)$$

Из этого выражения мы видим, что $\bar{k} = O(R)$. Более детальный расчёт максимума последнего выражения по k приводит к:

$$|\bar{k}| \approx \left\lceil \frac{1}{2\pi} \left(R + \left| \Phi + \frac{\pi}{2} \operatorname{sign} \Gamma \right| \right) \right\rceil \quad (30)$$

Эта формула однозначно делит комплексную плоскость для Z на области выбора оптимального \bar{k} . Разложение $W_k(Z)$ с точностью до $O\left(\frac{\log^3 R}{R^3}\right)$ приводит к следующей формуле:

$$\operatorname{Re}(f(z_k)) = R \operatorname{sign} \Gamma + \frac{(\Phi + 2\pi \bar{k} + (R + \frac{\pi}{2}) \operatorname{sign} \Gamma)^2}{2R} + O\left(\frac{\log^3 R}{R^2}\right) \quad (31)$$

Решение уравнения $\operatorname{Re}(f(z_{k-\operatorname{sign} \Gamma})) = \operatorname{Re}(f(z_k))$ приводит к тому, что оптимум \bar{k} , найденный в уравнении 30, имеет точность определения границы областей оптимального \bar{k} на комплексной плоскости для Z порядка $O\left(\frac{\log^3 R}{R}\right)$.

Финал

Таким образом, можно получать либо достаточно точную асимптотику из выражения 19, либо, при желании сэкономить на расчёте функции Ламберта, можно использовать более наглядную формулу для модуля в окрестности точки максимума:

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{iZ}{2\Gamma} \right)^n \frac{e^{i\Gamma n^2}}{n!} \right| \approx \frac{1}{\sqrt{R}} \left(1 - \frac{1}{4R^2} + \frac{5}{32R^4} + \dots \right) \exp \left(\frac{R}{2|\Gamma|} - \frac{(\delta - \Gamma)^2}{4R|\Gamma|} + \dots \right), \quad (32)$$

где ввели обозначение $\delta = \Phi + 2\pi \bar{k} + (R + \frac{\pi}{2}) \operatorname{sign} \Gamma$.