

例 1.2.3 设实数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_n - x_{n-2} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{n} = 0$. (四川大学)

提示 记 $y_n = |x_n - x_{n-1}|$, 则 $|x_n - x_{n-2}| \geq |y_n - y_{n-1}|$.

$$\left| \frac{x_n - x_{n-1}}{n} \right| = \frac{y_n}{n} \leq \frac{|y_n - y_{n-1}| + |y_{n-1} - y_{n-2}| + \cdots + |y_{N+1} - y_N|}{n} + \frac{y_N}{n}.$$

2) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ (有限数), 试证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = A$.

(湖北大学, 中国地质大学)

2) (分步法)

$$\begin{aligned} \text{当 } A \text{ 为有限数时, } & \left| \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} - A \right| \\ & \leq \frac{|x_1 - A| + |x_2 - A| + \cdots + |x_n - A|}{n}. \end{aligned}$$

因 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 故 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_1 > 0, n > N_1$ 时, $|x_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

从而

$$\text{上式} \leq \frac{|x_1 - A| + \cdots + |x_{N_1} - A|}{n} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2}.$$

注意这里 $|x_1 - A| + \cdots + |x_{N_1} - A|$ 已为定数, 因而 $\exists N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时,

$$\frac{|x_1 - A| + \cdots + |x_{N_1} - A|}{n} < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} - A \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{n - N_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

注 1° 本例第 2) 小题对于 $A = +\infty$ 或 $A = -\infty$ 时结论仍成立, 留作练习. 当 $A = \infty$ 命题结论不再成立. 例如数列 $0, 1, -1, 2, -2, \dots$.

2° 第 2) 小题表明 $\{x_n\}$ 收敛, 则前 n 项的算术平均值必也收敛, 且极限值不变. 此结论以后常用. 另外, 此题用 Stolz 公式证明会变得十分简洁 (见 § 1.4 节).

§ 1.4 O. Stolz 公式

$$\frac{x_n - x_{n-k}}{y_n - y_{n-k}} \sim \frac{x_n}{y_n}$$

Stolz 公式 可以说是数列的 L'Hospital 法则. 它对求数列的极限很有用. 本节专门讨论 Stolz 公式及其应用.

一、数列的情况

定理 1 $\left(\frac{\infty}{\infty} \text{型 Stolz 公式} \right)$

设 $\{x_n\}$ 严格递增 (即 $\forall n \in \mathbb{N}$ 有 $x_n < x_{n+1}$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

若

1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a \text{ (有限数),}$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a; \text{ (中国人民大学)}$$

2) a 为 $+\infty$ 或 $-\infty$, 结论仍然成立.

注 (几何意义) 把 (x_n, y_n) 看成是平面上的点 M_n (如图 1.4.1 所示), 定理意义是, 假设 M_n 的横坐标 $x_n \nearrow +\infty$, 那么当 $\overrightarrow{M_n M_{n+1}}$ 的斜率以有限数 a 为极限时, 则 $\overrightarrow{OM_n}$ 的斜率也以 a 为极限.




图 1.4.1

证 1° 目的在于证明: $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\left| \frac{y_n}{x_n} - a \right| < \epsilon. \quad (1)$$

记

$$\alpha_n \equiv \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} - a. \quad (2)$$

按已知条件有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$, 即 $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$,

当 $n \geq N$ 时, 有 $|\alpha_n| < \frac{\varepsilon}{2}$. (3)

现在的目标在于从(3)推出(1). 为此从(2)解出 y_n 再代入(1). 由(2)得

$$\begin{aligned} y_n &= y_{n-1} + (\alpha_n + a)(x_n - x_{n-1}) \quad (\text{再迭代使用此式}) \\ &= y_{n-2} + (\alpha_{n-1} + a)(x_{n-1} - x_{n-2}) + (\alpha_n + a)(x_n - x_{n-1}) \\ &= \dots \\ &= y_N + (\alpha_{N+1} + a)(x_{N+1} - x_N) + \dots + (\alpha_n + a)(x_n - x_{n-1}) \\ &= y_N + \alpha_{N+1}(x_{N+1} - x_N) + \dots + \alpha_n(x_n - x_{n-1}) + a(x_n - x_N). \end{aligned}$$

两边同时除以 x_n , 再同时减去 a , 得

$$\begin{aligned} \left| \frac{y_n}{x_n} - a \right| &\leq \left| \frac{y_N - ax_N}{x_n} \right| + \frac{|\alpha_{N+1}| |x_{N+1} - x_N| + \dots + |\alpha_n| |x_n - x_{n-1}|}{|x_n|} \\ &< \left| \frac{y_N - ax_N}{x_n} \right| + \frac{\varepsilon}{2} \left| \frac{x_n - x_N}{x_n} \right| \\ &< \frac{|y_N - ax_N|}{x_n} + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

将 n 再进一步增大, 因 $x_n \rightarrow +\infty$, 故 $\exists N_1 > N$, 使得 $n > N_1$ 时有

$$\left| \frac{y_N - ax_N}{x_n} \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 $\left| \frac{y_n}{x_n} - a \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

2° (极限为 $+\infty$ 的情况) 因已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = +\infty$, 所以

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n - x_{n-1}}{y_n - y_{n-1}} = 0$, 利用 1° 中的结论只要证明 $y_n \nearrow +\infty$, 则有

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = +\infty$ (问题得证). 因 $x_n \nearrow$, 要证 $y_n \nearrow$ 只要

证 $\frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} > 1$. 事实上, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = +\infty$, 所以对 $M = 1$,

$\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 有 $\frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} > 1$, 即

$$n > N \text{ 时, } y_n - y_{n-1} > x_n - x_{n-1} > 0. \quad (4)$$

所以当 $n > N$ 时, y_n 严格 \nearrow . (4) 式中令 $n = N+1, N+2, \dots, k$, 然后相加, 可知

$$y_k - y_N > x_k - x_N.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 知 $y_k \rightarrow +\infty$. 证毕.

3° (极限为 $-\infty$ 的情况) 只要令 $y_n = -z_n$ 即可转化为 2° 中的情况.

注 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \infty$, 一般推不出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = \infty$. 如令 $x_n = n$,

$\{y_n\} = \{0, 2^2, 0, 4^2, 0, 6^2, \dots\}$. 这时虽然 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = \infty$, 但

$$\left\{ \frac{y_n}{x_n} \right\} = \{0, 2, 0, 4, 0, 6, \dots\} \nrightarrow \infty.$$

定理 2 $\left(\frac{0}{0}\right)$ 型 Stolz 公式) 证明时向后展开到无穷项;

设 $n \rightarrow \infty$ 时 $y_n \rightarrow 0$, x_n 严格 $\searrow 0$ (严格单调下降趋向零). 若

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - y_{n-1}}{x_n - x_{n-1}} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n}{x_n} = a$ (其中 a 为有限数, $+\infty$ 或 $-\infty$).

注 定理 1 其名为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型, 其实只要求分母 $x_n \nearrow +\infty$ (严格单调上升趋向无穷大), 至于分子 y_n 是否趋向无穷大, 无关紧要. 定理 2 则是名副其实的 $\frac{0}{0}$ 型. 因为定理条件要求分子、分母都以 0 为极限.

Stolz 公式, 对于求序列的极限十分有用, 例 1.2.1(2), 如果应用 Stolz 公式, 变得非常明显. 因 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{1} = a. \text{ 又如}$$