

מאגר שאלות לבחינה באלגברה ליניארית.

מספרים מרוכבים:

בספר המצורף לאתר: עמוד 101-100:

תרגילים: 6,7,8,9,

10.2 הראו כי המספר הנתון בשאלה שווה לצמוד שלו ובכך תראו שהמספר ממשי.

10.3,

12,13,14,16,17,18

1. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. $\frac{1}{2i}$ ב. $\frac{2+3i}{7-3i}$ ג. $\left(\frac{1}{3-i}\right)^2$

2. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

i^{-1} i^{2005} i^n i^{28} i^{27} i^{26} i^{25} $(1+i+i^2+i^3)^{100}$

3. בכל סעיף פתרו את המשוואה באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית. בדקו את תשובתכם ע"י הצבת הפתרונות שמצאתם במשוואה הנתונה

א. $z^2 + 2z + 2 = 0$ ב. $z^2 - z + 1 = 0$

4. נתונים $z_1 = 1 - 5i$, $z_2 = 3 + 4i$. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית:

א. $\frac{\overline{z_1}}{z_2}$ ב. $\frac{z_1}{z_2}$ ג. $\frac{z_1}{|z_2|}$ ד. $\left|\frac{z_1}{z_2}\right|$

5. א. הוכיחו שמספר מרוכב z הוא מספר ממשי אם ורק אם $z = \overline{z}$.

ב. יהי $z \neq 2$ מספר מרוכב. הוכיחו שהמספר $\frac{z+2}{z-2}$ הוא ממשי אם ורק אם z הוא מספר ממשי.

הדרכה לפתרון: סמנו $w = \frac{z+2}{z-2}$ והראו ש- $w = \overline{w}$ אם ורק אם $z = \overline{z}$.

6. רשמו הצגה קוטבית ($re^{i\theta}$) למספרים המרוכבים הבאים:

א. $-6 + (6\sqrt{3})i$ ב. $2 - 4i$

7. נתונים $z_2 = \sqrt{2} + (\sqrt{2})i$ $z_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$ רשמו הצגה קוטבית ל- z_1, z_2 ול- $\frac{z_1^5}{z_2^2}$.

8. רשמו הצגה קרטזית למספרים המרוכבים הבאים:

א. $(\sqrt{3} + i)^7$ ב. $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^8$

9. מצאו את כל הפתרונות למשוואות הבאות ותארו אותם כוקטורים במישור המרוכב:

א. $z^5 - (\sqrt{3} - 3i)z = 0$ ב. $z^4 = -8 + 8(\sqrt{3})i$ ג. $z^6 = \frac{1-i}{1+(\sqrt{3})i}$

10. בעזרת הצגה קוטבית של מספרים מרוכבים הוכיחו את הנוסחאות לכל $\alpha \in R$:

$$\cos(3\alpha) = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha$$

$$\sin(3\alpha) = 3\sin \alpha - 4\sin^3 \alpha$$

תרגילים נוספים:

1. יהיו z_1, z_2, \dots, z_k מספרים מרוכבים כך ש- $|z_1| = |z_2| = \dots = |z_k| = 1$. הוכיחו ש-

הדרכה לפתרון: $\left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_k} \right|$ $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$

2. הוכיחו כי אם $|z| \leq 1$ אז $|\operatorname{Im}(1 - \bar{z} + 2z^2)| < 4$.

הדרכה: היעזרו באי שוויון המשולש $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ ובכך ש $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$.

1. הוכיחו: א. $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$

ב. $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$

ג. $\frac{1}{\sqrt{2}} |\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$

תרגילים נוספים:

תרגילים נוספים.

1. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$: א. $(3-2i)^2$ ב. $(1+2i)(4-6i)^2$
2. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$: א. $\frac{1}{4-7i}$ ב. $\frac{9+2i}{3-5i}$
3. רשמו את המספר המרוכב $(i+i^2+i^3+\dots+i^{102})^2$ הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:
4. בכל סעיף פתרו את המשוואה באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית. $z^2+iz+2=0$
5. מצאו את הדרך הקלה ביותר לחשב את $|-2i(3+i)(2+4i)(1+i)|$ הדרכה לפתרון: $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
6. נתונים $z_1 = 1-5i$, $z_2 = 3+4i$. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית:
 א. $\frac{1}{z_1}$ ב. $\frac{z_1}{z_2}$ ג. $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)}$
7. מצאו את כל פתרונות המשוואה $z+i=i(\bar{z}-i)$. הדרכה: הציגו את z בצורה קרטזית: $z=a+bi$ ומצאו את a, b .
9. א. חשבו את מכפלת כל שורשי היחידה מסדר 3.
 (כלומר, חשבו את הערך של $z_0 \cdot z_1 \cdot z_2$ כאשר z_0, z_1, z_2 הם שורשי המשוואה $z^3=1$)
 ב. (רשות) חשבו את מכפלת כל שורשי היחידה מסדר m (m טבעי). הפרידו למקרים m זוגי ו- m אי-זוגי. $z^m=1$
10. רשמו הצגה קוטבית $(re^{i\theta})$ למספרים המרוכבים הבאים:
 א. $2i$ ב. -4 ג. $5+5i$ ד. $-3-3i$ ה. $2\sqrt{3}-2i$ ו. $4+3i$
11. רשמו הצגה קרטזית למספרים המרוכבים הבאים: א. $(1+i)^{12}$ ב. $(\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}}i)^{-6}$
12. מצאו את כל הפתרונות למשוואות הבאות ותארו אותם כוקטורים במישור המרוכב:
 א. $z^2=-i$ ב. $z^3=-27$ ג. $z^3=1+(\sqrt{3})i$
13. א. מצאו את הפתרונות של המשוואה $z^2=1-i$, רשמו אותם בצורה קרטזית $(a+bi)$.
 ב. פתרו את המשוואה הבאה באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית: $z^2+4z+4i=0$

ווקטורים:

בספר המצורף לאתר: עמודים 69-73

תרגילים: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18

21,22,23,24,25,26,33

מרחב ווקטורי ותת מרחב:
בספר המצורף לאתר: עמוד 125
תרגילים: 1-7
ללא סעיף א

פתרונות:
מספרים מרוכבים:

1. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

א. $\frac{1}{2i}$ ב. $\frac{2+3i}{7-3i}$ ג. $\left(\frac{1}{3-i}\right)^2$

א. $\frac{1}{2i} = \frac{-i}{2i(-i)} = -\frac{i}{2}$

ב. $\frac{2+3i}{7-3i} = \frac{(2+3i)(7+3i)}{(7-3i)(7+3i)} = \frac{14+27i-9}{7^2+3^2} = \frac{5+27i}{58} = \frac{5}{58} + \frac{27}{58}i$

ג. $\left(\frac{1}{3-i}\right)^2 = \frac{1}{9-6i-1} = \frac{1}{8-6i} = \frac{8+6i}{(8-6i)(8+6i)} = \frac{8+6i}{8^2+6^2} = \frac{8+6i}{100} = \frac{8}{100} + \frac{6}{100}i$

2. רשמו את המספרים המרוכבים הבאים בהצגה קרטזית $(a+bi)$:

$(1+i+i^2+i^3)^{100}$ i^{25} i^{26} i^{27} i^{28} i^n i^{2005} i^{-1}

נשים לב כי $i^4 = 1$, $i^3 = -i$, $i^2 = -1$, $i^1 = i$ וכן כי $i^{4k} = (i^4)^k = 1^k = 1$ לכל k שלם.

$$i^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$$

$$i^{2005} = i^{4 \cdot 501} i = (i^4)^{501} \cdot i = i$$

באופן כללי מתקיים $i^n = \begin{cases} 1 & n = 4k + 0 \\ i & n = 4k + 1 \\ -1 & n = 4k + 2 \\ -i & n = 4k + 3 \end{cases}$ ולכן החישובים הבאים מיידיים:

$$i^{28} = i^{4 \cdot 7} = 1$$

$$i^{27} = i^{4 \cdot 6 + 3} = i^3 = -i$$

$$i^{26} = i^{4 \cdot 6 + 2} = i^2 = -1$$

$$i^{25} = i^{4 \cdot 6 + 1} = i$$

$$(1+i+i^2+i^3)^{100} = (1+i-1-i)^{100} = (0)^{100} = 0$$

באותו אופן נשים לב כי לכל k מתקיים $i^{4k} + i^{4k+1} + i^{4k+2} + i^{4k+3} = 0$ ולכן

$$(i+i^2+\dots+i^{100}+i^{101}+i^{102})^2 = (i^{101}+i^{102})^2 = (i-1)^2 = i^2 - 2i + 1 = 2 - 2i$$

3. בכל סעיף פתרו את המשוואה באמצעות הנוסחה לפתרון משוואה ריבועית.
 בדקו את תשובתכם ע"י הצבת הפתרונות שמצאתם במשוואה הנתונה
 א. $z^2 + 2z + 2 = 0$ ב. $z^2 - z + 1 = 0$

א. $z^2 + 2z + 2 = 0$

$$z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 2}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-4}}{2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i$$

הצבה:

$$(-1+i)^2 + 2(-1+i) + 2 = (1-2i-1) - 2 + 2i + 2 = 0$$

$$(-1-i)^2 + 2(-1-i) + 2 = (1+2i-1) - 2 - 2i + 2 = 0$$

ב. $z^2 - z + 1 = 0$

$$z_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 4}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

הצבה:

$$\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right)^2 - \left(\frac{1+\sqrt{3}i}{2}\right) + 1 = \frac{1+2\sqrt{3}i-3}{4} - \frac{2+2\sqrt{3}i}{4} + \frac{2}{4} = 0$$

$$\left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right)^2 - \left(\frac{1-\sqrt{3}i}{2}\right) + 1 = \frac{1-2\sqrt{3}i-3}{4} - \frac{2-2\sqrt{3}i}{4} + \frac{2}{4} = 0$$

$$\frac{\bar{z}_1}{z_2} = \frac{\overline{1-5i}}{3+4i} = \frac{1+5i}{3+4i} = \frac{(1+5i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \frac{3-4i+15i+20}{3^2+4^2} = \frac{23+11i}{25} = \frac{23}{25} + \frac{11}{25}i \quad \text{א.}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \overline{\left(\frac{\bar{z}_1}{z_2}\right)} = \overline{\left(\frac{23}{25} + \frac{11}{25}i\right)} = \frac{23}{25} - \frac{11}{25}i \quad \text{ב.}$$

$$\frac{z_1}{|z_2|} = \frac{1-5i}{|3+4i|} = \frac{1-5i}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{(1-5i)}{\sqrt{25}} = \frac{1}{5} - i \quad \text{ג.}$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{|1-5i|}{|3+4i|} = \frac{\sqrt{1^2+5^2}}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{25}} = \frac{\sqrt{26}}{5} \quad \text{ד.}$$

$$\text{נסמן } w = \frac{z+2}{z-2}.$$

$$w = \bar{w} \Leftrightarrow \frac{z+2}{z-2} = \overline{\left(\frac{z+2}{z-2}\right)} \Leftrightarrow \frac{z+2}{z-2} = \frac{\bar{z}+2}{\bar{z}-2} \Leftrightarrow$$

$$\frac{z+2}{z-2} = \frac{\bar{z}+2}{\bar{z}-2} \Leftrightarrow \frac{z+2}{z-2} = \frac{\bar{z}+2}{\bar{z}-2} \Leftrightarrow (z+2)(\bar{z}-2) = (\bar{z}+2)(z-2)$$

$$\Leftrightarrow z\bar{z} + 2\bar{z} - 2z - 4 = \bar{z}z - 2\bar{z} + 2z - 4 \Leftrightarrow 4\bar{z} = 4z \Leftrightarrow \bar{z} = z$$

הערה: במהלך ההוכחה נעזרנו ב"כללי הצמוד": $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$ ובכך ש $\bar{\bar{z}} = z$ (כי 2 הוא מספר ממשי).

$$\text{א. } z \Leftarrow z = -6 + 6\sqrt{3}i \quad -6 + (6\sqrt{3})i$$

$$|z| = \sqrt{(-6)^2 + (6\sqrt{3})^2} = 12$$

$$\theta = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3} \Leftarrow \text{ז. } z \text{ ברביע השני} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{6\sqrt{3}}{-6} = -\sqrt{3}$$

$$z = -6 + 6\sqrt{3}i = 12 \left[\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) + i \sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \right] = 12e^{i\frac{2\pi}{3}} \quad \text{לכן:}$$

$$\text{ב. } z \Leftarrow z = 2 - 4i \quad 2 - 4i$$

$$|z| = \sqrt{(2)^2 + (-4)^2} = 2\sqrt{5}$$

$$\theta \cong -1.107 \Leftarrow \text{ז. } z \text{ ברביע הרביעי} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{-4}{2} = -2$$

$$z = 2 - 4i = 2\sqrt{5} [\cos(-1.107) + i \sin(-1.107)] = 2\sqrt{5} e^{-i1.107} \quad \text{לכן:}$$

ברביע הראשון $z_1 \leftarrow z_1 = \frac{3\sqrt{3}}{2} + i\frac{3}{2}$ (א)

$$|z_1| = \sqrt{\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2} = 3$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \text{ברביע הראשון} \quad \text{ו-} z_1 \quad \Rightarrow \quad \operatorname{tg}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$z_1 = 3 \left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right] = 3e^{i\frac{\pi}{6}} : \text{לבן}$$

ברביע הראשון $z \Leftarrow z_2 = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

$$|z_2| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2} = 2 \quad \Rightarrow$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \text{זווית הראשון } z_2 \text{ ו- } \operatorname{tg}(\theta) = 1$$

$$z_2 = 2 \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = 2e^{i\frac{\pi}{4}} : \text{לכן}$$

$$z_3 = \frac{z_1^5}{z_2^2}$$

$$z_5 = \frac{z_1^5}{z_2^2} = \frac{(3e^{i\frac{\pi}{6}})^5}{(2e^{i\frac{\pi}{4}})^2} = \frac{243}{4} e^{\left(\frac{5\pi}{6} - \frac{2\pi}{4}\right)i} = \frac{243}{4} e^{\frac{\pi}{3}i}$$

א. $(\sqrt{3} + i)^7$

שלב 1: צורה קוטבית של $\sqrt{3} + i$

$$|\sqrt{3} + i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (1)^2} = 2$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} \Leftrightarrow \sqrt{3} + i \text{ ברביע הראשון} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\sqrt{3} + i = 2 \left[\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \right] = 2e^{i\frac{\pi}{6}} \quad \text{לכן}$$

שלב 2: נוסחת MOIVRE DE

$$\begin{aligned} (\sqrt{3} + i)^{-7} &= (2)^{-7} \left[e^{i\frac{\pi}{6}} \right]^{-7} = 128e^{-i\frac{7\pi}{6}} = 128e^{-i\frac{5\pi}{6}} = 128 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) = (-64\sqrt{3} - 64i) \\ (\sqrt{3} + i)^{-7} &= (-64\sqrt{3} - 64i) \end{aligned}$$

ב. $\left(\frac{1-i}{1+i} \right)^8$

שלב 1: צורה קוטבית של $\frac{1-i}{1+i}$

$$\frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)(1-i)}{(1+i)(1-i)} = -i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

שלב 2: נוסחת MOIVRE DE

$$\left(\frac{1-i}{1+i} \right)^8 = \left[e^{-i\frac{\pi}{2}} \right]^8 = e^{-i4\pi} = e^{i0} = 1$$

$$\left(\frac{1-i}{1+i} \right)^8 = 1$$

$$z^5 - (\sqrt{3} - 3i)z = 0 \quad \text{א.}$$

$$z = 0 \quad \text{או} \quad z^4 = (\sqrt{3} - 3i) \Leftrightarrow z[z^4 - (\sqrt{3} - 3i)] = 0 \Leftrightarrow z^5 - (\sqrt{3} - 3i)z = 0$$

נמצא את פתרונות המשוואה $z^4 = (\sqrt{3} - 3i)$.

שלב 1: צורה קוטבית של $\sqrt{3} - 3i$

$$|\sqrt{3} - 3i| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (3)^2} = 2\sqrt{3}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{3} \quad \text{כי} \quad \sqrt{3} - 3i \quad \text{ברביע הרביעי} \quad \text{וגי} \quad \text{tg}(\theta) = -\frac{3}{\sqrt{3}} = -\sqrt{3}$$

$$\sqrt{3} - 3i = 2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{לכן}$$

שלב 2: פתרונות של $z^4 = (\sqrt{3} - 3i)$

$$z = re^{i\theta} \quad \text{נסמן}$$

$$r^4 e^{i4\theta} = 2\sqrt{3}e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{בצורה} \quad z^4 = (\sqrt{3} - 3i) \quad \text{נרשום את המשוואה}$$

$$\begin{cases} r^4 = 2\sqrt{3} \\ 4\theta = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} \quad \text{לכן פתרונותיה הם:} \quad \text{המשוואה מתקיימת אם ורק אם}$$

$$z_k = \sqrt[4]{2\sqrt{3}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{4}\right)} = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}}e^{i\left(-\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$z_k = \sqrt[4]{2\sqrt{3}} e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2k\pi}{4}\right)} = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}\right)}, \quad k=0,1,2,3$$

$$\begin{cases} z_0 = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)} \\ z_1 = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{2\pi}{4}\right)} = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\frac{5\pi}{12}} \\ z_2 = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{4\pi}{4}\right)} = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\frac{11\pi}{12}} \\ z_3 = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\left(\frac{\pi}{12} + \frac{6\pi}{4}\right)} = 2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{\frac{1}{8}} e^{i\frac{17\pi}{12}} \end{cases}$$

בסיכום: פתרונות המשוואה הנתונה הם הפתרונות שרשמנו למעלה בתוספת הפתרון $z=0$.

$$\text{ב. } z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$$

שלב 1: צורה קוטבית של $-8 + 8\sqrt{3}i$

$$|-8 + 8\sqrt{3}i| = \sqrt{(-8)^2 + (8\sqrt{3})^2} = 16 \quad \Rightarrow$$

$$\theta = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2\pi}{3} \quad \Leftarrow \quad \text{וגי } -8 + 8\sqrt{3}i \text{ ברביע השני} \quad \Rightarrow \quad \text{tg}(\theta) = -\sqrt{3}$$

$$\text{לכן: } -8 + 8\sqrt{3}i = 16e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

שלב 2: פתרונות של $z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i$

$$\text{נסמן } z = re^{i\theta}$$

$$\text{נרשום את המשוואה } z^4 = -8 + 8\sqrt{3}i \text{ בצורה } r^4 e^{i4\theta} = 16e^{i\frac{2\pi}{3}}$$

$$\text{לכן פתרונותיה הם:} \quad \begin{cases} r^4 = 16 \\ 4\theta = \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} \quad \text{המשוואה מתקיימת אם ורק אם}$$

$$z_k = \sqrt[4]{16} e^{i\left(\frac{2\pi}{12} + \frac{2k\pi}{4}\right)} = 2e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{k\pi}{2}\right)}, \quad k=0,1,2,3$$

$$\begin{cases} z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{6}} \\ z_1 = 2e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right)} = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ z_2 = 2e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \pi\right)} = 2e^{i\frac{7\pi}{6}} \\ z_3 = 2e^{i\left(\frac{\pi}{6} + \frac{3\pi}{2}\right)} = 2e^{i\frac{5\pi}{3}} \end{cases}$$

$$z^6 = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}} \quad \text{ג.}$$

שלב 1: צורה קוטבית של $\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$

צורה קוטבית של $\omega_1 = 1-i$

$$\left| \begin{array}{l} |\omega_1| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2} \\ \theta = -\frac{\pi}{4} \Leftarrow \text{ברביע הרביעי} \quad \omega_1 \cdot \text{tg}(\theta) = -1 \\ \omega_1 = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}} \quad \text{לכן} \end{array} \right|$$

צורה קוטבית של $\omega_2 = 1+i\sqrt{3}$

$$\left| \begin{array}{l} |\omega_2| = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2 \\ \theta = \frac{\pi}{3} \Leftarrow \text{ברביע הראשון} \quad \omega_2 \cdot \text{tg}(\theta) = \sqrt{3} \\ \omega_2 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} \quad \text{לכן} \end{array} \right|$$

צורה קוטבית של $\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$ היא: $\frac{1-i}{1+i\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}{2e^{i\frac{\pi}{3}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{\pi}{4}-i\frac{\pi}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$

שלב 2: פתרונות של $z^6 = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$

נסמן $z = re^{i\theta}$

נרשום את המשוואה $z^6 = \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$ בצורה $r^6 e^{i6\theta} = \frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$

המשוואה מתקיימת אם ורק אם $\left\{ \begin{array}{l} r^6 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 6\theta = -\frac{7\pi}{12} + 2\pi k \end{array} \right.$ לכן פתרונותיה הם:

$$z_k = \sqrt[6]{\frac{\sqrt{2}}{2}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{2k\pi}{6}\right)} = \left(2^{-\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{6}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{k\pi}{3}\right)} = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{k\pi}{3}\right)}, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

$$\begin{cases} z_0 = 2^{-\frac{1}{12}} e^{-i\frac{7\pi}{72}} \\ z_1 = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{\pi}{3}\right)} = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\frac{17\pi}{72}} \\ z_2 = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{2\pi}{3}\right)} = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\frac{41\pi}{72}} \\ z_3 = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{3\pi}{3}\right)} = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\frac{65\pi}{72}} \\ z_4 = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{4\pi}{3}\right)} = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\frac{89\pi}{72}} \\ z_5 = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\left(-\frac{7\pi}{72} + \frac{5\pi}{3}\right)} = 2^{-\frac{1}{12}} e^{i\frac{113\pi}{72}} \end{cases}$$

הוכחה:

$$\begin{aligned}
 e^{i3\alpha} &= (e^{i\alpha})^3 \Rightarrow \\
 \cos(3\alpha) + i \sin(3\alpha) &= (\cos \alpha + i \sin \alpha)^3 \stackrel{(*)}{=} \cos^3 \alpha + 3 \cos^2 \alpha \cdot i \sin \alpha + 3 \cos \alpha \cdot (i \sin \alpha)^2 + (i \sin \alpha)^3 = \\
 &= (\cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \cdot \sin^2 \alpha) + i(3 \cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha) \\
 \Rightarrow & \\
 \begin{cases} \cos(3\alpha) = \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \cdot \sin^2 \alpha = \cos \alpha (\cos^2 \alpha - 3 \sin^2 \alpha) = \\ \cos \alpha (\cos^2 \alpha - 3(1 - \cos^2 \alpha)) = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \\ \sin(3\alpha) = 3 \cos^2 \alpha \sin \alpha - \sin^3 \alpha = \sin \alpha (3 \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \\ \sin \alpha (3(1 - \sin^2 \alpha) - \sin^2 \alpha) = 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha \end{cases}
 \end{aligned}$$

הסבר לשוויון (*): נעזרנו בנוסחה $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
 דרך נוספת (ארוכה יותר ואלגנטית פחות...):

$$\begin{aligned}
 \cos \alpha &= \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}, \cos(3\alpha) = \frac{e^{i3\alpha} + e^{-i3\alpha}}{2}, \sin \alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}, \sin(3\alpha) = \frac{e^{i3\alpha} - e^{-i3\alpha}}{2i} \\
 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha &= 4 \left(\frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} \right)^3 - 3 \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} = \\
 &= 4 \left(\frac{(e^{i\alpha})^3 + 3(e^{i\alpha})^2 e^{-i\alpha} + 3e^{i\alpha} (e^{-i\alpha})^2 + (e^{-i\alpha})^3}{8} \right) - \frac{3e^{i\alpha} + 3e^{-i\alpha}}{2} = \\
 &= \frac{e^{i3\alpha} + 3e^{i\alpha} + 3e^{-i\alpha} + e^{-i3\alpha}}{2} - 3 \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2} = \frac{e^{i3\alpha} + e^{-i3\alpha}}{2} = \cos(3\alpha) \\
 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha &= 3 \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} - 4 \left(\frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i} \right)^3 = \\
 &= \frac{3e^{i\alpha} - 3e^{-i\alpha}}{2i} - 4 \left(\frac{(e^{i\alpha})^3 - 3(e^{i\alpha})^2 e^{-i\alpha} + 3e^{i\alpha} (e^{-i\alpha})^2 - (e^{-i\alpha})^3}{-8i} \right) = \\
 &= \frac{3e^{i\alpha} - 3e^{-i\alpha}}{2i} + \left(\frac{e^{i3\alpha} - 3e^{i\alpha} + 3e^{-i\alpha} - e^{-i3\alpha}}{2i} \right) = \frac{e^{i3\alpha} - e^{-i3\alpha}}{2i} = \sin(3\alpha)
 \end{aligned}$$

הערה: בדרך הראשונה אתם מפתחים את הנוסחאות, בדרך השנייה אתם צריכים לדעת מראש את הנוסחאות כדי להוכיח אותן. זו עוד סיבה לכך שדרך הפתרון הראשונה עדיפה.
אתגר: פתחו נוסחאות ל- $\sin 4\alpha$, $\cos 4\alpha$.

$$(3-2i)^2 = 9-12i+4i^2 = 9-12i-4 = 5-12i \quad \text{.א}$$

$$\begin{aligned}(1+2i)(4-6i)^2 &= (1+2i)(16-48i+36i^2) = (1+2i)(16-48i-36) \\ &= (1+2i)(-20-48i) = -20-48i-40i+96 \\ &= 76-88i\end{aligned}$$

$$\frac{1}{4-7i} = \frac{4+7i}{(4-7i)(4+7i)} = \frac{4+7i}{4^2+7^2} = \frac{4+7i}{65} = \frac{4}{65} + \frac{7}{65}i \quad \text{.א}$$

$$(i+i^2+\dots+i^{100}+i^{101}+i^{102})^2 = (i^{101}+i^{102})^2 = (i-1)^2 = i^2-2i+1 = 2-2i$$

$$\begin{aligned}z^2+iz+2 &= 0 \\ z_{1,2} &= \frac{-i \pm \sqrt{(i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} = \frac{-i \pm \sqrt{-9}}{2} = \frac{-i \pm 3i}{2} \Rightarrow z_{1,2} = -2i, i \\ &\quad \text{הצבה} \\ (-2i)^2 + i(-2i) + 2 &= -4 + 2 + 2 = 0 \\ i^2 + i \cdot i + 2 &= -1 - 1 + 2 = 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}|-2i(3+i)(2+4i)(1+i)| &= |-2i| |3+i| |2+4i| |1+i| = 2\sqrt{3^2+1^2} \sqrt{2^2+4^2} \sqrt{1^2+1^2} \\ &= 2\sqrt{10} \sqrt{20} \sqrt{2} = 2\sqrt{400} = 2 \cdot 20 = 40\end{aligned}$$

$$\frac{1}{z_1} = \frac{1}{1-5i} = \frac{1+5i}{(1-5i)(1+5i)} = \frac{1+5i}{1^2+5^2} = \frac{1}{26} + \frac{5}{26}i \quad \text{.א}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{1-5i}{3+4i} = \frac{1-5i}{3+4i} = \frac{(1-5i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)} = \frac{3-4i-15i-20}{3^2+4^2} = \frac{-17-19i}{25} = -\frac{17}{25} - \frac{19}{25}i \quad \text{.ב}$$

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \overline{\left(-\frac{17}{25} - \frac{19}{25}i\right)} = -\frac{17}{25} + \frac{19}{25}i \quad \text{.ג}$$

א. שלב 1: צורה קוטבית של $1 = e^{i0}$

שלב 2: פתרונות המשוואה $z^3 = 1 = e^{i0}$ הם:

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{3}}, \quad k = 0, 1, 2$$

$$\begin{cases} z_0 = e^{i0} \\ z_1 = e^{i\frac{2\pi}{3}} \\ z_2 = e^{i\frac{4\pi}{3}} \end{cases}$$

$$z_0 z_1 z_2 = e^{i0} e^{i\frac{2\pi}{3}} e^{i\frac{4\pi}{3}} = e^{i\left(0 + \frac{2\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right)} = e^{i\frac{6\pi}{3}} = e^{i2\pi} = 1 \quad \text{לכן}$$

ב. פתרונות המשוואה $z^m = 1 = e^{i0}$ הם:

$$z_k = e^{i\frac{2k\pi}{m}}, \quad k = 0, 1, \dots, m-1$$

$$\begin{aligned} z_0 z_1 \dots z_{m-1} &= e^{i0} e^{i\frac{2\pi}{m}} \dots e^{i\frac{2(m-1)\pi}{m}} = e^{i\sum_{k=0}^{m-1} \frac{2\pi k}{m}} = e^{i\frac{2\pi}{m} \left(\sum_{k=0}^{m-1} k\right)} = e^{i\frac{2\pi}{m} \left(\frac{m(m-1)}{2}\right)} \\ &= e^{i\pi(m-1)} = \begin{cases} 1 & m = 2l+1 \\ -1 & m = 2l \end{cases} \end{aligned}$$

הסבר לשוויון (*): נוסחת סכום n איברים ראשונים בסדרה חשבונית (סדרה שבה $a_{k+1} - a_k$ הוא

$$\text{מספר קבוע}): \quad a_1 + a_2 + \dots + a_n = (a_1 + a_n) \frac{n}{2} \quad \text{כאן: } a_1 = 0, \quad a_n = m-1, \quad n = m$$

א. $z = 0 + 2i$ ברביע הראשון

$$|z| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \quad \text{לא מוגדר ו-} z \text{ ברביע הראשון}$$

$$z = 2i = 2 \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \right] = 2e^{i\frac{\pi}{2}} \quad \text{לכן}$$

ב. $z = -4$ ברביע השני

$$|z| = \sqrt{(-4)^2 + 0^2} = 4$$

$$\theta = \pi \quad \text{לא מוגדר ו-} z \text{ ברביע השני} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{0}{-4} = 0$$

$$z = -4 = 4[\cos(\pi) + i \sin(\pi)] = 4e^{i\pi} \quad \text{לכן}$$

ג. $z = 5 + 5i$ ברביע הראשון

$$|z| = \sqrt{(5)^2 + (5)^2} = 5\sqrt{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \quad \text{לא מוגדר ו-} z \text{ ברביע הראשון} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{5}{5} = 1$$

$$z = 5 + 5i = 5\sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = 5\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}} \quad \text{לכן}$$

ד. $z = -3 - 3i$ ברביע השלישי

$$|z| = \sqrt{(3)^2 + (3)^2} = 3\sqrt{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4} \quad \text{לא מוגדר ו-} z \text{ ברביע השלישי} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{-3}{-3} = 1$$

$$z = -3 - 3i = 3\sqrt{2} \left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) \right] = 3\sqrt{2}e^{-i\frac{3\pi}{4}} \quad \text{לכן}$$

ה. $z = 2\sqrt{3} - 2i$ ברביע הרביעי

$$|z| = \sqrt{(2\sqrt{3})^2 + (-2)^2} = 4$$

$$\theta = -\frac{\pi}{6} \quad \text{לא מוגדר ו-} z \text{ ברביע הרביעי} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{-2}{2\sqrt{3}} = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$z = 2\sqrt{3} - 2i = 4 \left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) \right] = 4e^{-i\frac{\pi}{6}} \quad \text{לכן}$$

ו. $4 + 3i$

ברביע הראשון $z = 4 + 3i$

$$|z| = \sqrt{(4)^2 + (3)^2} = 5$$

$$\theta \approx 0.64 \quad \text{לא מוגדר ו-} z \text{ ברביע הראשון} \quad \text{tg}(\theta) = \frac{3}{4}$$

$$z = 4 + 3i = 5[\cos(0.64) + i \sin(0.64)] = 5e^{i0.64} \quad \text{לכן}$$

א. $(1+i)^{12}$

שלב 1: צורה קוטבית של $1+i$

$$|1+i| = \sqrt{(1)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \quad \Rightarrow$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \text{ברביע הראשון } 1+i \quad \Rightarrow \quad \text{tg}(\theta) = 1$$

$$1+i = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \quad \text{לכן:}$$

שלב 2: נוסחא MOIVRE DE

$$(1+i)^{12} = (\sqrt{2})^{12} \left[e^{i\frac{\pi}{4}} \right]^{12} = 64 e^{i\frac{12\pi}{4}} = 64 e^{i3\pi} = -64$$

$$(1+i)^{12} = -64$$



ב. $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-6}$

שלב 1: צורה קוטבית של $\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\left| \frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} \right| = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1 \quad \Rightarrow$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \text{ברביע הראשון } 1+i \quad \Rightarrow \quad \text{tg}(\theta) = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right] = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}} \quad \text{לכן:}$$

שלב 2: נוסחא MOIVRE DE

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-6} = (1)^{-6} \left[e^{i\frac{\pi}{4}} \right]^{-6} = e^{-i\frac{6\pi}{4}} = e^{-i\frac{3\pi}{2}} = e^{i\frac{\pi}{2}} = i$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{-6} = i$$

א. $z^2 = -i$

$$-i = e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

שלב 1: צורה קוטבית של $-i$

שלב 2: פתרונות של $z^2 = -i$

$$. z = re^{i\theta} \quad \text{נסמן}$$

$$. r^2 e^{i2\theta} = e^{-i\frac{\pi}{2}} \quad \text{בצורה } z^2 = -i \quad \text{נרשום את המשוואה}$$

$$\text{לכן פתרונותיה הם:} \quad \begin{cases} r^2 = 1 \\ 2\theta = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k \end{cases} \quad \text{המשוואה מתקיימת אם ורק אם}$$

$$z_k = e^{i\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{2k\pi}{2}\right)}, \quad k=0,1$$

$$\begin{cases} z_0 = e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)} \\ z_1 = e^{i\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{2\pi}{2}\right)} = e^{i\frac{3\pi}{4}} \end{cases}$$

ב. $z^3 = -27$

$$-27 = 27e^{i\pi}$$

שלב 1: צורה קוטבית של -27

שלב 2: פתרונות של $z^3 = -27$

$$. z = re^{i\theta} \quad \text{נסמן}$$

$$. r^3 e^{i3\theta} = 27e^{i\pi} \quad \text{בצורה } z^3 = -27 \quad \text{נרשום את המשוואה}$$

$$\text{לכן פתרונותיה הם:} \quad \begin{cases} r^3 = 27 \\ 3\theta = \pi + 2\pi k \end{cases} \quad \text{המשוואה מתקיימת אם ורק אם}$$

$$\begin{cases} z_0 = 3e^{i\frac{\pi}{3}} \\ z_1 = 3e^{i\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right)} = 3e^{i\pi} \\ z_2 = 3e^{i\left(\frac{\pi}{3} + \frac{4\pi}{3}\right)} = 3e^{i\frac{5\pi}{3}} \end{cases} \quad \text{כלומר} \quad z_k = 3e^{i\left(\frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}\right)}, \quad k=0,1,2$$

$$z^3 = 1 + (\sqrt{3})i \quad \text{ג.}$$

שלב 1: צורה קוטבית של $1 + i\sqrt{3}$

$$|1 + i\sqrt{3}| = \sqrt{(1)^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \quad \text{כי } \operatorname{tg}(\theta) = \sqrt{3} \quad \text{ו-} 1 + i\sqrt{3} \text{ ברביע הראשון}$$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\frac{\pi}{3}} \quad \text{לכן}$$

שלב 2: פתרונות של $z^3 = 1 + \sqrt{3}i$
נסמן $z = re^{i\theta}$

$$r^3 e^{i3\theta} = 2e^{i\frac{\pi}{3}} \quad \text{בצורה } z^3 = 1 + \sqrt{3}i \quad \text{נרשום את המשוואה}$$

$$\begin{cases} r^3 = 2 \\ 3\theta = \frac{\pi}{3} + 2\pi k \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{לכן פתרונותיה הם:} \\ \text{המשוואה מתקיימת אם ורק אם} \end{array}$$

$$z_k = \sqrt[3]{2} e^{i\left(\frac{\pi}{9} + \frac{2k\pi}{3}\right)} \quad k = 0, 1, 2$$

$$\begin{cases} z_0 = \sqrt[3]{2} e^{i\frac{\pi}{9}} \\ z_1 = \sqrt[3]{2} e^{i\left(\frac{\pi}{9} + \frac{2\pi}{3}\right)} = \sqrt[3]{2} e^{i\frac{7\pi}{9}} \\ z_2 = \sqrt[3]{2} e^{i\left(\frac{\pi}{9} + \frac{4\pi}{3}\right)} = \sqrt[3]{2} e^{i\frac{13\pi}{9}} \end{cases}$$

פתרון:

א. **שלב 1**: צורה קוטבית של $1-i$

$$|1-i| = \sqrt{(1)^2 + (-1)^2} = 2^{0.5}$$

$$\theta = -\frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \text{בזווית הרביעית } 1-i \text{ ו- } \operatorname{tg}(\theta) = -1$$

$$1-i = 2^{0.5} e^{-i\frac{\pi}{4}} \quad \text{לכן}$$

שלב 2: פתרונות של $z^2 = 1-i$

$$z = re^{i\theta}$$

$$r^2 e^{i2\theta} = 2^{0.5} e^{-i\frac{\pi}{4}} \quad \text{נרשום את המשוואה } z^2 = 1-i \text{ בצורה}$$

$$\begin{cases} r^2 = 2^{0.5} \\ 2\theta = \frac{-\pi}{4} + 2\pi k \end{cases} \quad \text{לכן פתרונותיה הם:} \quad \begin{cases} \text{המשוואה מתקיימת אם ורק אם} \\ z_k = 2^{0.25} e^{i\left(\frac{-\pi}{8} + \frac{2k\pi}{2}\right)} = 2^{0.25} e^{i\left(\frac{-\pi}{8} + k\pi\right)}, \quad k=0,1 \\ z_0 = 2^{0.25} e^{\frac{-\pi}{8}i}, \quad z_1 = 2^{0.25} e^{\frac{7\pi}{8}i} \end{cases}$$

רישום בצורה קרטזית:

$$z_0 = 2^{0.25} e^{\frac{-\pi}{8}i} = 2^{0.25} \left(\cos\left(\frac{-\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{-\pi}{8}\right) \right) \approx 1.19(0.92 + (-0.38)i) \approx 1.09 - 0.45i$$

$$z_1 = 2^{0.25} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{8}\right) + i \sin\left(\frac{7\pi}{8}\right) \right) \approx 1.19(-0.92 + 0.38i) \approx -1.09 + 0.45i$$

ב. נפתור את המשוואה $z^2 + 4z + 4i = 0$:

$$z_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16i}}{2} = -2 \pm 2\sqrt{1-i} = -2 \pm 2(1.09 - 0.45i)$$

$$z_1 = 0.18 - 0.9i, \quad z_2 = -4.18 + 0.9i$$

$$14. \text{הוכיחו כי לכל מספר ממשי } \alpha \neq n \frac{\pi}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \left(\frac{1+i \tan \alpha}{1-i \tan \alpha} \right)^n = \frac{1+i \tan(n\alpha)}{1-i \tan(n\alpha)}$$

לכל $\theta \neq n \frac{\pi}{2}$ מספר ממשי מתקיים

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta = \cos \theta \left(1 + \frac{\sin \theta}{\cos \theta} i \right) = \cos \theta (1 + i \tan \theta)$$

$$e^{-i\theta} = \cos(-\theta) (1 + i \tan(-\theta)) = \cos \theta (1 - i \tan \theta) \quad \text{ולכן}$$

(השתמשנו בזוגיות $\cos(-\theta) = \cos \theta$ ובאי זוגיות $\tan(-\theta) = -\tan \theta$)
לכן:

$$\begin{aligned} \left(\frac{1+i \tan \alpha}{1-i \tan \alpha} \right)^n &= \frac{(1+i \tan \alpha)^n}{(1-i \tan \alpha)^n} = \frac{(\cos \alpha)^n (1+i \tan \alpha)^n}{(\cos \alpha)^n (1-i \tan \alpha)^n} = \\ &= \frac{(\cos \alpha (1+i \tan \alpha))^n}{(\cos \alpha (1-i \tan \alpha))^n} = \frac{(e^{i\alpha})^n}{(e^{-i\alpha})^n} = \frac{e^{in\alpha}}{e^{-in\alpha}} = \frac{\cos(n\alpha) (1+i \tan n\alpha)}{\cos(n\alpha) (1-i \tan n\alpha)} = \frac{(1+i \tan n\alpha)}{(1-i \tan n\alpha)} \end{aligned}$$

1. יהיו z_1, z_2, \dots, z_k מספרים מרוכבים כך ש- $|z_1| = |z_2| = \dots = |z_k| = 1$. הוכיחו ש-

$$|z_1 + z_2 + \dots + z_k| = \left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \dots + \frac{1}{z_k} \right|$$

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} \quad \text{הדרכה לפתרון:}$$

$$\text{היות ו- } |z_i| = 1 \quad \text{נובע כי לכל } z_i: \quad \frac{1}{z_i} = \frac{\bar{z}_i}{z_i \bar{z}_i} = \frac{\bar{z}_i}{|z_i|^2} = \bar{z}_i$$

$$\text{לכן } \left| \sum_i \frac{1}{z_i} \right| = \left| \sum_i \bar{z}_i \right| = \left| \overline{\sum_i z_i} \right| = \left| \sum_i z_i \right| \quad \text{ההצדקה לשוויון (*) היא הטענה שהוכחנו בסעיף א'.$$

2. הוכיחו כי אם $|z| \leq 1$ אז $|\operatorname{Im}(1 - \bar{z} + 2z^2)| < 4$.

הדרכה: היעזרו באי שוויון המשולש $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ ובכך ש $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$.

נשים לב היות ו-1 מספר ממשי נובע:

$$\operatorname{Im}(1 - \bar{z} + 2z^2) = \operatorname{Im}(-\bar{z} + 2z^2)$$

ונזכור בתרגיל קודם הוכחנו: $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$

$$\text{וכן ידוע } |z| = |\bar{z}| \quad \text{וראינו בשאלה קודמת ש- } |z^n| = |z|^n \quad \text{בפרט } |z^2| = |z|^2$$

ולכן:

$$\begin{aligned} |\operatorname{Im}(1 - \bar{z} + 2z^2)| &= |\operatorname{Im}(-\bar{z} + 2z^2)| \leq |-\bar{z} + 2z^2| \leq |-\bar{z}| + |2z^2| = \\ &= |\bar{z}| + 2|z^2| = |z| + 2|z|^2 \leq 1 + 2 = 3 < 4 \end{aligned}$$

1. הוכיחו:

א. $|\operatorname{Re} z| \leq |z|$

ב. $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$

ג. $\frac{1}{\sqrt{2}} |\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$

א. נסמן $z = x + yi$ אזי $\operatorname{Re} z = x$

היות ולכל x, y ממשיים קיים $x^2 \leq x^2 + y^2$

$$|\operatorname{Re} z| \leq |z| \Leftrightarrow |\operatorname{Re} z|^2 \leq |z|^2 \Leftrightarrow x^2 \leq x^2 + y^2$$

ב. $|\operatorname{Im} z| \leq |z|$, היות ולכל x, y ממשיים קיים $y^2 \leq x^2 + y^2$

$$|\operatorname{Im} z| \leq |z| \Leftrightarrow |\operatorname{Im} z|^2 \leq |z|^2 \Leftrightarrow y^2 \leq x^2 + y^2$$

ג. (*) $\frac{1}{\sqrt{2}} |\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$

נסמן $z = x + yi$.

נוכיח את אי השוויון $|z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$:

צריך להוכיח כי $|x + iy| \leq |x| + |y|$. נוכיח את זה:

מתקיים $(|x| + |y|)^2 = (|x| + |y|)^2 = |x|^2 + 2|x||y| + |y|^2 = |x + iy|^2 = x^2 + y^2 \leq |x + iy|^2$ ולכן $|x + iy| \leq |x| + |y|$.

נוכיח את אי השוויון $\frac{1}{\sqrt{2}} |\operatorname{Re} z + \operatorname{Im} z| \leq |z|$:

צריך להוכיח כי

$$\frac{1}{\sqrt{2}} |x + y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|x + y| \leq \sqrt{2(x^2 + y^2)} \Leftrightarrow (x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 \leq 2x^2 + 2y^2$$

$$\Leftrightarrow 2xy \leq x^2 + y^2 \Leftrightarrow 0 \leq x^2 - 2xy + y^2 \Leftrightarrow 0 \leq (x - y)^2$$

אי השוויון האחרון תמיד נכון. לכן $\frac{1}{\sqrt{2}} |x + y| \leq \sqrt{x^2 + y^2}$.

ווקטורים:

