

2025/08/05 の宿題

導関数

例題 1:

(1) 関数 $f(x)$ の導関数の定義式を書け。

(2) 次の x の関数の導関数を定義から求めよ。

$$(1)x \quad (2)x^5 \quad (3)\frac{1}{x} \quad (4)\frac{1}{x^3} \quad (5)\log(x+a) \quad (6)\cos x \quad (7)b^x$$

解答 1:

(1) 関数 $f(x)$ の導関数の定義式

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(2) 各関数の導関数

(1) $f(x) = x$ のとき

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

(2) $f(x) = x^5$ のとき

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^5 - x^5}{h}$$

二項定理を用いて $(x+h)^5 = x^5 + 5x^4h + 10x^3h^2 + 10x^2h^3 + 5xh^4 + h^5$ より

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{5x^4h + 10x^3h^2 + 10x^2h^3 + 5xh^4 + h^5}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (5x^4 + 10x^3h + 10x^2h^2 + 5xh^3 + h^4) \\ &= 5x^4 \end{aligned}$$

(3) $f(x) = \frac{1}{x}$ のとき

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x - (x+h)}{hx(x+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{hx(x+h)} = -\frac{1}{x^2}$$

(4) $f(x) = \frac{1}{x^3} = x^{-3}$ のとき

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{(x+h)^3} - \frac{1}{x^3}}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 - (x+h)^3}{hx^3(x+h)^3} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 - (x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3)}{hx^3(x+h)^3} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3x^2h - 3xh^2 - h^3}{hx^3(x+h)^3} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3x^2 - 3xh - h^2}{x^3(x+h)^3} \\
&= \frac{-3x^2}{x^3 \cdot x^3} = -3 \frac{x^2}{x^6} = -\frac{3}{x^4}
\end{aligned}$$

(5) $f(x) = \log(x+a)$ のとき

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log(x+h+a) - \log(x+a)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log\left(\frac{x+h+a}{x+a}\right)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x+a}\right)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x+a}\right) \cdot \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x+a}\right)}{\frac{h}{x+a}} \\
&= \frac{1}{x+a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log\left(1 + \frac{h}{x+a}\right)}{\frac{h}{x+a}} \\
&= \frac{1}{x+a} \cdot 1 = \frac{1}{x+a}
\end{aligned}$$

(6) $f(x) = \cos x$ のとき

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(\frac{x+h+x}{2}\right) \sin\left(\frac{x+h-x}{2}\right)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} \\
&= - \lim_{h \rightarrow 0} \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} \\
&= - \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} \\
&= - \sin x \cdot 1 = - \sin x
\end{aligned}$$

(7) $f(x) = b^x$ のとき

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^{x+h} - b^x}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^x b^h - b^x}{h} \\
&= b^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} \\
&= b^x \log b
\end{aligned}$$

ここで $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} = \log b$ を用いた。

実際に、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} = \log b$ であることを示すと： $b^h = e^{h \log b}$ なので、

$$\begin{aligned}
\lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h \log b} - 1}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h \log b} - 1}{h \log b} \cdot \log b \\
&= \log b \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h \log b} - 1}{h \log b}
\end{aligned}$$

$t = h \log b$ とおくと、 $h \rightarrow 0$ のとき $t \rightarrow 0$ であり、

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{h \log b} - 1}{h \log b} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1$$

したがって、 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{b^h - 1}{h} = \log b \cdot 1 = \log b$

例題 2:

次の関数を x で微分しなさい。

$$(1)x^3 \quad (2)xe^x \quad (3)x \log x \quad (4)\sin x \quad (5)\cos x$$

$$(6)\tan x \quad (7)\log(3x^2 + 4) \quad (8)\log(\sin x)$$

解答 2:

$$(1) (x^3)' = 3x^2$$

$$(2) (xe^x)' \quad (\text{積の微分法})$$

$$(xe^x)' = (x)'e^x + x(e^x)' = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^{x(1+x)}$$

$$(3) (x \log x)' \quad (\text{積の微分法})$$

$$(x \log x)' = (x)' \log x + x(\log x)' = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1$$

$$(4) (\sin x)' = \cos x$$

$$(5) (\cos x)' = -\sin x$$

$$(6) (\tan x)'$$

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \left(\sin \frac{x}{\cos} \right)' \\ &= \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{(\cos x)^2} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} \\ &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ &= \sec^2 x \end{aligned}$$

$$(7) (\log(3x^2 + 4))' \quad (\text{合成関数の微分法})$$

$$(\log(3x^2 + 4))' = \frac{1}{3x^2 + 4} \cdot (3x^2 + 4)' = \frac{1}{3x^2 + 4} \cdot 6x = \frac{6x}{3x^2 + 4}$$

$$(8) (\log(\sin x))' \quad (\text{合成関数の微分法})$$

$$(\log(\sin x))' = \frac{1}{\sin x} \cdot (\sin x)' = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$

例題 3:

次の関数を x について積分せよ。

$$(1) \frac{1}{3x+2} \quad (2) \log x \quad (3) xe^x \quad (4) \tan x \quad (5) \frac{6x}{3x^2+4} \quad (6) \frac{\cos x}{\sin x} \quad (7) \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$$

解答 3:

$$(1) \int \frac{1}{3x+2} dx$$

$u = 3x + 2$ とおくと、 $du = 3 dx$ より $dx = \frac{1}{3} du$

$$\int \frac{1}{3x+2} dx = \int \frac{1}{u} \cdot \frac{1}{3} du = \frac{1}{3} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{3} \log|u| + C = \frac{1}{3} \log|3x+2| + C$$

$$(2) \int \log x dx \quad (\text{部分積分を使用})$$

$\int \log x \cdot 1 dx$ において、 $\log x$ を微分し、 1 を積分する

$$\begin{aligned} \int \log x dx &= \log x \cdot x - \int (\log x)' \cdot x dx \\ &= x \log x - \int \frac{1}{x} \cdot x dx \\ &= x \log x - \int 1 dx \\ &= x \log x - x + C \end{aligned}$$

$$(3) \int xe^x dx \quad (\text{部分積分を使用})$$

$\int x \cdot e^x dx$ において、 x を微分し、 e^x を積分する

$$\begin{aligned} \int xe^x dx &= x \cdot e^x - \int (x)' \cdot e^x dx \\ &= xe^x - \int 1 \cdot e^x dx \\ &= xe^x - e^x + C \\ &= e^{x(x-1)} + C \end{aligned}$$

$$(4) \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$$

$(\cos x)' = -\sin x$ を用いて、

$$\begin{aligned}\int \frac{\sin x}{\cos x} dx &= - \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ &= -\log|\cos x| + C \\ &= \log|\sec x| + C\end{aligned}$$

(5) $\int \frac{6x}{3x^2+4} dx$ (分子が分母の微分)

$(3x^2 + 4)' = 6x$ であることを利用して、

$$\int \frac{6x}{3x^2 + 4} dx = \int \frac{(3x^2 + 4)'}{3x^2 + 4} dx = \log|3x^2 + 4| + C$$

(6) $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$

$(\sin x)' = \cos x$ であることを利用して、

$$\int \frac{\cos x}{\sin x} dx = \int \frac{(\sin x)'}{\sin x} dx = \log|\sin x| + C$$

(7) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx$ (標準形の逆三角関数)

これは逆三角関数の標準形である。 $x = a \sin \theta$ の置換を用いると： $dx = a \cos \theta d\theta$, $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx &= \int \frac{1}{a \cos \theta} \cdot a \cos \theta d\theta \\ &= \int d\theta = \theta + C \\ &= \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + C\end{aligned}$$

