高階の微分方程式

数理工学 第 11 回

小林 健 / Ken Kobayashi

東京科学大 工学院 経営工学系

2026 年 11 月 09 日 (最終更新日: 2026 年 11 月 10 日)

授業で扱う微分方程式のトピック

1 階微分方程式

- 変数分離形
- 同次形
- 1 階線形微分方程式 (斉次，非斉次)
- Bernoulli 型の微分方程式

高階微分方程式 $\rightsquigarrow$ 今回

- **(特殊な) 2 階微分方程式**
- **高階線形微分方程式**

ラプラス変換を用いた解法

目次

❶ (階数が下げられる) 2 階微分方程式の解法

❷ 高階線形微分方程式の解法

目次

❶ (階数が下げられる) 2 階微分方程式の解法

❷ 高階線形微分方程式の解法

2 階微分方程式

2 階微分方程式の一般形

x を独立変数とする未知関数 $y \equiv y(x)$ が満たす 2 階微分方程式は, ある関数 F を用いて

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0$$

と書ける.

ここでは 2 階微分方程式のうち，微分方程式の階数が下げられる

- 未知関数が現れない場合
- 独立変数が現れない場合

それぞれの解法を見る.

1 階の微分方程式に帰着できる場合 (未知関数が現れない場合)

一般形: $F\left(x, y, \dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}\right) = 0$

ケースその 1: 未知関数 y が F の引数に現れない場合

$$F\left(x, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0 \tag{1}$$

- $z = \dfrac{dy}{dx}$ とおくと, $\dfrac{dz}{dx} = \dfrac{d^2y}{dx^2}$.
- これを方程式 (1) に代入すると

$$F\left(x, z, \frac{dz}{dx}\right) = 0$$

  となり, これは x を独立変数，z を未知関数とした 1 階の微分方程式.
- よって一般解 $z(x)$ を求めたあと，$z(x) = \dfrac{dy}{dx}$ を解けば一般解 $y(x)$ が求まる.

1 階の微分方程式に帰着できる場合 (独立変数が現れない場合)

一般形: $F\left(x, y, \dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}\right) = 0$

ケースその 2: 独立変数 x が F の引数に現れない場合

$$F\left(y, \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}\right) = 0 \tag{2}$$

- $\boxed{z = \dfrac{dy}{dx}}$ とおくと, 合成関数の微分より $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{dz}{dx} = \left(\dfrac{dz}{dy}\right)\left(\dfrac{dy}{dx}\right) = z\dfrac{dz}{dy}$.
- これを方程式 (2) に代入すると

  $$F\left(y, z, z\frac{dz}{dy}\right) = 0$$

  となり, これは y を独立変数, z を未知関数とする 1 階の微分方程式.
- よって，一般解 $z(y)$ を求めたあと，$z(y) = \dfrac{dy}{dx}$ を解けば一般解 $y(x)$ が求まる.

例題 (未知関数が現れない場合)

次の 2 階微分方程式を解け:

$$x\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = 0. \tag{3}$$

- $z = \dfrac{dy}{dx}$ とおくと, $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{dz}{dx}$.
- よってこれらを方程式 (3) に代入すると

$$x\frac{dz}{dx} + z = 0 \tag{4}$$

  となり, これは z を未知関数とする 1 階の微分方程式である.

- 式 (4) は変数分離形であり，式を整理すると

$$\frac{1}{z}\frac{dz}{dx} = -\frac{1}{x}.$$

- よって両辺の不定積分を求めると, 方程式 (4) の一般解は

$$\log|z| = -\log|x| + C_1 \quad (C_1 : \text{任意定数})$$

すなわち $z = \dfrac{C_1}{x}$ (C_1 : 任意定数) となる.

- したがって, 元の方程式 (3) の一般解を求めるには，

$$\frac{dy}{dx} = \frac{C_1}{x}$$

を解けばよく，両辺を積分すれば

$$y = C_1 \log|x| + C_2 \quad (C_1, C_2 : \text{任意定数})$$

と一般解が求まる.

微分方程式の階数と任意定数の個数の関係

- 2 階の微分方程式の一般解には 2 個の任意定数が現れる.
- 一般に n 階の微分方程式の一般解には n 個の任意定数が現れる.

例題 (独立変数が現れない場合)

次の 2 階微分方程式を解け:

$$y\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)+\left(\frac{dy}{dx}\right)^2+1=0. \tag{5}$$

- $z=\dfrac{dy}{dx}$ とおくと, $\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{dz}{dx}=z\dfrac{dz}{dy}$ であり, これらを方程式 (5) に代入すると

$$yz\left(\frac{dz}{dy}\right)+z^2+1=0.$$

- 式を整理して

$$\frac{dz}{dy}=-\frac{z^2+1}{z}\cdot\frac{1}{y} \tag{6}$$

- これは y を独立変数とした変数分離形の微分方程式であり, その一般解は

$$\int\frac{z}{z^2+1}dz=-\int\frac{1}{y}dy+C_1 \quad (C_1:\text{任意定数})$$

を満たす.

- 両辺の不定積分を計算して

$$\frac{1}{2}\log|z^2+1| = -\log|y| + C_1 \quad (C_1 : \text{任意定数})$$

- よって，z に関する一般解は

$$z^2 + 1 = \frac{C_1^2}{y^2} \quad (C_1 : \text{任意定数}) \tag{7}$$

を満たす．

- $z = \dfrac{dy}{dx}$ であることを思い出すと，式 (7) から y に関する 1 階の微分方程式

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 1 = \frac{C_1^2}{y^2} \quad (C_1 : \text{任意定数})$$

すなわち

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{\frac{C_1^2}{y^2} - 1} = \pm\frac{\sqrt{C_1^2 - y^2}}{y}.$$

を得る．

- これは変数分離形であり, その一般解は

$$\pm \int \frac{y}{\sqrt{C_1^2 - y^2}} dy = \int 1 dx + C_2 \quad (C_2 : \text{任意定数})$$

を満たす.

- 両辺の不定積分を計算して，最終的に求める一般解は

$$\mp \sqrt{C_1^2 - y^2} = x + C_2 \quad (C_1, C_2 : \text{任意定数})$$

すなわち

$$y^2 + (x + C_2)^2 = C_1^2 \quad (C_1, C_2 : \text{任意定数})$$

と求まる (陰関数表示).

目次

❶ (階数が下げられる) 2 階微分方程式の解法

❷ 高階線形微分方程式の解法

n 階線形微分方程式

高階線形微分方程式の一般形

未知関数 $y \equiv y(x)$ に関する n 階の導関数に関する微分方程式

$$\frac{d^n y}{dx^n} + P_{n-1}(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + P_1(x)\frac{dy}{dx} + P_0(x)y = Q(x)$$

と書ける微分方程式を n 階線形微分方程式という.

- 未知関数とその導関数に関して線形な微分方程式
- $Q(x) \equiv 0$ の場合は**斉次**, そうでない場合は**非斉次**と呼ぶ.

ここで考えること

- 係数関数 $P_0(x), P_1(x), \ldots, P_{n-1}(x)$ がすべて定数の場合の斉次線形微分方程式

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy}{dx} + a_0 y = 0$$

  の解き方.

2 階斉次線形微分方程式の解法

(定数係数) 2 階斉次線形微分方程式

$$\frac{d^2y}{dx^2} + a_1\frac{dy}{dx} + a_0 y = 0 \tag{8}$$

方針

- (天下り的だが) この微分方程式の解が $\boxed{y(x) = e^{\lambda x}}$ (λ: 定数) と表されるものとする.
- このとき $\dfrac{dy}{dx} = \lambda e^{\lambda x}$, $\dfrac{d^2y}{dx^2} = \lambda^2 e^{\lambda x}$ であり, これを式 (8) に代入すると
$$(\lambda^2 + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda x} = 0.$$
- よって λ が次の 2 次方程式
$$\lambda^2 + a_1\lambda + a_0 = 0 \tag{9}$$
の根ならば, $e^{\lambda x}$ は方程式 (8) の特殊解 (式 (9) を特性方程式とよぶ).

特性方程式を用いた解の導出

特性方程式 (9) の (複素数を含む) 根を λ_1, λ_2 とする.

$\lambda_1 \neq \lambda_2$ のとき

- このとき,

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x}, \quad y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$$

は共に方程式 (8) の特殊解であり，1 次独立である．

- 実はこの場合，方程式 (8) の一般解は $y_1(x), y_2(x)$ の線形結合として

$$\begin{aligned} y(x) &= C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \\ &= C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} \quad (C_1, C_2 : \text{任意定数}) \end{aligned}$$

と表せる．

微分方程式 (8) の一般解は, 2 つの 1 次独立な特殊解の線形結合で表される.

$\lambda_1 = \lambda_2$ のとき

- このとき $e^{\lambda_1 x} = e^{\lambda_2 x}$ であり, 特殊解は一つしか見つからない.
- 実はこの場合, $y_1(x) = e^{\lambda_1 x}$ に加えて,

$$y_2(x) = xe^{\lambda_1 x}$$

が方程式 (8) の特殊解であり (以降の例で確認する), $y_1(x), y_2(x)$ は 1 次独立である.

- よって 方程式 (8) の一般解は $y_1(x), y_2(x)$ の線形結合として

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 x e^{\lambda_1 x} \quad (C_1, C_2 : \text{任意定数})$$

と表せる.

重複度 2 の根 λ_1 に対して $e^{\lambda_1 x}$ と $xe^{\lambda_1 x}$ は共に微分方程式 (8) の (1 次独立な) 特殊解.

例題

次の 2 階斉次線形微分方程式を解け:

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 4y = 0. \tag{10}$$

- 微分方程式 (10) の特性方程式は $\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0$ であり, その根は $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$.
- よって $\boxed{y_1 = e^{2x}}$ と $\boxed{y_2 = xe^{2x}}$ はともに斉次方程式 (10) の解である.
- 実際, $y_2 = xe^{2x}$ を式 (10) の左辺に代入すると

$$\begin{aligned}
(\text{左辺}) &= \underline{\left(xe^{2x}\right)''} - 4\underline{\left(xe^{2x}\right)'} + 4\left(xe^{2x}\right) \\
&= \underline{\left(2e^{2x} + 2\left(e^{2x} + 2xe^{2x}\right)\right)} - 4\underline{\left(e^{2x} + 2xe^{2x}\right)} + 4\left(xe^{2x}\right) \\
&= 4\left(e^{2x} + xe^{2x}\right) - 4\left(e^{2x} + 2xe^{2x}\right) + 4\left(xe^{2x}\right) = 0.
\end{aligned}$$

- したがって方程式 (10) の一般解は e^{2x} と xe^{2x} の線形結合として次のように書ける:

$$y(x) = C_1e^{2x} + C_2xe^{2x} \quad (C_1, C_2 : \text{任意定数}).$$

例題 (単振動の運動方程式)

$m > 0$, $k > 0$ を定数とした $y(t)$ に関する微分方程式を解け:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -ky. \tag{11}$$

- $\omega := \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ とおくと，式 (11) は

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0 \tag{12}$$

と書けるので，これは 2 階斉次線形微分方程式である．

- 微分方程式 (12) の特性方程式は $\lambda^2 + \omega^2 = 0$ であり，その根は $\lambda_1 = \omega i$, $\lambda_2 = -\omega i$．
- よって $\boxed{y_1 = e^{\omega it}}$ と $\boxed{y_2 = e^{-\omega it}}$ はともに式 (12) の解であり，その線形結合

$$y(t) = C_1 e^{\omega it} + C_2 e^{-\omega it} \quad (C_1, C_2\text{: 任意定数})$$

が一般解である．

$\rightsquigarrow$ 虚数を含む式をもう少し整理する．

- オイラーの公式 $\boxed{e^{\alpha+\beta i} = e^{\alpha}(\cos\beta + i\sin\beta)}$ を用いると，一般解 y は

$$\begin{aligned} y(t) &= C_1 e^{\omega i t} + C_2 e^{-\omega i t} \\ &= C_1(\cos\omega t + i\sin\omega t) + C_2(\cos\omega t - i\sin\omega t) \\ &= (C_1 + C_2)\cos\omega t + i(C_1 - C_2)\sin\omega t \\ &= C_1\cos\omega t + C_2\sin\omega t \quad (C_1, C_2\text{: 適当に置き換えた任意定数}) \end{aligned}$$

と書き直せる．

- $\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ を戻すと，求める一般解は

$$y(t) = C_1\cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t\right) + C_2\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t\right)$$

である．

$\rightsquigarrow$ **単振動の解が求められた**


興味ある人向けの例題

速度に比例する抵抗力を受ける運動方程式

- 質量 m の物体がばねに繋がれているとする．
- 時刻 t における物体の変位を $y(t)$ とし，物体には次の力が水平方向に働く:

  ばねの復元力: $-m\omega^2 y$ $(\omega > 0)$,

  物体の速度に比例する抵抗力: $-2m\phi \dfrac{dy}{dt}$ $(\phi > 0)$
- この物体の運動方程式を $y(t)$ に関する微分方程式として表し，一般解を求めよ.



ヒント (1) $\phi = \omega$, (2) $\phi > \omega$，(3) $\phi < \omega$ の 3 つに場合分けして一般解を求める．

運動方程式の解の様子

初期条件を $y(0) = 1$, $\dfrac{dy}{dt}(0) = 0$ としたときの特殊解の様子:




Figure: $\phi = 2$, $\omega = 1$ の場合




Figure: $\phi = 1$, $\omega = 5$ の場合

n 階斉次線形微分方程式の解法

(定数係数) n 階斉次線形微分方程式

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy}{dx} + a_0 y = 0 \tag{13}$$

- この微分方程式の特性方程式は

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0.$$

特性方程式が n 個の相異なる根 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ をもつとき (重根をもたない場合)

- このとき $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \ldots, e^{\lambda_n x}$ はすべて斉次方程式 (13) の解.
- これら n 個の解の線形結合

$$y(x) = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + C_n e^{\lambda_n x} \quad (C_1, C_2, \ldots, C_n : \text{任意定数})$$

が斉次方程式 (13) の一般解である.

特性方程式が重根をもつ場合

- 相異なる ℓ 個の根 λ_i $(i = 1, 2, \ldots, \ell)$ (ただし $\ell \leq n$) それぞれに対し，
  その重複度 m_i に対応する個数の特殊解

$$e^{\lambda_i x}, \quad x e^{\lambda_i x}, \quad x^2 e^{\lambda_i x}, \ldots, x^{m_i - 1} e^{\lambda_i x}$$

  が存在する．

- すべての根 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_l$ に対する上記の解を集めると，
  合計で n 個の特殊解 $y_1, y_2, \ldots, y_n$ が得られ，それらは 1 次独立．

- よって $y_1, y_2, \ldots, y_n$ の線形結合

$$y(x) = C_1 y_1 + C_2 y_2 + \cdots + C_n y_n \quad (C_1, C_2, \ldots, C_n : \text{任意定数})$$

  が斉次方程式 (13) の一般解である．

特性方程式を用いた一般解

- 相異なる ℓ 個の根を $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_\ell$ (ただし $\ell \leq n$).
  それぞれの重複度を $m_1, m_2, \ldots, m_\ell$ とする ($m_1 + m_2 + \cdots + m_\ell = n$).
- このとき,

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \ldots, x^{m_1-1}e^{\lambda_1 x} & (m_1\text{個}) \\ e^{\lambda_2 x}, xe^{\lambda_2 x}, \ldots, x^{m_2-1}e^{\lambda_2 x} & (m_2\text{個}) \\ \qquad\qquad \cdots & \\ e^{\lambda_\ell x}, xe^{\lambda_\ell x}, \ldots, x^{m_\ell-1}e^{\lambda_\ell x} & (m_\ell\text{個}) \end{cases} \qquad (m_1 + m_2 + \cdots + m_\ell = n)$$

  はすべて斉次方程式 (13) の解であり, これら n 個の解の線形結合が一般解である.

例題

次の 3 階斉次線形微分方程式を特性方程式を用いて解け:

$$\frac{d^3y}{dx^3} - \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + y = 0. \tag{14}$$

- 微分方程式 (14) の特性方程式は

$$\lambda^3 - \lambda^2 - \lambda + 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (\lambda + 1)(\lambda - 1)^2 = 0.$$

- よって特性方程式の根は $\lambda_1 = -1$ (重複度 1), $\lambda_2 = 1$ (重複度 2).
- したがって e^{-x}, e^{x}, xe^{x} は方程式 (14) の解である.
- 以上より，方程式 (14) の一般解は e^{-x}, e^{x}, xe^{x} の線形結合

$$y(x) = C_1e^{-x} + C_2e^{x} + C_3xe^{x} \quad (C_1, C_2, C_3 : \text{任意定数})$$

と表される.

まとめ

講義の振り返り

- 階数が下げられる 2 階微分方程式の解法
  (未知関数が現れない場合，独立変数が現れない場合)
- 定数係数の n 階斉次線形微分方程式に対する特性方程式を用いた解法

自宅での復習

- 2 階微分方程式で，階数を下げる変数変換の流れと計算を復習する．
- 特性方程式に基づく解き方の流れを復習する (特に特性方程式が重根をもつ場合)