固有値・固有ベクトル

数理工学 第 5 回

小林 健/ Ken Kobayashi

東京科学大 工学院 経営工学系

2026 年 10 月 19 日 (最終更新日: 2026 年 10 月 18 日)

目次

❶ 固有値・固有ベクトルの定義と性質

❷ 行列の対角化

目次

❶ 固有値・固有ベクトルの定義と性質

❷ 行列の対角化

固有値・固有ベクトル

定義 (固有値・固有ベクトル)

n 次正方行列 A に対して,

$$A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$$

を満たすスカラー λ と非ゼロベクトル $\boldsymbol{x}$ $(\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0})$ が存在するとき, λ を A の**固有値 (eigenvalue)**, $\boldsymbol{x}$ を固有値 λ に対応する**固有ベクトル (eigenvector)** という.

例 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ とする. このとき

$$A\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2\boldsymbol{x}$$

したがって 2 は A の固有値であり, $\boldsymbol{x}$ は固有値 2 に対応する固有ベクトルである.

固有多項式と固有方程式

- n 次正方行列 A に対して, $A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \iff (\lambda I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ より,

$$\begin{aligned} \lambda \text{ が} A\text{の固有値} &\iff \text{線形方程式系 } (\lambda I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \text{ が非ゼロベクトルの解を持つ} \\ &\iff \det(\lambda I - A) = 0. \end{aligned}$$

定義 (固有多項式, 固有方程式)

- $f_A(\lambda) := \det(\lambda I - A)$ を A の**固有多項式 (characteristic polynomial)**,
- $f_A(\lambda) = 0$ を A の**固有方程式 (characteristic equation)** という.

$\rightsquigarrow$ **固有値は固有方程式の根**

固有方程式は n 次方程式であるため, 代数学の基本定理から次がいえる:

定理 (固有値の個数は正方行列のサイズと一致)

複素数の範囲で考えたとき, n 次正方行列 A は重複を許して n 個の固有値をもつ.

固有値·固有ベクトルに関する注意点

注意

- 正方行列 A が実行列であっても, 固有値は実数であるとは限らない.
- 同様に, 固有ベクトルも実ベクトルであるとは限らない.

例 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ とする. このとき, 固有方程式は

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0.$$

- よって A の固有値は $\pm i$ であり, 実数ではない.
- $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ とすると, $A\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = i \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = i\boldsymbol{x}$.
- よって $\boldsymbol{x}$ は固有値 i に対応する固有ベクトルであるが, 実ベクトルではない.

固有空間

固有ベクトルの注意点 一つの固有値に対応する固有ベクトルは無数に存在

- n 次正方行列 A の固有値を λ, 対応する固有ベクトルを $\boldsymbol{x}$ とする
- このとき, $\boldsymbol{x}$ のスカラー倍 $\alpha\boldsymbol{x}$ $(\alpha \neq 0)$ に対して

$$(\lambda I - A)(\alpha\boldsymbol{x}) = \alpha(\lambda I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

- よって $\alpha\boldsymbol{x}$ も固有ベクトル.

定義 (固有空間)

正方行列 A の固有値 λ に対して，次のように定義される集合

$$W(\lambda) \coloneqq \{\boldsymbol{x} \mid (\lambda I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}\}$$

を固有値 λ に対応する**固有空間 (eigenspace)** という.

- 固有空間は固有ベクトル全体の集合にゼロベクトルを加えた集合
- 以後「固有ベクトル」というときは, ゼロベクトル以外の固有空間上のベクトルを指す.

固有空間の性質

固有空間の性質: 固有空間は和とスカラー倍に関して閉じた部分空間

固有空間 $W(\lambda)$ は部分空間である.

スカラー倍に関して閉じていること

- 前のページと同様の議論で示せるので省略.

和に関して閉じていること

- 任意の $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in W(\lambda)$ に対し,

$$A(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}) = A\boldsymbol{x} + A\boldsymbol{y} = \lambda\boldsymbol{x} + \lambda\boldsymbol{y} = \lambda(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}).$$

- よって $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y} \in W(\lambda)$ であり, 和に関して閉じている.

固有値の重要な性質

定理 (固有値の総積, 総和はそれぞれ行列式, トレースに等しい)

n 次正方行列 A の固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ とすると, 次が成立:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i, \quad \operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i.$$

証明の概略 (完全な証明は省略)

- $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ は固有方程式の根であるため, 固有多項式は次のように因数分解できる:

$$\det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) \tag{1}$$

- 式 (1) は λ に関する恒等式であり, 両辺の定数項と λ^{n-1} の係数を比較すると

$$\text{[定数項]} \ \det(-A) = (-1)^n \prod_{i=1}^{n} \lambda_i \qquad [\lambda^{n-1} \text{ の係数}] \ -\operatorname{tr}(A) = -\sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

  となって所望の等式を得る.

- $\det(\lambda I - A)$ の係数の計算には余因子展開を使う. □

例題


$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & -3 \\ 6 & -1 & 6 \\ 6 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ の固有値と固有空間を求めよ．

- サラスの公式で固有多項式を計算すると

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda+4 & 0 & 3 \\ -6 & \lambda+1 & -6 \\ -6 & 0 & \lambda-5 \end{vmatrix} \\ &= (\lambda+4)(\lambda+1)(\lambda-5) + 18(\lambda+1) \\ &= (\lambda+1)(\lambda^2-\lambda-2) \\ &= (\lambda+1)^2(\lambda-2). \end{aligned}$$

- よって，A の固有値は 2, -1 (重複度 2).

サラスの公式



$$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{32}a_{21} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{12}a_{21}a_{33}$$

- 1 つ目の固有値に対応する固有空間

$$
\begin{aligned}
W(2) &= \{\boldsymbol{x} \mid (2I - A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{pmatrix} 6 & 0 & 3 \\ -6 & 3 & -6 \\ -6 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\
&= \left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \;\middle|\; s \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\rangle.
\end{aligned}
$$

注意: 基底のとり方は一意ではない

- 2 つ目の固有値に対応する固有空間

$$
\begin{aligned}
W(-1) &= \{\boldsymbol{x} \mid (-I-A)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ -6 & 0 & -6 \\ -6 & 0 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \right\} \\
&= \left\{ s \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; s, t \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle.
\end{aligned}
$$

目次

❶ 固有値・固有ベクトルの定義と性質

❷ 行列の対角化

対角行列とその利点

対角成分以外の成分がすべてゼロの行列を**対角行列 (diagonal matrix)** という.

$$D = \begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}$$

対角行列の性質

- 対角行列 D の固有値は対角成分 $d_{11}, d_{22}, \ldots, d_{nn}$ と等しい.
- 対角行列 D の k 乗は, 対角成分を k 乗した対角行列である (積の計算が簡単):

$$D^k = \begin{pmatrix} d_{11}^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22}^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn}^k \end{pmatrix}.$$

相似な行列

定義 (相似な行列)

n 次正方行列 A, B に対してある正則行列 P が存在し,

$$B = P^{-1}AP$$

が成り立つとき, A と B は**相似 (similar)** な行列という.

定理 (相似な行列の固有値)

相似な行列 A, B の固有値は一致する.

証明 $B = P^{-1}AP$ を満たす正則行列 P をとる. このとき,

$$f_B(\lambda) = \det(\lambda I - \underbrace{P^{-1}AP}_{=B}) = \det\Big(P^{-1}(\lambda I - A)P\Big)$$

$$= \det\Big(P^{-1}\Big)\det(\lambda I - A)\det(P) = \det(\lambda I - A) = f_A(\lambda).$$

よって A と B の固有多項式は一致し, 固有値も同様に一致する.

対角化可能

定義 (対角化可能)

n 次正方行列 A が対角行列と相似なとき, すなわちある正則行列 P と対角行列 D が存在して $A = P^{-1}DP$ が成り立つとき, A は**対角化可能 (diagonalizable)** という.

対角化可能な行列の利点

- A が対角化可能なとき, 相似な行列の性質から

$$(A\text{の固有値}) = (D\text{の固有値}) = (D\text{の対角成分}).$$

- A の k 乗は

$$\begin{aligned} A^k &= \overbrace{(P^{-1}DP)(P^{-1}DP)\cdots(P^{-1}DP)(P^{-1}DP)}^{k\text{ 個}} \\ &= P^{-1}D^kP \end{aligned}$$

となり, D^k を用いて簡単に計算できる.

🤔 **対角化可能な行列はどのような行列か?**

定理 (対角化可能な必要十分条件)

n 次正方行列 A に対して次が成り立つ：

$$A \text{ が対角化可能} \iff A \text{ が } n \text{ 個の線形独立な固有ベクトルをもつ.}$$

ポイント この定理は必要十分条件を与えているので，次も成り立つ:

$$A \text{ が対角化可能でない} \iff n \text{ 個の線形独立な固有ベクトルがとれない}$$

$\rightsquigarrow$ **対角化できないことの判定にも使える**

証明 (n 個の固有ベクトルが線形独立) $\Rightarrow$ (対角化可能) を示す.

- $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ を A の線形独立な固有ベクトル, それぞれに対応する固有値を $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ とする. (すなわち $A\boldsymbol{v}_i = \lambda_i \boldsymbol{v}_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$)
- $P = (\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ とすると, P は正則行列である.

- また AP を計算すると

$$AP = A(\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n) = (A\boldsymbol{v}_1, A\boldsymbol{v}_2, \ldots, A\boldsymbol{v}_n)$$

$$= (\lambda_1\boldsymbol{v}_1, \lambda_2\boldsymbol{v}_2, \ldots, \lambda_n\boldsymbol{v}_n) = \underbrace{(\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n)}_{P} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

- 上の両辺に P^{-1} を左から掛けると,

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

- よって A が n 個の線形独立な固有ベクトルをもつとき，A は対角化可能.

(対角化可能) $\Rightarrow$ (n 個の固有ベクトルが線形独立) を示す.

- A が対角化可能なとき,

$$P^{-1}AP = \underbrace{\begin{pmatrix} d_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_{nn} \end{pmatrix}}_{D\text{とおく}} \tag{2}$$

  を満たす正則行列 P と対角行列 D が存在する.

- $P = (\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n)$ とすると, P の正則性から $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ は線形独立である.
- 式 (2) の両辺に P を左から掛けると,

$$AP = PD.$$

- ここで

$$\begin{aligned} AP &= A(\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n) \\ &= (A\boldsymbol{v}_1, A\boldsymbol{v}_2, \ldots, A\boldsymbol{v}_n), \\ PD &= (d_{11}\boldsymbol{v}_1, d_{22}\boldsymbol{v}_2, \ldots, d_{nn}\boldsymbol{v}_n) \end{aligned}$$

  であるから，$AP = PD$ より

$$A\boldsymbol{v}_1 = d_{11}\boldsymbol{v}_1, \quad A\boldsymbol{v}_2 = d_{22}\boldsymbol{v}_2, \quad \ldots, \quad A\boldsymbol{v}_n = d_{nn}\boldsymbol{v}_n.$$

  よって $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ は A の固有ベクトルである．

- 以上より，A が対角化可能のとき，A は n 個の線形独立な固有ベクトルをもつ． □

対角化における固有値と固有ベクトル

これまでに示した結果から次の系を得る：

系 (対角化に現れる行列と固有値･固有ベクトルの関係)

n 次正方行列 A が正則行列 $P = (\boldsymbol{p}_1, \boldsymbol{p}_2, \ldots, \boldsymbol{p}_n)$ を用いて

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

と対角化されているとする. このとき次が成り立つ:

- 対角成分 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ は A の固有値である.
- $\boldsymbol{p}_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ は固有値 λ_i に対応する A の固有ベクトルである.

固有ベクトルが線形独立になる十分条件

- 一般に n 次正方行列が n 個の線形独立な固有ベクトルを持つとは限らない.
- 次の命題は, 固有ベクトルが線形独立であることの十分条件を与える.

定理 (固有ベクトルが線形独立である十分条件)

n 次正方行列 A の相異なる s 個の固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_s$ に対応する固有ベクトルは線形独立である.

証明 s に関する帰納法で示す.

- 相異なる $s-1$ 個の固有値 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{s-1}$ に対応する固有ベクトル $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_{s-1}$ が線形独立と仮定.
- $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{s-1}$ いずれとも異なる固有値を λ_s とし, 対応する固有ベクトルを $\boldsymbol{v}_s$ とする.

$\rightsquigarrow \boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_{s-1}, \boldsymbol{v}_s$ が線形独立であることを示す.

- $c_1, c_2, \ldots, c_s$ をスカラーとして, 次が成り立つと仮定する:

$$c_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_{s-1}\boldsymbol{v}_{s-1} + c_s\boldsymbol{v}_s = \boldsymbol{0}. \tag{3}$$

- 両辺に左から A を掛けて次を得る:

$$\begin{aligned} &c_1A\boldsymbol{v}_1 + c_2A\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_{s-1}A\boldsymbol{v}_{s-1} + c_sA\boldsymbol{v}_s \\ &= c_1\lambda_1\boldsymbol{v}_1 + c_2\lambda_2\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_{s-1}\lambda_{s-1}\boldsymbol{v}_{s-1} + c_s\lambda_s\boldsymbol{v}_s = \boldsymbol{0}. \end{aligned} \tag{4}$$

- 式 (4) − 式 (3) $\times\lambda_s$ を計算すると,

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_s)\boldsymbol{v}_1 + c_2(\lambda_2 - \lambda_s)\boldsymbol{v}_2 + \cdots + c_{s-1}(\lambda_{s-1} - \lambda_s)\boldsymbol{v}_{s-1} = \boldsymbol{0}$$

を得る.

- ここで $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_{s-1}$ は線形独立であるため，

$$c_1(\lambda_1 - \lambda_s) = c_2(\lambda_2 - \lambda_s) = \cdots = c_{s-1}(\lambda_{s-1} - \lambda_s) = 0.$$

- λ_s は $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{s-1}$ いずれとも異なるため，

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_{s-1} = 0.$$

- したがって，式 (3) から $c_s = 0$.
- 以上より，

$$\text{式 (3)} \quad \Longrightarrow \quad c_1 = c_2 = \cdots = c_{s-1} = c_s = 0.$$

が示され，$\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_{s-1}, \boldsymbol{v}_s$ が線形独立であるとわかる．□

対角化可能な行列の十分条件

これまでのまとめ

- n 次正方行列が対角化可能 $\Longleftrightarrow$ n 個の線形独立な固有ベクトルが存在
- 固有値が相異なる $\Longrightarrow$ それぞれに対応する固有ベクトルは線形独立

$\rightsquigarrow$ これらを組み合わせて, 対角化可能性の十分条件を得る.

定理 (対角化可能な行列の十分条件)

n 次正方行列 A の固有値がすべて異なるとき, A は対角化可能である.

- 行列が対角化可能であることの恩恵は「固有値・固有ベクトルの応用」で見る

まとめ

講義の振り返り

- 固有値･固有ベクトルの定義とその性質
- 相似な行列と対角化可能な行列
- 行列が対角化可能であるための条件 (必要十分条件と十分条件)

自宅での復習

- 固有値･固有ベクトルの定義を再確認する．
- サラスの公式，固有値･固有空間の基底を求める流れを確認する．
- 対角化可能性に関する証明の流れを確認する．