

CONTENIDO

26. Características botánicas, ecológicas y selvícolas de las principales angiospermas arbóreas españolas.	2
27. Pastos naturales españoles. Clasificación. Principales especies herbáceas. Principales sistemas de aprovechamiento.	20
28. La ganadería extensiva, su valor económico, ecológico y cultural. El catálogo Oficial de Razas de Ganado de España. Las vías pecuarias: la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. El libro blanco de la Trashumancia.	29
29. Recursos cinegéticos, piscícolas y astacícolas. Técnicas de caza y especies cinegéticas. Principales actividades piscícolas. Normativa, ordenación y planes. Normativa en materia de sanidad de la fauna silvestre y cinegética. Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. Estrategia Nacional de Gestión Cinegética.	35

26. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS, ECOLÓGICAS Y SELVÍCOLAS DE LAS PRINCIPALES ANGIOSPERMAS ARBÓREAS ESPAÑOLAS.

QUERCUS ILEX SSP BALLOTA (ROTUNDIFOLIA)

Altura: hasta los 25 m.

Longevidad: 700 años.

Floración en abril-mayo, **fruto** octubre-diciembre.

Altitud: 0 –2.000 msnm (300 -700). **Zona plana.**

Clima: 250-1.500 mm/año (1/3 verano). Muy Resistente sequía y oscilación de temperaturas.

Suelos: sin encharcamiento. Mal en compactos, margas, salinos o yesosos. No le importa que el suelo sea malo, pero sí que drene bien.

Sistema radical: potente y muy vivo, principal axonomorfa.

Crecimiento: lento (no la raíz, que se desarrolla mucho).

Id: las hojas presentan un dimorfismo entre haz y envés: el haz verde y el envés es blanquecino con pelosidad. Bellota grande. Hoja pinchuda en la carrasca (la ballota) y lanceolada en la ssp ilex.



Madera: 150 –200 años (1 –2 m³/ha/año)

Leña: 8 –12 años (0,4 -0,6 m³/ha/año) // **Taninos:** 12 –25 años

Bellota: 600 kg/ha/año.

Sociología: especie climática, forma masas puras. Se asocia con casi todas las coníferas y frondosas. Arbustivas acompañantes: *J. oxycedrus*, *Pistacia terebinthus*, *Arbutus unedo*, *Crateagus monogyna*, *Daphne gnidium*, *Jasminum fruticans*, *Retama sphaerocarpa*...



QUERCUS PYRENAICA (REBOLLO)

Altura: hasta los 30m.

Marcescente (no cae la hoja hasta que salga la nueva).

Longevidad: 300 -400 años.

Floración en Mayo-Junio, **fruto** Octubre-Noviembre.

Altitud: 400 –1.500 msnm (1.000 –1.200).

Clima: 400 –600 mm/año. Muy resistente sequía y frío. -16° / 40°.

Suelo: **Calcífuga**. Suelos permeables. Meseta y faldas de montaña.

Sistema radical: potente, principal potente + laterales extensas.

Crecimiento: medio rápido.

Id: hoja lobulada, con dimorfismo haz-envés (pelosidad blanquecina), bellotas en grupitos 3-4 pegadas por el peciolo.



Quercus pyrenaica
Galán, Gamarra & García (2000)



Madera: 100 –150 años (1 –2 m³/ha/año)

Leña: 8 –12 años // **Ramón:** 7 -15 años

Sociología: se mezcla con *Q. robur*, *Q. petraea*, *Q. faginea*, *Q. ilex*, *P. sylvestris*, *P. pinaster*.

Arbustivas acompañantes: *Cytisus scoparius*, *Crateagus monogyna*, *Erica scoparia*, *E. arborea*, *Cistus salvifolius*, *C. laurifolius*, *Lavandula pedunculata*...

QUERCUS FAGINEA (QUEJIGO)

Alturas: hasta los 25m. **Marcescence:** Longevidad: 200 –250.

Floración en Marzo-Abril, **fruto** Septiembre-Octubre.

Altitud: 550 –1.500 msnm, óptimo entre 550 –700 msnm. (sube un poco más que el rebollo pero tiene más necesidades hídricas).

Clima: 380 –1.200 mm/año. Resistente sequía. -12° / 39°.

Suelo: Xerófila. Prefiere suelos calizos. Meseta y faldas de montaña.

Sistema radical: potente, laterales extensas con renuevo.

Crecimiento: medio-rápido.

Id: porte torcido, hoja ligero envés blanquecino sin vellosidad, y borde en punta donde acaban nervios 2ºs. coloración pardo rojiza en las ramificaciones del año.



Madera: 130 –150 años (<0,2 m³/ha/año).

Sociología: se mezcla con *Q. ilex*, *Q. pyrenaica*, *Q. suber*, *J. thurifera*, *J. sabina*, *P. sylvestris*... En zonas de regresión aparecen matorrales como *Amelanchier vulgaris*, *Genista scorpius*, *Salvia lavandulifolia*, *Rhamnus sp.*, *Lavandula latifolia*, *Ononis fruticosa*, *Thymus vulgaris*, ...

QUERCUS PETRAEA

Altura: hasta los 40m. Ø puede ser > 2m. **Longevidad:** 200 –300.

Floración en Abril-Mayo, **fruto** Septiembre-Octubre (2-3 años).

Altitud: 400 –1,250 msnm. Exposición de umbría.

Clima: 600 –2,000 mm/año (>150 verano). Resiste frío. -30° / 20°.

Suelo: calizo suelto y profundo. Ladera y faldas de montaña.


Sistema radical: Pivotante profunda, laterales oblicuas y profundas.

Crecimiento: lento (joven) a medio.

Id: hoja verde. Peciolo largo con curva al final. Tb tiene una puntita en los nervios. En la inserción del limbo en peciolo tiene acanaladuras en forma de corazón simétricas. Bellotas amontonadas y pequeñas

Madera y leñas: 150 años (1,5 -7 m³/ha/año).

Sociología: Puede hibridar con otros robles. Se mezcla con *Fagus sylvatica*, *P. sylvestris*... y cuando aparece como climática se acompaña de tilos, arces, serbales, *Crataegus sp.*, *Amelanchier sp.*, *Corylus avellana*, etc.



QUERCUS SUBER (ALCORNOCQUE)

Altura: hasta los 15m. **Longevidad:** 500 años.

Floración en Abril-Mayo, **fruto** Septiembre-Febrero.

Altitud: 0 –1.000 msnm, óptimo entre 500 -600 msnm. Laderas y colinas.


Clima: 450-1.000 mm/año. Óptimo 600 mm. Termófila. Inviernos templados.

Suelo: Calcífugo. Suelo fresco, arenoso y húmedo.

Crecimiento: rápido y sostenido.

Corcho: 450 T/año (780 kg/ha/año).

Id: Corteza característica. Las hojas parecidas a la encina. Cúpula de la bellota con escamas formando una rugosidad.



Quercus suber
Galán, Gamarra & García (2000)



QUERCUS ROBUR (CARBALLO)

Alturas: hasta los 40m. Longevidad: 400 -500.

Floración en Marzo-Abril, **fruto** Septiembre-Octubre.

Altitud: 400 –800 msnm.


Clima: 600 –1.000 mm/año. Resistente al frío y sensible a heladas.

Suelo: Indiferente, escasea en calizas. Suelo profundo, fresco y húmedo.

Sistema radical: potente, resistente a encharcamiento temporal.

Crecimiento: medio-rápido.

Id: hoja grande flexible con el peciolo insertado en el limbo. Es la única especie que tiene ese pedazo peciolo para la bellota.



Quercus robur
Galán, Gamarra & García (2000)



QUERCUS COCCIFERA (COSCOJA)

Alturas: hasta los 3m. **Longevidad:** 100–200 años

Altitud: 0–1.200 msnm.

Clima: 400–600mm/año. Resistente sequía nato.

Suelo: Xerófila. Entornos degradados, pedregosos, etc. Donde no llega otro roble.

Sistema radical: potente, laterales extensas.

Crecimiento: lento.

Id: hojas verdes brillante ambos lados, pequeña y pinchudas. El borde del limbo es un poquito más claro. La bellota tiene una cúpula con escamas como erizo (la única con esta característica).



QUERCUS CANARIENSIS (QUEJIGO ANDALUZ)

Alturas: hasta los 30m. **Longevidad:** 250 años.

Floración en Abril-mayo, **fruto** Octubre-noviembre.

Altitud: 0–400 (1.000) msnm.



Clima: 200–600mm/año. No soporta heladas.

Suelo: Xerófila. Prefiere suelos calizos. Meseta y faldas de montaña.

Sistema radical: potente, profundo y desarrollado.

Crecimiento: medio-rápido.

Id: la hoja tiene forma de cometa. Verde clarito. Cúpula bellota con vellosidad.



FAGUS SYLVATICA (HAYA)

Altura: hasta los 40 m. Ø hasta 3 m. **Marcescence.**

Floración en Abril-Mayo, **fruto** al final del verano. Vecera.

Altitud: 1.000–1.500 msnm. Zona de montaña. Umbría.


Clima: >700 mm/año. Sin sequia estival. Entorno húmedo. < 18° en verano.

Suelo: fresco, fértil, húmedo y permeable. Muy delicada.

Sistema radical: secundario muy potente. Principal recta y profunda.

Crecimiento: inicial lento. **300 años.**

Id: troncos gordos, blanquecino-grisáceo. El inicio de las ramificaciones siempre es con un ángulo de 60° que con el peso de la rama tiende a tumbar. Las hojas en su borde tiene una pelosidad blanca. En invierno presenta unas yemas que pinchan. Fruto hayuco.



Fagus sylvatica
Galán, Gamana & García (2000)



Madera: 8–25 años (M. bajo) y 80–120 años (M. alto)

4–8 m³/ha/año

Sociología: Se asocia con *Q. petraea*, *Q. robur*, *P. sylvestris*, *Q. pyrenaica*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia* ssp., *Hacer* spp., *Q. faginea*, *Castanea sativa*, *P. uncinata*,...

Acompañantes arbustivos: *Corylus avellana*, *Rhamnus alpina*, *Rhamnus frangula*, *Salix caprea*, *Deschampsia flexuosa*...

CASTANEA SATIVA (CASTAÑO)

Altura: hasta los 35 m. Ø hasta 10 m.

Floración en Mayo-Junio, **fruto** Octubre-Noviembre. Vecera (3-5 años).

Altitud: 0 –1.500 msnm. Óptimo 200 –1.000 msnm. Laderas de montaña.

Clima: >600 mm/año. Periodos de alta humedad y aridez. -16° / 39°.

Suelo: prefiere silíceos, silíceo-arcilloso. Muy delicada.

Sistema radical: Pivotante potente. Muy extendido y robusto.

Crecimiento: relativamente rápido. **1.000 años.**

Id: Hoja aserrada lanceolada, con base asentada con ángulo recto respecto al peciolo. Fruto en erizo. Es monoica.



Madera: 100 años. 4 –10 m³/ha/año

Carpintería: 50 –100 años.

Tanino: 15 –30 años.

Sociología: Tiende a formar masas puras y densas con escasas especies asociadas, debido a la riqueza en taninos de su humus. Los principales contactos son con *Q. robur*, *Q. pyrenaica*, *P. sylvestris*, *Fagus sylvatica*.



ILEX AQUIFOLIUM (ACEBO)

Altura: 3 -15 m. **100 –500 años.**

Altitud: 0 –1,600 msnm.

Clima: 600 mm/año. Sin sequía severa

Flor de Abril-Junio, **fruto** de Noviembre-Febrero.

Suelo: fresco, suelto, silíceo. Dioico (ver flor: si estambres apuntan arriba es macho, si se abren hacia los laterales es hembra)



POPULUS SP. (CHOPO)

Altura: hasta los 30m.

Floración en Febrero-Marzo.

Altitud: 0 –1.000 msnm. Mesotermo. Heliófilo.

Clima: 300 –1.000 mm.

Suelo: suelto, no compactados. Zonas llanas con humedad edáfica.

Sistema radical: potente, somero.

Crecimiento: muy rápido. <100 años.

Uso melífero, protección de riberas y tablero contrachapado. Absorción metales pesados.

P. alba



P. nigra



P. tremula



ALNUS GLUTINOSA. (ALISO)


Altura: hasta los 30 m.

Sistema radical: Raíces muy extendidas en superficie. Raíces amplias. Con nódulos fijadores de nitrógeno.

Altitud: 0 –1.700 msnm. Óptimo 600 msnm. Zonas de ribera o muy húmedas.

Suelo: profundos y desarrollados. **80 –120 años.**

Id: Fruto en forma de piña. Hoja ovalada, aserrada. Entre nervio se forma como una curvatura. Tallos anuales rojo vino




SALIX SP. (SAUCE)



- *S. alba*: puede llegar hasta 25 m. Hoja lanceolada y borde casi liso.
- *S. fragilis*: a diferencia del anterior, siempre le vamos a ver el nervio central (sobre todo en el envés).
- *S. caprea*: hoja ovalada. Crea unas vainas peludas identificables.
- *S. atrocinerea*: la punta de la hoja es como de espátula. En el envés se ven unas pubescencias en los nervios secundarios de colores rojizos (característica única).
- *S. salviifolia*: hoja lanceolada con un dentado perfectamente marcado.

BETULA SP (ABEDUL)



ULMUS SP (OLMO)

Ulmus sp

U. glabra
15 - 30 m.
Ulmus glabra
Galán, Gamarra & García (2000)

U. minor
15 - 30 m.
olmo común
Ulmus minor
Galán, Gamarra & García (2000)

U. laevis
15 - 30 m.
www.arbos.es
Ulmus laevis

- *U. glabra*: se diferencia porque el limbo es asimétrico muy marcado. La punta de la hoja tiende a coger forma de tridente.
- *U. minor*: también tiene asimetría en la hoja aunque menos. Los ramilletes nuevos tienen acostillamientos (las ramas de ese o del año anterior), es muy típico.
- *U. laevis*: es como el minor pero las hojas son doblemente aserradas y sin acostillamientos.

FRAXINUS SP. (FRESNO)

Fraxinus angustifolia

Altura: hasta los 25m.
Floración: en Febrero-Marzo, fruto final verano.
Altitud: 0 - 1,200 msnm. Heliófilo.
Clima: mediterráneo.
Suelo: Indiferente edáfico.
Sistema radical: potente, principal profunda + laterales someras.
Crecimiento: medio rápido. **100 - 150 años.**
Ganadería: 10 - 15 años (desmoche)
Madera: 60 - 70 años

F. angustifolia
40 m. Hasta 1,700 m
Suelo fresco, profundo.

F. excelsior

F. ornus

Fraxinus angustifolia **Fraxinus excelsior** **Fraxinus ornus**

Yema marrón; yema negra; yema con pelos

Acer sp.


Altura: 4 – 11 m.
Suelo: seco, preferiblemente calizo.



Acer monspessulanum
www.programanlitos.org








10 – 20 m.
Ø hasta 1m

A. campestre





- *A. monspessulanum* o arce de Montpellier: más adaptado a sequía que el resto. La hoja tiene 3 lóbulos.
- *A. campestre*: la sámara forma un ángulo llano y la hoja tiene 5 nervios.

Acer sp.

Altura: 7 – 15m.
Suelo: seco, preferiblemente calizo.


A. opalus







10 – 25 m.
Ø hasta 1m

Acer pseudoplatanus
Galán, Gamarra & García (2000)

- *A. pseudoplatanus*: hoja palmeada con bordes dentados.
- *A. opalus*: Hoja ligeramente palmeada y coge coloración otoñal.
- *A. platanoides*: no hay fotos, pero se caracteriza por tener 7 nervios.

SORBUS SP (SERBALES)




Especies termófilas que requieren algo de precipitación (tienden a zona norte, fondos de valle con humedad). Rondan los 15 m de altura.

- *S. aria* (mostajo): el más restringido de los 4, distribuido en la zona norte. Hoja simple, borde dentado, envés con pelitos que le da tonalidad blanca (diferente al resto). Bayas anaranjadas y en racimitos.
- *S. aucuparia* (Serbal de los cazadores): Árbol de montaña que requiere suelos silíceos, es pionero y heliófilo, pero es que más humedad requiere. Tiene hoja compuesta, imparipinnada, de folíolos dentados. Bayas muy rojas.
- *S. torminalis*: hoja simple, palmeada, lobulada y dentada. Frutos con colores marrones.
- *S. domestica*: hoja simple, ovalada, de borde doblemente aserrado. Frutos con color amarillo mostaza.

TILIA SP. (TILO)

Tilia sp.


Altura: hasta 25m.
Muy resistentes a la contaminación.




Tilia cordata




Tilia cordata
Galán, Gamarra & García (2000)



Tilia platyphyllos





Tilia platyphyllos
Galán, Gamarra & García (2000)

Árbol con forma cónica, muy resistente a la contaminación (buenos para ciudad). Ambas especies tienen la hoja con forma acorazonada, asimétrica, borde aserrado y el final de la hoja es apuntado. Diferencia: *T. cordata* tiene pilosidad roja en el envés, la otra no tiene nada.

ALMEZ Y LAUREL

Celtis australis

Altura: 15 – 25 m.
Termófilo. Indiferente al suelo. Fresco






Celtis australis
Galán, Gamarra & García (2000)

Laurus nobilis

Altura: 3 – 12 m.
Muy resistentes. Clima suave y zonas bajas, protegido del frío





Laurus nobilis
Galán, Gamarra & García (2000)


- *Celtis australis*: hoja asimétrica (lados distintos). Desde el envés nos fijamos que salen 3 nervios. Hoja lanceolada, apuntada y doblemente aserrada. Tiene unas fructificaciones que son unas bolitas negras. Sensible heladas. Se cree que este es el árbol de Madrid no el madroño).
- *Laurus nobilis*: habita en zonas bajas. Necesita un mínimo de humedad. Hoja de haz brillante, envés mate. Verde vivo. Hoja de borde liso lanceolada. Fructificaciones que acaban color negro. Rebrotan de cepa.

NOGAL

Juglans regia

Altura: hasta 25 m.

0 – 1,500 msnm. Suelos ricos y profundos. **Termófila.**
Sistema radical potente. **200 años.**



Sensible a heladas tardías. Rebrotta de raíz. Copa densa, irregular y abierta. Hojas compuestas, imparipinnadas, con 4-5 pares de folíolos + terminal. Si hay 7-9 folíolos + terminal es *Juglans nigra* (nogal americano).

EUCALIPTO


Eucalyptus sp.

Altura: hasta 50 m. **100 años.**

Climas oceánicos suaves. 0 – 1,000 msnm.



E. globulus



Altura: hasta 30 m. **100 años.**

Climas suaves. 0 – 250 msnm.



E. camaldulensis




Se diferencian en corteza (se desprende a tiras el globulus, a lascas/placas camaldulensis). El fruto del camaldulensis es como un conito de helado pequeño (uña meñique), y globulus es como un cuenco.

SAMBUCO

Sambucus nigra

Altura: hasta 5m.

Suelo: Presente en zonas ribereñas o asociadas a zonas con humedad alta y nivel freático cercano a la superficie. Muy cultivada cerca de poblaciones. Uso medicinal




Ligado a entornos ribereños. Hojas compuestas, imparipinnadas, ovaladas apuntadas, con borde aserrado. Floraciones blancas en pompones y con fruto en racimo muy característico. Uso medicinal.

MADROÑO

Arbutus unedo



Hasta 6m.



Crecimiento lento (hasta 6 m). Hoja lanceolada con bordes aserrados y con margen amarillentos. Peciolo rojo vino. Floraciones en forma de campana. Frutos llamativos (si se comen fermentan en el estómago y produce alcohol).

ÁRBOLES CANARIOS.

Laurus novocanariensis



Altura: 15 – 25 m.
Dioico. Laurisilva.
Suelos húmedos.
Termófilo



Ocotea foetens

Altura: 10 – 20 (40) m. Endemismo
Suelos profundos y ricos en materia orgánica.



El **loro canario** es el más abundante de la laurisilva. En comparación con el laurel, la hoja es más grande, más gordita, más flexible, no tiene ese olor, y los bordes son un poco dentados.

El **Ocotea foetens**, también conocido como tilo, puede llegar a los 40 m, tiene hojas lanceoladas (pueden recordar a las de un naranjo o limonero), y con un fruto que parece como una bellota.

Árboles canarios

Apollonias barbujana



Altura: 10 – 25 m. Endemismo
Heliofilo. Zonas menos húmedas
de la laurisilva. Suelos húmedos.



Persea indica

Altura: hasta 20 m. Suelos profundos y zonas húmedas.
Laurisilva. Desde 500 – 900 msnm.
Endemismo.



El **barbusano** (*Apollonias barbujana*), puede recordar a los aligustres. Se encuentra en zonas limítrofes con la laurisilva, normalmente cotas más bajas (es heliófila y busca zonas menos húmedas).

El **viñático** (*Persea indica*). Hoja larga, flexible, lanceolada. Se diferencia del barbusano en que la base del fruto es más grande.

Ilex perado

Altura: hasta 15 m. Muy exigente biológicamente. Zonas con alta humedad, con influencia de nieblas, cerradas y suelos ricos



Ilex canariensis


Altura: hasta 10 m. Desde la laurisilva hasta 1,800 msnm. **Endemismo.**



Dos tipos de acebos. El canariensis es un endemismo, el otro no. Como busca mucha humedad será típica del interior profundo de la laurisilva. El *I. canariensis* se distribuye desde los bosques de brezales de *Erica arborea* hasta los 1.800 m de altitud.

Rhamnus glandulosa

Altura: hasta 8 m. Zonas húmedas, frescas y soleadas. Puede actuar como colonizadora. **Endemismo.**



Picconia excelsa

Altura: hasta 12 m. Zonas de ladera entre 800 – 1,100msnm. También aparece en zonas degradadas e incluso pinar mixto.



El **sanguinero** (*Rhamnus glandulosa*) los nervios de las hojas se tuercen e intentan ir paralelos al nervio principal (característico de las rhamnaceas) y borde dentado.

El **paloblanco** (*Picconia excelsa*) las hojas tienden a curvarse al borde de la hoja. Aparece en zonas degradadas e incluso con pinar.

Viburnum rugosum



Altura: hasta 7 m.
Laurisilva. Zonas de sombra y humedad.
Endemismo.



A. Fernández






Gerardo G. Casanova

El **follado canario** (*Viburnum rugosum*): hoja dura, aspera y peluda. Las floraciones son como pompones.

27. PASTOS NATURALES ESPAÑOLES. CLASIFICACIÓN. PRINCIPALES ESPECIES HERBÁCEAS. PRINCIPALES SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO.

CLASIFICACIÓN.

- **Pastos de alta montaña** (Entorno límite superior al bosque. 1800-2000 msnm.)
 - Climatófitos (topografía no cóncava)
 - Edafohigrófitos (topografía cóncava)
- **Pastos mesófitos** (Poca o nada sequia estival)
 - Poca influencia antrópica
 - Marcada influencia antrópica
- **Pasto xero-mesofítico** (Vivaces y anuales. Xerófitos y terófitos)
 - No transformados por pastoreo
 - Creados y mantenidos por pastoreo
- **Pastos terófitos** (Sequia estival larga. Anuales)
 - No nitrófilos
 - Nitrófilos antropizados
 - Inundables estacionales



Los pastos de alta montaña no se pueden usar en invierno, pero sí hay producción en verano. En los pastos mesofíticos, donde apenas hay sequía estival, en invierno hay pocas producciones porque hay heladas, en verano el calor somete a estrés las plantas y provoca un decrecimiento de la producción, por lo que en primavera y otoño es cuando se pueden utilizar. Si combinamos pastos mesofíticos con los de alta montaña, solo nos quedaría por cubrir el invierno para dar de comer al ganado. Esto se arregla con siegas y almacenando para el invierno.

Los pastos xero-mesofíticos tienen más influencia del calor en verano es tan fuerte que pasado el verano el pasto sigue estando afectado. En estos pastos los crecimientos se dan en primavera y en otoño se da algo de producción, pero con peor rendimiento. Podré usarlos en dos estaciones (como los mesofíticos) pero haciendo un uso más fuerte en primavera y otro más suave en otoño. En verano e invierno me olvido de ellos.

Los pastos terofíticos son como los mesofíticos, pero a lo bruto: Tenemos largas sequías estivales e inviernos más fríos. En cuanto producción, son más como los xero-mesofíticos: en primavera tenemos buena producción, en verano se agostan, y en otoño vuelven a tener otro crecimiento, pero muy liviano. Por lo tanto, estos pastos en otoño se dejan de reserva y no se suelen utilizar.

PASTOS DE ALTA MONTAÑA

Se sitúan de forma natural entre **1.800 – 2.000 m**. Por su **adaptación al clima frío** las especies desarrollan gruesas cutículas, limbos convolutos, etc., por lo que predominan **vivaces de escasa palatabilidad y rendimiento**. Sin embargo, este hecho se compensa por su valor estratégico en la ordenación pastoral comarcal o supracomarcal, al ser **aprovechados como “agostaderos”** (se aprovechan cuando otros pastos se agostan o secan).

Pastos de alta montaña

Climatófitos (no concava)

- Acidófilos eurosiberianos: *Caricetea curvulae*
- Acidófilos mediterráneos: *Festucetea indigestae*
- Basófilos crioturbados: *Festuco-Ononidetea*
- Basófilos no crioturbado alpinos llanos: *Carici-Kobresietea*
- Basófilos no crioturbados: *Festuco-Seslerietea*

Edafohigrófitos (concava): *Nerdetea*



Acidófilos eurosiberianos: orden *Caricetea curvulae*

- **Tasca alpina** (*Festucion supinae*): Se desarrolla en el piso alpino sobre topografía llana. Presenta una cobertura vegetal completa o casi completa.



- **Lastonares de ladera** (*Festucion eskiae*): Se encuentran en el piso subalpino (que incluye zonas alpinas y altimontanas) y específicamente en laderas. Su cobertura es variable y se extiende por una franja más amplia que incluye los Pirineos y la zona cantábrica.



Acidófilos mediterráneos: orden *Festucetea indigestae*

A diferencia de la *Festucion supinae* (tasca alpina) de los Pirineos, que es muy verde y densa, estos pastos mediterráneos sufren el **agostamiento** (se secan en verano) debido a la falta de lluvias; Tienen un valor nutritivo menor, pero son vitales para el ganado en primavera y principios de verano; Están formados por plantas más endurecidas o con pelos (como las del género *Festuca* o *Armeria*) para protegerse de la fuerte radiación solar.

Pastos Permanentes: Se encuentran en el piso crioromediterráneo (el más elevado y frío, por encima del límite del bosque). Pertenecen al orden *Festucetalia indigestae* y se dividen por zonas geográficas:

- **Carpetano-Ibérico-Leoneses** (*Minuartio-Festucion curvifoliae*): Propios del Sistema Central (Gredos, Guadarrama), Sistema Ibérico y Montes de León. Son pastizales de gramíneas resistentes al frío extremo y al viento.
- **Nevadenses** (*Ptilotrichion purpurei*): Exclusivos de las cumbres de Sierra Nevada. Están adaptados a suelos pedregosos y condiciones de alta montaña bética.
- **Orensano-sanabrienses y orocantábricos** (*Teesdaliopsio-Luzulion caespitosae*): Localizados en el noroeste peninsular y zonas de la Cordillera Cantábrica con mayor influencia silíceas.



Pastos Seriales: Aparecen en los pisos supra- y oromediterráneo (altitudes medias-altas). Son pastos "seriales" porque suelen ser etapas de sustitución de matorrales o bosques degradados. Tenemos el orden *Jasiono-Koeleretalia* con dos alianzas (*Hieracio-Plantaginion radicatae* y *Armerion eriophyllae*). Están muy extendidos por las montañas del centro y oeste peninsular (Sistema Central, Sierra Morena y zonas de la Meseta).



Basófilos crioturbados: Festuco-Ononidetea

Los **pastos basófilos crioturbados** son comunidades vegetales que crecen en suelos básicos (ricos en calcio) y que están sometidos a la **crioturbación**, un proceso donde el hielo y el deshielo mueven y mezclan las capas del suelo.

Eurosiberianos Pirenaicos. Orden: *Ononidetalia striatae*. Comprende pastizales secos y matorrales de porte bajo (caméfitos) que crecen sobre suelos calizos y pedregosos de la alta montaña pirenaica. La diversidad de géneros ofrece un pasto heterogéneo donde las gramíneas (*Festuca*) proporcionan el volumen forrajero y las leguminosas (*Ononis*, *Astragalus*) mejoran la calidad proteica de la dieta del ganado ovino y vacuno durante el verano.



Mediterráneos o Eurosiberianos orocantábricos con fuerte influencia mediterránea: Este grupo pertenece al orden **Festuco - Poetalia ligulatae** y se divide en tres alianzas principales:

- **Minuartio-Poion ligulatae:** Pastos **mediterráneos** de los pisos supra- y oromediterráneo. Se extienden desde la Cordillera Cantábrica a lo largo de todo el Sistema Ibérico. (Géneros *Festuca* y *Poa*)
- **Festucion burnatii:** Pastos **eurosiberianos** de los pisos subalpino, alpino y altimontano. Su distribución es más específica, centrada en la Cordillera Cantábrica (especialmente en Picos de Europa). (Géneros *Festuca* y *Poa*)
- **Plantagini-Thymion mastigophori:** **Comunidades supramediterráneas y castellano-cantábricas.** Se encuentran en el borde norte de la Meseta, en la transición hacia la montaña cantábrica. Destaca por su carácter aromático debido a la abundancia de tomillos (*Thymus*). También otros géneros como la *Festuca*. Recurso importante para ganado ovino que pasta en los bordes de la Meseta casetellana durante la primavera.



Basófilos no crioturbado alpinos llanos

Son pastizales de alta montaña que se asientan sobre suelos calizos estables (donde el efecto del hielo no desplaza el suelo constantemente).

En este caso solo hay un **orden**: *Elynetalia myosuroidis*. Y una sola alianza: *Oxytropido-Elynion*. Destaca la presencia de *Kobresia myosuroides* (antes *Elyna myosuroides*), una planta que forma céspedes muy densos y resistentes.



Basófilos no crioturbados: Festuco-Seslerietea

La clase **Festuco-Seslerietea** engloba los pastizales basófilos (suelos calizos) de alta montaña que se desarrollan sobre sustratos estables, es decir, **no crioturbados**. A diferencia de las comunidades que sufren el movimiento del suelo por el hielo, estas forman tapices vegetales más continuos y maduros.

Se desarrolla en el piso **subalpino** (incluyendo zonas alpina y altimontana), principalmente en **laderas**. Son suelos **ligeramente quionófilos** (donde la nieve se acumula y permanece cierto tiempo), pero con un lavado de nutrientes no muy intenso, lo que da lugar a un **suelo eutrófico** (rico en nutrientes).

Presenta un solo orden: **Seslerietalia coeruleae**, el cual se divide según su ubicación geográfica:

Pirenaicos: Comprende las alianzas *Primulion intricatae* y *Laserpitio nestleri-Ranunculion thorae*. Se localizan en la cordillera de los Pirineos.



Orocantábricos: Comprende la alianza *Armerion cantabricae*. Se localiza en la franja central de la Cordillera Cantábrica (Picos de Europa y alrededores).



Entornos edafohigrófilos (concava)

Estos entornos almacenan más cantidad de agua (topografía cóncava, menos expuesta). Estos entornos no solo aparecen en los de alta montaña, también aparecen en la siguiente clasificación: los **entornos mesofíticos**.

En estos entornos predomina la clase **Nardetea strictae**, pastos acidófilos y edafohigrófilos que se caracterizan por crecer en suelos ricos en materia orgánica de descomposición lenta. Muchos de estos pastos se denominan **cervunales** debido a la alta presencia de la especie *Nardus stricta* (cervuno).

Por lo tanto, estamos ante un solo orden: *Nardetalia strictae*.

Euro-siberianos (suborden *Nardetalia strictae*):

- **Alpinos y subalpinos:** Pertenecen a la alianza *Nardion strictae*. Se localizan en los Pirineos y puntos de la Cordillera Cantábrica.
- **Montanos:** Pastos acidófilos (no exclusivos de cervunales) de la alianza *Violion caninae*. Se distribuyen ampliamente por el norte peninsular.

Mediterráneos (suborden *Campanulo - Nardetalia strictae*):

- **Nevadenses:** Conocidos como **borreguiles** (alianza *Plantaginion thalackeri*). Son exclusivos de las zonas húmedas de alta montaña en Sierra Nevada.
- **No nevadenses:** Alianza *Campanulo - Nardion strictae*. Se encuentran en los sistemas montañosos del centro y oeste de la península (Sistema Central e Ibérico).



PASTOS MESOFÍTICOS

Aparecen en clima húmedo, **sin o casi sin sequía**, en terreno con vegetación potencial de caducifolias y aciculifolios de montaña.

Poseen un **carácter natural parcial**: existen por una **actividad antrópica intensa**, sino en su lugar habría bosques. Presentan la **mayor potencialidad productiva** de la Península Ibérica (son los más productivos, pero no los más importantes). Desarrollan un **pasto alto y palatable**, adecuado para ganado **bovino y equino**.

Pastos mesofíticos

- Poca influencia antrópica acidófilos: *Nardetea* y *Molinio-Arhenatheretea*
- Poca influencia antrópica basófilos: *Festuco-Brometea*
- Marcada influencia antrópica en vivaces: *Artemisietea*
- Marcada influencia antrópica: *Molinio-Arhenatheretea*



Poca influencia antrópica basófilos

corresponde a la clase **Festuco – Brometea** que se divide en dos grandes grupos:

- **Pastos con sequía clara (Influencia Mediterránea)**, aunque no excesivamente larga, compensada generalmente por **freatismo** (humedad en el suelo). El arbolado acompañante consiste en quejigos, carrasca, *Pinus halepensis*, *P. pinea*, *P. nigra*. Orden **Brachypodietalia phoenicoidis**; alianza **Brachypodion phoenicoidis**.



- **Pastos sin o casi sin sequía (Óptimo Eurosiberiano):** se desarrollan en ambientes con humedad constante. **Arbolado acompañante:** Haya, fresnos, tilos, arces, roble pubescente, castaños, *Pinus uncinata*, *P. sylvestris*, *P. radiata*, *P. nigra*, entre otros. Orden **Brometalia erecti**. **Alianzas:** *Potentillo montanae-Brachypodium rupestre* (antes *Bromion erecti*), *Teucrium pyrenaici-Bromion erecti* y *Artemisia albae-Dichanthion ischaemi* (variantes del antiguo *Xerobromion*).



Poca influencia antrópica acidófilos y Marcada influencia antrópica (*Molinio-Arrhenatheretea*)

Aquí se mezclan los pastos de entornos edafohigrófilos comentados antes (*Nardetea*) con los prados de la clase **Molinio-Arrhenatheretea**, que corresponde con comunidades mesofíticas muy modificadas por la actividad humana, ya sea mediante la **siega** o el **pastoreo**. A continuación se detallan sus tipos principales según el manejo y las condiciones del suelo:

1. Prados de Siega o Diente (Orden *Arrhenatheretalia*): Son prados destinados a la obtención de forraje (siega) o al consumo directo por el animal (diente):

- **Prados de diente o de siega oligotróficos** con aprovechamiento intenso. Se sitúan en el tercio norte peninsular. ***Cynosurion cristati***.
- **Prados de siega eutróficos** (montanos o colinos) con aprovechamiento poco intenso, generalmente abonados y estercolados. Presentan alta diversidad y megaforbios abundantes. Ocupan la Cornisa Cantábrica y Pirineos. ***Arrhenatherion elatioris***.
- **Prados de siega eutróficos de alta humedad** en los pisos altimontanos o subalpino, con aprovechamiento poco intenso (no tiene características adecuadas para ser aprovechados de forma intensiva). Su distribución es principalmente pirenaica. ***Trisetum-Polygonum bistortae***.



2. Otros Prados con Influencia Humana o Humedad

- Prados condicionados por un **freatismo intenso** (humedad del suelo constante). Se encuentran en la franja norte y sistemas montañosos del centro-este. ***Molinietalia coeruleae***.
- Suelos **nitrificados y compactados por el pisoteo**. Incluye los **gramales** de óptimo mediterráneo (*Trifolium-Cynodon*) distribuidos por toda la Península. ***Plantaginietalia majoris***. También son similares los gramales húmedos y termófilos de ***Paspalo-Heleochoetalia*** de distribución litoral y meridional.
- Prados juncales mediterráneos, con presencia en casi toda la España mediterránea. ***Holoschoenetalia***.



Marcada influencia antrópica en vivaces: *Artemisietea*

La clase **Artemisietea** representa un tipo de vegetación muy ligada a la actividad humana, pero con una estructura diferente a los prados de siega. Se trata de **pastos nitrófilos de vivaces** (plantas que viven más de dos años).

Tienen su **óptimo en la región eurosiberiana** (norte peninsular), aunque también penetran de forma habitual en la **región mediterránea**, especialmente en zonas donde se mantiene cierta humedad. Su humedad puede tener un origen **climático** (precipitaciones) o **edáfico** (del suelo).



PASTOS XERO-MESOFÍTICOS

Comunidades **herbáceas o herbáceo-leñosas** en las que las especies anuales tienen capacidad de competir como consecuencia de la **sequía estival** y a veces la **alteración antrópica**. En la mayor parte de los casos, constituyen la **última etapa de sustitución** de bosques de carácter marcescente, esclerófilo-perennifolio o aciculifolios, pero también pueden formarse por pastoreo intenso y continuado. El clima favorece una **producción de pasto irregular y desigual**.

- Pastos en sustratos no transformados por pastoreo
 - Arenales acidófilos: *Koelerio-Corynephoretea*
 - Otros sustratos: *Stipo-Agrostietea*, *Festucetea indigestae* y *Jasiono-Koeleretalia*
 - Sustrato basófilo con crioturbación : *Festuco-Ononidetea*
 - Sustrato basófilo sin crioturbación : *Lygeo-Stipetea* (X) y *Festuco-Brometea* (M)
- Pastos creados y mantenidos por pastoreo: *Poetea bulbosae*



Pastos en sustratos no transformados por pastoreo

- **Pastos sobre Arenales acidófilos (*Koelerio-Corynephoretea*):** nos los encontramos en Galicia, por todo el Tajo y algo en el sistema bético, y consisten en comunidades vegetales adaptadas a estos entornos de arena, donde aparece principalmente plantas vivaces. A pesar de existir humedad climática, las plantas sufren **sequía** debido al carácter arenoso del suelo, que no retiene el agua. 
- **Pastos sobre otros sustratos no arenales (Clase *Stipo-Agrostietea*):** Nos encontramos los Vallicares, los Berciales y los Cerrillares. Son pastos que crecen en zonas degradadas, que tienen poca humedad y mucho calor en verano. Normalmente aparecen los géneros *Agrostis* y *Festuca*. No son especialmente nutritivos y al ganado le presenta mayor dificultad de digestión al ser más duros. 
- **Sustratos básicos:** encontramos entornos nitrófilos y no nitrófilo. En las zonas de costa **no nitrófilas** nos encontramos:
 - **Albardinales (*Agropyro-Lygeion sparti*):** Crecen en suelos ricos en limos y arcillas. Se sitúan principalmente en el valle del Ebro y zonas del sureste. 
 - **Espartizales y atochares (*Stipion tenacissimae*):** Dominados por el esparto, son típicos de las zonas más áridas del este y sureste peninsular. 
 - **Cerverales (*Thero-Brachypodium ramosi*):** Pastos de gramíneas de pequeño porte que ocupan amplias zonas del levante y el interior mediterráneo. 
 - **Lastonares béticos de *Festuca scariosa* (*Festucion scariosae*):** Propios de las cordilleras béticas en el sur de España. 
 - **Pastos de *Stipa parviflora* (*Stipion parviflorae*):** Localizados en la franja costera del sureste. 
 - **Pastos nevadenses de *Brachypodium boissieri* (*Trisetum velutini-Brachypodium boissieri*):** Exclusivos de las zonas altas de Sierra Nevada. 

En las zonas **nitrófilas** aparecen comunidades que prefieren temperaturas más cálidas y suelen aparecer en terrenos que han sido removidos o alterados.

Estos pastos, aunque de menor calidad forrajera que los del norte debido a su dureza y fibrosidad, son fundamentales para el mantenimiento de razas de **ovino y caprino** autóctonas, capaces de aprovechar el

esparto y el albardín en zonas donde otros pastos no sobreviven. Estos pastos son de transición, permitiendo mantener el ganado hasta que se forme los pastos de otras zonas.

Generos Stipa, Festuca y Brachypodium.

Pastos creados y mantenidos por pastoreo: *Poetea bulbosae*

Distribuidos por el centro y sur peninsular. Principalmente género trifolium y Poa. Se crean para dar pastos durante un par de meses para mantener el ganado. Los trifolium nitrifican el suelo y aportan proteínas, y la Poa aporta carbohidratos de facil digestion. Sin el ganado estos pastos no sobreviven.

Sustratos oligotróficos (Pobres en nutrientes): Trifolio subterranei-Periballion. Estas comunidades están dominadas por tréboles (*Trifolium* spp.) y la gramínea *Periballia involucrata*.

Sustratos eutróficos (Ricos en nutrientes): *Poa bulbosae*-*Astragalion sesamei*. En este caso domina la *Poa bulbosae* y leguminosas como *Astragalus* y *Medicago*.

Vertisuelos (Bujeos andaluces): *Plantaginion serrariae*. Son exclusivos de los suelos arcillosos profundos del valle del Guadalquivir, en el sur de España.



La Poa bulbosa tiene unos bulbos que le permite entrar en latencia en periodo seco y rebrotar con las lluvias.

PASTOS TEROFÍTICOS

Comunidades mayoritariamente **herbáceas** dominadas por especies **anuales**, que pasan la estación más desfavorable del año (el verano) en forma de **semilla**. Son aprovechados **a diente** mediante **ganado ovino**, en primavera y algo en otoño. Poseen una **mediocre calidad productiva y nutritiva**, pero revisten importancia por la **amplia superficie** que ocupan.

Pastos terofíticos

- No nitrófilos (*Helianthemetea*)
 - En sustratos arenosos
 - Sustratos oligótrofos no arenosos (*firmes*).
 - Sustratos eutróficos no arenosos (*firmes*).
- Nitrófilos antropizados: *Stellarietea*
- Inundables estacionales: *Isoeto-Nanojuncetea*



Especies herbáceas



Agrostis castellana
Vivaz, 50-100cm. Zona montana con >500mm. Buena calidad.



Bromus inermis
Perenne. Rustico. Mucho pasto de media calidad



Cynosorus cristatus
Montano y subalpino. No sequia. Encharcamiento. Buena calidad. Resiste pastoreo



Lupinus luteus
Gran interés forrajero. Lignificante tardía. Muy usada en siembras. Fijadora de nitrógeno.



Arrhenaterium elatius
Amacollada. >600mm. No heladas. Muy productiva



Brachypodium retusum
Espiga con raquis muy largo. Zonas de yeso y cal. Palatabilidad mediocre.




Dactylis glomerata
Perenne. Buena calidad. Sin pisoteo. Zona mediterránea



Lolium perenne
Vivaz. >600mm. Buena calidad. Resiste pastoreo

Especies herbáceas



Festuca rubra
Perenne. Buena calidad. Favorecida por el pastoreo.



Festuca ovina
Perenne. 0-2000msnm. Todo tipo ambientes. Césped denso y resistente



Poa bulbosa
Vivaz. 0-1600msnm. >500mm. Buena calidad, resistente y nutritivo.



Trifolium repens
Perenne. 800mm. Buena calidad, resistente y nutritivo.



Trifolium subterraneum
Oveja. 0-1000msnm. >450mm. Muy buena calidad y palatabilidad. Favorecida por pastoreo.



Pheum pratense
Vivaz. Gramínea de alta calidad y palatabilidad. >750mm. Prados de siega. No sequia.



Poa pratensis
Vivaz. 0-1500msnm. >700mm. No sequia intensa. Buena calidad.



Trifolium pratense
Vivaz. >700mm. Buena calidad. Resiste pastoreo.



Medicago sativa
Leguminosa. Buena calidad. Soporta sequia.



Onobrychis sativa
Leguminosa vivaz. Sustituye alfalfa a >1000msnm. Buena calidad. Siega + Diente.

Índice de Concurrencia (IC): mide el poder de una especie para desplazar a otra. Cuanto mayor sea el valor, mas capacidad para desplazar a las otras [1-5].

PRINCIPALES SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO

La principal herramienta de gestión de los pastizales naturales es el propio manejo del ganado (**Paradoja pastoral**). Las especies que come el ganado es favorecida por la dispersión del ganado (caga las semillas).

• Pastoreo continuo

Es el pastoreo que se realiza todo el año, **con todo el rebaño**, por **toda la extensión de superficie** que tengo. En la práctica no se hace así, pues siempre se deja una zona de alternativas o de reserva para hacer otros aprovechamientos, o para hacer una producción para guardarlo. En este tipo de sistemas **Apenas existen infraestructuras**, alguna manga o similar.

• Pastoreo rotacional

La **zona de pastoreo se divide** en un número variable de parcelas, y el rebaño va pasando de una a otra según la disponibilidad de forraje, siendo la permanencia del ganado en cada parcela variable, según el número de parcelas y época del año. Para ello:

- debe transcurrir un **tiempo mínimo** en cada zona entre rotaciones (**tiempo de reposo** para que la vegetación se recupere),
- se debe mantener el ganado en la zona el tiempo suficiente (para que el resto de parcelas se regenere y que no sea un tiempo excesivo que acabe con el pasto) y
- se debe distribuir el ganado de manera homogénea (según las necesidades del mismo).

• Pastoreo con agotamiento temporal

El ganado entra en ese pastizal cuando está en su **periodo de máxima posibilidad de aprovechamiento** y lo dejas para que se lo coma todo (lo sacas cuando la producción de pasto decrece). Normalmente son pastos de agostadero. Se aprovechan al máximo y de una sola vez.

• Pastoreo racionado

Se realiza en **bandas**, mediante el **desplazamiento de la cerca o hilo eléctrico** 1-2 veces por día. De esta forma la mayor parte de la hierba disponible es consumida, dando poca opción al animal a seleccionar, siendo los rechazos mínimos y la distribución de heces muy uniforme. Se utiliza en aprovechamientos secundarios (se mete el ganado entre viñedos para que se coman las hierbas).

• Pastoreo rígido

Se trata de un pastoreo rotacional con tiempos predefinidos e inmutables (no importa si queda pasto o no).

• Pastoreo programado

Se trata de un pastoreo rotacional elástico, donde se valora en cada momento que se pretende hacer. (se valora la situación antes de hacer el cambio).

• Pastoreo mixto

Uso de una pradera por más de 1 especie de manera simultánea (normalmente vacuno y ovino)

• Creep grazing

Permite a los animales jóvenes (terneros o corderos) pastorear áreas que no están al alcance de sus madres (se vallan las zonas para que la madre esté cerca).

LA GANADERÍA EXTENSIVA, SU VALOR ECONÓMICO, ECOLÓGICO Y CULTURAL.

Ganadería extensiva es aquella que, utilizando fundamentalmente razas autóctonas, aprovecha los recursos naturales de la zona donde se ubica. Se basa en la utilización de unas cargas ganaderas aceptables, que permitan la regeneración de las zonas sobre las que se pasta.

El **pastoralismo** es la ciencia detrás de la **ganadería extensiva**. A diferencia de otras disciplinas que solo se fijan en la hierba de los prados, el pastoralismo se encarga de gestionar todo el ecosistema del monte y el bosque usando al ganado. Se caracteriza por:

- Utilizar terrenos de vocación generalmente forestal.
- Utilizar recursos que si no se aprovecharan resultarían improductivos.
- El uso de técnicas dirigidas a conservar el sistema a largo plazo.
- Utilizar el ganado como factor ecológico (los animales actúan como "cuidadores" del paisaje).
- El escaso rendimiento por ha.
- Actuar sobre grandes extensiones.

El **pastoralismo** o **ganadería extensiva** tiene como principales ventajas:

- Produce alimentos de calidad a partir de suelos no cultivables.
- Reduce el consumo de piensos, así como energía y materiales (abono, etc.)
- Produce abundante estiércol, utilizable en los cultivos agrícolas por lo que se mejora el rendimiento de estos y permite un menor consumo de abonos químicos, con el consiguiente ahorro de recursos fósiles.
- Limpia los cultivos de vegetación indeseable, tanto desde el punto de vista productivo como de estabilidad de los ecosistemas (incendios forestales, etc.).
- Permite la utilización económica de terrenos que si fueran puestos en cultivo serían erosionados.

Pastaderos (donde va a comer el ganado)

- **Pastaderos ricos:** producción recogida o potencialmente recogida por el ser humano. En ellos se suelen realizar técnicas de cultivo. Suelen ser pastos densos, altos y húmedos.
 - Prados: Aprovechados a diente o a siega. Temporales (cuando se obtienen por siembra y en rotación con cultivos agrícolas) o permanentes.
 - Praderas: Aprovechados a diente. Temporales o permanentes.
- **Pastaderos pobres:** producción recogida por el ganado. Suelen ser pastos abiertos, bajos y de poca biomasa recogible.
 - Bosques.
 - Matorrales.
 - Herbazales, barbechos, eriales y pastizales propiamente dichos.
 - Desechos de cultivo, rastrojeras, viñas, etc.

Lo normal es encontrarnos situaciones mixtas, donde se alternan zonas de bosque y matorral con zonas de pradera. Es clásico en España el pastoreo de rastrojeras, viñas tras la vendimia, restos de ramón de poda de olivares, etc. La superficie pastoral en toda España abarca el 74% de la superficie total, que podría alimentar a 1,8 millones de toneladas de peso vivo.

Valor económico

Se trata de un sistema que permite compatibilizar la producción con la sostenibilidad ecológica, generando servicios ambientales y sociales.

El ganado genera carne, lácteos y fibras textiles, fomentando sistemas económicos rurales. Desde el punto de vista ambiental, contribuye al mantenimiento de la biodiversidad al conservar razas autóctonas y diversidad de pastos y otros vegetales al dispersar su semilla. La necesidad pastaderos implica la conservación de bosques y praderas naturales, como las de alta montaña, lo cual afecta al ciclo hidrológico y también establece sumideros de carbono (cambio climático). Fertilizan los campos. Controlan la vegetación (incendios). Configuran paisajes de alto valor natural.

CATÁLOGO OFICIAL DE RAZAS DE GANADO EN ESPAÑA

El **RD 45/2019**, de 8 de febrero, «por el que se establecen las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, se actualiza el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas», define el **Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España** como “aquél que contiene la **relación oficial y la clasificación de todas las razas** ganaderas reconocidas y utilizadas en España por su interés económico, productivo, cultural, medioambiental o social, destinadas a ser **objeto de un programa de cría**, de acuerdo con las siguientes categorías:

- **Razas autóctonas:** todas aquellas razas **originarias de España de protección especial** y de carácter más local, que deben ser **conservadas como patrimonio genético español** para favorecer su expansión y evitar su abandono y extinción, al disponer en su mayoría de escasos censos poblacionales y estar sometidas a **factores de riesgo**, con diversos grados de amenaza.
- **Razas integradas:** aquellas **razas foráneas** procedentes de la Unión Europea o de Países Terceros que tras un período de explotación en España están **contrastadas**, con genealogía y controles de rendimiento, y disponen de un **censo suficiente** para llevar a cabo un programa de cría, habiendo demostrado su **adaptación al entorno** medioambiental y a las condiciones y sistemas de producción españoles.
- **Otras razas reconocidas en España:** aquellas razas que han sido **caracterizadas y desarrolladas en España con distintas influencias genéticas**, que tienen un objetivo funcional o productivo definido en un programa de cría, con censo suficiente para desarrollarlo y que no cumplen los requisitos para incorporarse al resto de las categorías del Catálogo Oficial.”

En el **anexo I** aparece el listado de razas según su clasificación.

Razas autóctonas

- **Bovina:** Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana de la Montaña, Asturiana de los Valles, Avileña-Negra Ibérica, etc.
- **Ovina:** Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canaria, Canaria de Pelo, Carranzana, Cartera, Castellana, etc.
- **Caprina:** Azpi Gorri, Bermeya, Blanca Andaluza, Cabra Galega, Del Guadarrama, Florida, Majorera, Malagueña, etc.
- **Porcina:** Chato Murciano, Euskal Txerria, Gochu Asturcelta e Ibérico
- **Equina Caballar:** Asturcón, Burguete, Caballo de Las Retuertas, Menorquina, Pura Raza Española, etc.
- **Equina Asnal:** Andaluza, Ase Balear, Asno de las Encartaciones, Catalana, Majorera, Zamorano-Leonés
- **Aviar:** Andaluza Azul, Combatiente Español, Euskal Antzara, Gallina Empordanesa, Gallina Extremeña Azul, Pita Pinta, etc.
- **Otras:** Camello Canario, Conejo Antiguo Pardo Español, Conejo Gigante de España.

Razas autóctonas amenazadas

- **Bovina:** Albera, Alistana-Sanabresa, Asturiana de la Montaña, Avileña-Negra Ibérica y su variedad Bociblanca, etc.
- **Ovina:** Alcarreña, Ansotana, Aranesa, Canaria, Canaria de Pelo, Carranzana, Cartera, Castellana variedad negra, etc.
- **Caprina:** Azpi Gorri, Bermeya, Blanca Andaluza, Cabra Galega, Del Guadarrama, Mallorquina, Moncaína, etc.
- **Porcina:** Chato Murciano, Euskal Txerria, Gochu Asturcelta (algunas variedades).
- **Equina Caballar:** Asturcón, Burguete, Caballo de Las Retuertas, Menorquina, Pura Raza Galega, etc.
- **Equina Asnal:** Andaluza, Ase Balear, Asno de las Encartaciones, Catalana, Majorera, Zamorano-Leonés
- **Aviar:** Andaluza Azul, Combatiente Español, Euskal Antzara, Gallina Empordanesa, Gallina Extremeña Azul, Pita Pinta, etc.
- **Otras:** Camello Canario, Conejo Antiguo Pardo Español, Conejo Gigante de España.

Razas integradas

- **Bovina:** Blonda de Aquitania, Charolesa, Fleckvieh, Frisona, Limusina, Parda.
- **Ovina:** Assaf, Berrichon du Cher, Fleischschaf, Île de France, Lacaune, Merino Precoz.
- **Porcina:** Duroc, Landrace, Large White y Pietrain.
- **Equina Caballar:** Anglo-Árabe, Pura Sangre Inglés, Trotador Español.

Otras razas reconocidas

- **Ovina:** Salz.
- **Equina Caballar:** Caballo de Deporte Español (C.D.E.).

LAS VÍAS PECUARIAS: LA LEY 3/1995, DE 23 DE MARZO, DE VÍAS PECUARIAS.

La **Ley 3/1995 (23-Mar)** de Vías Pecuarias sustituye a la **Ley 22/1974 (27-Jun)** Vías Pecuarias y ha sido modificada por la **Ley 25/2009 (22-Dic)** modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Estructura: 5 Títulos (Preliminar + 4); 4 Capítulos; 25 Artículos; 3 Disp. Adicionales; 1 Disp. Transitoria; 1 Disp. Derogativa; 5 Disp. Final.

Vía pecuaria = ruta o itinerario por donde **circule o haya circulado** el ganado. Posibilidad **otros usos** compatibles (aunque el ganado tiene prioridad).

Son bienes del **Dominio Público** de las CC.AA. = **Inalienables, Imprescriptibles e Inembargables**

- Cañada: <75 m
- Cordel: <37,5 m
- Vereda: <20 m

En las vías pecuarias se reconoce la existencia de **abrevaderos, descansaderos, majadas** (donde se recogen al anochecer el ganado y/o el pastor) y **coladas** (pequeñas vías).

Se crea la **Red Nacional de Vías Pecuarias**, donde se incluyen vías continuas que abarquen al menos 2 CC.AA. o zonas interfronterizas

Usos:

- **Compatible:** tradicionales agrícolas, comunicaciones rurales de vehículos, plantaciones lineales
- **Complementario:** paseo, senderismo, cabalgada, etc.

Creación, determinación y administración de las vías pecuarias:

Corresponde a las CCAA investigar la situación de los terrenos que se presuman vías pecuarias, su clasificación, deslinde y amojonamiento:

- La **clasificación** es el acto administrativo por el que se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas de la vía pecuaria.
- El **deslinde** es el acto administrativo por el que se definen los límites de la vía pecuaria, de conformidad con su clasificación. El deslinde aprobado declara posesión y titularidad demanial a favor de la CCAA (prevalece sobre las inscripciones del registro de la propiedad). Las **acciones civiles** contra el deslinde prescriben a los **5 años**.
- El **Amojonamiento** (acto adm.) permite señalar permanentemente los límites físicos de la vía pecuaria.
- La **desafección** (acto adm.) permite transmitir un bien de dominio público al patrimonio administrativo (por ejemplo, cuando los terrenos ya no sean adecuados para el paso del ganado).
- El **itinerario** de una vía pecuaria podrá **variarse** por el interés general y, excepcionalmente, por interés particular. Siempre se **asegura** la anchura, idoneidad del trazado y demás usos compatibles. Se somete a **consulta previa e información pública** (1 mes).
- Se permiten **ocupaciones temporales** que no alteren el tránsito ganadero ni los usos compatibles por un máximo de **10 años** (renovables).
- Los **frutos y productos** no utilizados por el ganado pueden ser aprovechados por un plazo máximo de **10 años**.
- La **desafección, explotación y adquisición** de terrenos para la Red es **competencia de las CC.AA.**, previo **informe favorable del Ministerio**

Régimen Sancionador

- | | | | |
|---|-----------------------------|----------|------------------------------|
| • Leves (prescripción infrac.: 1 año) → | Pres. sanción 1 año | → | 60,01 – 601,01€ |
| <ul style="list-style-type: none">○ Acciones u omisiones que no causen daño o impidan su uso○ Incumplir condiciones de títulos administrativos○ Incumplimiento total o parcial de la Ley | | | |
| • Graves (prescripción infrac.: 3 años) → | Pres. sanción 2 años | → | 601,02 – 30.050,6€ |
| <ul style="list-style-type: none">○ Roturar o plantar sin autorización, así como la corta o tala○ Realizar vertidos o derrames○ Aprovechamiento de frutos o productos no autorizados○ Edificar o realizar cualquier obra no autorizada de carácter temporal○ Obstrucción de las labores de policía, inspección o vigilancia○ Acumular 2 faltas leves en 6 meses (en firme) | | | |
| • Muy graves (pres. infrac.: 5 años) → | Pres. sanción 3 años | → | 30.050,61–150.253,03€ |
| <ul style="list-style-type: none">○ Alterar hitos, mojones o indicadores○ Edificar o realizar cualquier obra no autorizada○ Instalar obstáculos que impidan <u>totalmente</u> el tránsito ganadero o de otros usos○ Acciones u omisiones que causen daño o impidan su uso, incluso la ocupación no autorizada | | | |

Las sanciones se **imponen** atendiendo a su **repercusión**, el **impacto** y las **circunstancias** del responsable. Esto hace imperativo dar **detalles** concretos en el acta de denuncia.

EL LIBRO BLANCO DE LA TRASHUMANCIA

La **Ley 3/1995** reconoce el paulatino abandono de la red viaria por las cabañas de largo recorrido, que ahora se lleva por ferrocarril o carretera. Pero recuerda el valor de la trashumancia tradicional a pie como conservadora del patrimonio público y de su función como corredor ecológico.

El **RD 728/2007** crea y regula el **Registro General de Movimientos de Ganado**, dependiente de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos del Ministerio competente en materia de medio ambiente. Con él se garantiza la trazabilidad del ganado vivo.

la **Ley 8/2003**, de 24 de abril, de Sanidad Animal y de las competencias de la Administración General del Estado, considera trashumantes los ganados que realizan desplazamientos entre distintas Comunidades Autónomas.

El **Libro Blanco** proporciona un **diagnóstico** de la situación actual de la trashumancia, del cual emanan las medidas necesarias para su recuperación. El Libro Blanco está organizado en **10 capítulos**; tras el primero de ellos, de carácter introductorio, se pasa revisión a las grandes cuestiones que atañen a la trashumancia: dimensión internacional, historia, ganadería, territorios, desplazamientos, socioeconomía y servicios ecosistémicos, lo que ofrece un diagnóstico general de la situación de la actividad en nuestro país.

Capítulos:

1. **Dimensión internacional:** El pastoreo móvil, representado en España por la trashumancia, no es un fenómeno local, sino que se encuentra en prácticamente cualquier parte del mundo.
2. **Historia:** En la Península Ibérica es un fenómeno que se remonta a tiempos prehistóricos. El capítulo recorre el devenir de la actividad desde aquellos remotos tiempos hasta nuestros días.
3. **Ganadería trashumante:** La ganadería extensiva en general, y la trashumante en particular, se encuentran íntimamente ligadas a las razas autóctonas y al pasto como principal fuente de alimento. Esto ha llevado a la mejora de las razas. Actualmente se destaca un descenso del ganado ovino y caprino y un aumento del ganado vacuno.
4. **Territorios trashumantes:** Las infraestructuras ganaderas características de la actividad trashumante se encuentran con frecuencia en avanzado estado de deterioro y no disponen de los servicios mínimos imprescindibles.
5. **Desplazamientos:** En este capítulo se habla de cómo las vías pecuarias han sufrido una recesión en pro del transporte por ferrocarril, hasta que RENFE suspendió el servicio (1996), por lo que fue sustituido por el camión. El capítulo continúa citando los aspectos normativos derivados de la Ley 8/2003 y 3/1995, además del Programa de Recuperación de Vías Pecuarias de la Red Nacional (Estado + CC.AA.).
6. **Socioeconomía:** Destaca los problemas ligados a la profesión como la falta de relevo, rendimiento económico, dificultad conciliadora, papel de la mujer, etc.
7. **Servicios ecosistémicos:** Se destacan los valores ecosistémicos de la profesión (diseminación, procesos, conectividad, etc.).

PROPUESTAS DE MEDIDAS:

- Eje 1: Desarrollos normativos** para consolidar la Red y asegurar la sanidad, y crear una mesa sectorial de la Trashumancia para el dialogo entre administración y agentes implicados.
- Eje 2: Mejora del conocimiento para la gestión.** Establecer registro de ganaderos trashumantes y determinar zonas de trashumancia con sus características biogeográficas.
- Eje 3: medidas para la Integración socioeconómica de la actividad** a través de conocer y valorar la profesión. También se establece la necesidad de ayudas (Programas de Desarrollo Rural) y agrupaciones profesionales.
- Eje 4: Conservación de la infraestructura viaria** mediante el desarrollo de un programa de recuperación de vías pecuarias.
- Eje 5:** Medidas relacionadas con la **sanidad animal de la ganadería trashumante** y posibilidades de simplificación de procesos y tramites.
- Eje 6:** Medidas para la **puesta en valor de la trashumancia** a través de campañas y el fomento de proyectos y programas.
- Eje 7: Proyección internacional** a través de reconocimientos y establecimiento de estrategias internacionales.

29. RECURSOS CINEGÉTICOS, PISCÍCOLAS Y ASTACÍCOLAS. TÉCNICAS DE CAZA Y ESPECIES CINEGÉTICAS. PRINCIPALES ACTIVIDADES PISCÍCOLAS. NORMATIVA, ORDENACIÓN Y PLANES. NORMATIVA EN MATERIA DE SANIDAD DE LA FAUNA SILVESTRE Y CINEGÉTICA. JUNTA NACIONAL DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA. ESTRATEGIA NACIONAL DE GESTIÓN CINEGÉTICA.

RECURSOS CINEGÉTICOS, PISCÍCOLAS Y ASTACÍCOLAS.

- **Más del 80% del territorio** nacional es coto de caza, donde se mueven más de **800,000 cazadores**.
- La caza y la pesca son actividades **sumamente importantes en el medio rural**, con carácter cultural y que pueden usarse eficazmente como sistema de gestión de poblaciones y del medio.
- Ha **bajado el número de cazadores** (1990: 1.443.514 licencias → 2021: 681.023 licencias) y **pescadores** (1990: 851.053 licencias → 2021: 417.218 licencias)
- **La CC.AA. con más cazadores** es Andalucía (220.594), seguida de CyL. y CLM. **La CC.AA. con más pescadores** es CyL (93.173) seguida de CLM y Cataluña.
- La especie **más abatida** de caza mayor es **el jabalí (61%)**, seguida del ciervo (19%). En caza menor, la **más abatida** de mamíferos es el **conejo (91%)**, mientras que en aves es el **zorzal (38%)** seguida de la paloma (23%).
- Las especies **más pescadas** son la **trucha arco-iris (33%)** y el **cangrejo señal del pacífico (35%)**.
- Las mayores **suestras** se dan en caza menor, en la **perdiz (82%)**. No obstante, son las más bajas en 5 años y un 10% menos que el año anterior.
- Las mayores **producciones** de especies piscícolas se dan en **trucha común (1.151.135 adultos; 1.502.832 huevos y alevines)** y **Tenca (924.859)**, y las mayores suestras se dan en Aragón (2.003.924) y Extremadura (1.269.093).
- **La CC.AA. con mayores producciones** de especies cinegéticas es **Andalucía (353.400)** seguida de CLM (323.381).
- La mayoría del territorio **son cotos privados (70%)** y cotos deportivos (15%), localizados mayoritariamente en CyL, CLM y Andalucía.
- La **red fluvial** de nuestro país se estima en **72.000km** (50.000 ciprínidos, 20.000 trucheros y 2.000 salmoneros) + **500.000 ha de embalses** o superficies similares.
- La mayor parte del **territorio pescable** son masas de **aguas libres (114.283ha)** y **cotos**, localizado mayoritariamente en Extremadura, seguido de CLM.
- La **astacifactoría** es el conjunto instalaciones o estanques para producción natural o artificial de cangrejo en cautividad.

TÉCNICAS DE CAZA Y ESPECIES CINEGÉTICAS.

CAZA MAYOR

- **Montería:** cacería **colectiva + perros y/o batidores**. Los perros o batidores (sin armas de fuego) levantan las piezas de caza y las obligan a dirigirse hacia los cazadores, localizados en **puestos fijos**. Los batidores pueden conducir **rehalas**, que varían entre 10-28, cada una con entre 14-28 perros. **Piezas:** ciervo, venado y jabalí.
- **Gancho o batida:** cacería **colectiva + perros y/o batidores** (sin armas de fuego) levantan las piezas de caza y las obligan a dirigirse hacia los cazadores (**max. 20**), localizados en **puestos fijos**. **Cazadores + batidores <28 y <30 perros.**(Un gancho o batida es una montería en pequeño). **Piezas:** ciervo, venado y jabalí.

- **Rececho:** **1 cazador** a pie busca, sigue, se aproxima y captura piezas. Se permite el **empleo de perros para el cobro** de la pieza herida (después del lance). Suele ser común que el cazador vaya **acompañado de un guarda**. Piezas: cabra montesa, corzo y ungulados (trofeos de medalla).
- **Aguardo o espera:** **1 cazador** espera en **puesto fijo** a que pase la pieza. Sistema **muy selectivo**. Piezas: jabalí (posibles autorizaciones nocturnas).
- **Al salto:** **1 cazador + 3 perros (max.)** busca y sigue las piezas para capturarlas. Es como el rececho, pero se permite el uso del perro antes de disparar. Piezas: jabalí
- **En mano:** **2-6 cazadores** que pueden ir o no con perro, pero limitados hasta 6 perros, que se mueven en cuadrilla y buscan, siguen y capturan las piezas. (como una caza al salto pero entre varios).

CAZA MENOR

- **Al salto o a rabo:** **1 cazador con (a rabo) o sin (al salto) perros** busca, sigue, se aproxima y captura las piezas. Los perros son de rastro (sabueso) o de muestra (setter, pointer, braco...).
- **En mano:** **varios cazadores, con o sin perros**, buscan, siguen y capturan las piezas. Los cazadores suelen **avanzar en línea** precedidos por los perros. Piezas: perdiz y codorniz
- **Ojeo:** cacería **colectiva** (por lo tanto bastantes cazadores) con ayuda de **batidores y/o perros** que levantan las piezas y las obligan a dirigirse hacia los cazadores localizados en **puestos fijos**.
- **Espera o aguardo:** **1 o varios cazadores** situados **puestos fijos** esperan a que las piezas pasen por delante. piezas: palomas en migración y acuáticas
- **Liebre con galgo:** **1 o varios cazadores, a pie o a caballo**, buscan las piezas y **sueltan los galgos** para que las capturen. Solo se permite la **captura a diente** (sin armas). Se podrán emplear un máximo de 3 galgos siempre que 1 de ellos tenga < 11 meses.
- **Zorro con perros de madriguera:** **1 o varios cazadores** acompañados por **perros de madriguera** (Foxterrier, Jackterrier, Teckel...) acosan a los zorros en sus refugios. Se permite el empleo de otros medios de caza de manera simultánea.
- **Cetrería:** **1 cazador** acompañado de **1 rapaz** realiza el lance para que el ave capture a la pieza.
- **Conejos con hurón:** Modalidad practicada por **1 solo cazador o por una cuadrilla de ellos**, quienes, mediante **hurones**, acosan a los conejos en sus refugios con el fin de sacarlos de los mismos y ser capturados mediante los medios autorizados.
- **Perdiz con reclamo:** consiste en que el **cazador, apostado en un lugar fijo** y con ayuda de un **reclamo macho de perdiz**, espera a que acudan atraídas por esta pieza de su misma especie.
- **Zapeo o gancho de conejos:** modalidad usada **exclusivamente para el conejo**, consistente en batir un determinado terreno por las personas **batidoras con o sin ayuda de perros** para que los conejos ahuyentados pasen por una **línea de cazadores apostadas en lugares fijos**.
- **Caza de paloma torcaz y zorzales en pasos:** Modalidad de **espera o aguardo** referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves **durante su período hábil** en la que los **puestos de tiro**, tanto aislados como en línea, son fijos, normalmente con una separación mínima de metros entre ellos y están emplazados en los pasos de estas especies.
- **Caza de acuáticas desde puestos fijos:** Modalidad de **caza colectiva de espera o aguardo** referida a las especies cinegéticas de este grupo de aves **durante su período hábil** en la que los puestos de tiro son fijos, con una separación mínima de metros entre ellos.
- **Tiradas de caza menor:** Modalidad de **caza colectiva** realizada, **sin finalidad comercial**, sobre piezas de **caza menor liberadas en cotos** de caza con la intención de su captura inmediata o en un corto periodo de tiempo, durante los períodos y días hábiles previamente establecidos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES PISCÍCOLAS.

Se considera que las actividades relacionadas con el manejo y planificación de los recursos piscícolas conforman la **gestión de la pesca**. Estas actividades se pueden agrupar en:

- **Inventariación de los recursos piscícola:** conjunto de actividades dirigidas a conocer la cantidad y la distribución del recurso pesquero.
- **Ordenación de la pesca:** trata de la planificación y la regulación de la pesca. Se indicará el límite de capturas, el tamaño mínimo, el nº de pescadores al día, las épocas de vedas, se tendrán en cuenta las especies que demandan capturar, etc.
- **La vigilancia y control:** que se cumplen con los planes de ordenación.

NORMATIVA, ORDENACIÓN Y PLANES

LEY 1/1970 (4-ABR) DE CAZA. (9 TÍTULOS, 3 CAPÍTULOS, 53 ARTÍCULOS (36 DEROGADO), 1 DISP. ADICIONALES, 2 DISP. TRANSITORIAS, 3 DISP. FINALES).

Cazar: acción ejercida por el hombre mediante el uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos en esta Ley como piezas de caza. Obligaciones:

- El **cazador**:
 - > 14 años (permiso)
 - Licencia de caza
 - Si se usan armas, tener mayoría de edad o ir con cazador mayor de edad
 - Permiso de armas

Clasificación de la caza:

- **Caza mayor:** la cabra montés, el ciervo, el corzo, el gamo, el jabalí, el lince, el lobo, el muflón, el oso, el rebeco y cuantas especies sean declaradas por el Ministerio de Agricultura.
- **Caza menor:** No define ninguna salvo las que sean declaradas

Terreno de caza:

- **Aprovechamiento común:** Sin limitaciones especiales. Terrenos libres. Prohibido cazar en terrenos libres (salvo lo que ordene la Orden de vedas).
- **Aprovechamiento en régimen especial:** Los espacios protegidos, refugios de caza, reservas de caza, zonas de seguridad, cotos y los cercados y adscritos al régimen de caza controlada.
 - **En los terrenos cercados: Prohibido cazar** permanentemente, salvo que exista accesos practicables (terreno abierto). → Por eso los cotos deben tener zonas de acceso.

Por otro lado:

- **Refugios de caza:** Establecidos por **Decreto de la Consejería**. Protegen determinadas especies de caza (Denom. **Estaciones biológicas o zoológicas**). **Prohibido cazar** permanentemente (salvo excepciones puntuales, como el control poblacional).
- **Reservas Nacionales de caza:** núcleos con excepcionales características. **Consejería** como responsable.
- **Zona de seguridad:** Se adoptan medidas de protección a personas y bienes.
- **Zonas de caza controlada:** Constituidos por **Consejería** en terrenos de aprov. Común.
- **Coto deportivo de caza:** cotos sin ánimo de lucro
- **Coto privado de caza:** 1 titular (250 ha menor, 500 ha mayor) o varios titulares (500 ha menor, 1.000 ha mayor). Excepción para 1 titular con caza menos de pelo (20 ha)
- **Coto local de caza:** Ayto, entidades locales menores y Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos (500 ha menor y 6 años, 1.000 ha mayor y 9 años. <75% municipio)

- **Coto social de caza:** En terreno del Estado, de cotos a disposición de la DG o cotos locales en derecho de tanteo DG

Orden general de vedas:

- Establece limitaciones y épocas hábiles de caza para cada especie
- Se protegen especies de interés científico, en extinción, las beneficiosas para la agricultura, hembras y crías y afectadas por convenios.
- Establece fijar épocas y zonas para especies consideradas peligrosas y autorizarán medios de defensa.

Limitaciones, responsabilidades y obligaciones:

Prohibido:

- Cazar 1h antes salida sol y 1h después de la puesta, los días de fortuna (días en los que la fauna está más débil, por ejemplo, en una sequía) y días de nieve (por las huellas), a no ser que sea caza de montaña.
- Portar armas fuera de época de veda.
- Destruir nidos o vivares, o recoger crías o huevos.
- Transportar y vender piezas muertas en época de vedas.

Responsabilidad:

- Titular aprovechamiento es responsable de daños de ejemplares cinegéticos de sus terrenos acotados, y subsidiariamente los dueños de los terrenos.
- Cazador responsable de daños causados por su acción.

Obligaciones:

- Licencia de caza.
- Seguro de responsabilidad civil.
- Licencia de caza especial para cetrería, hurones o rehalas.

La Ley de caza crea un **Consejo Provincial de Caza** por provincia.

Mencionar que, al ser una ley preconstitucional, la Ley está vigente en todo lo que no contravenga a la CE. Pero además hay algunas modificaciones, como por ejemplo el régimen sancionador, que queda al amparo de la Ley Orgánica 10/1995 del **Código Penal**, que establece que se deroga todo el régimen sancionador, salvo lo que no venga recogido en el código penal, que se considerará como falta muy grave. Por otro lado, la Ley 42/2007 del PNYB establece otras modificaciones, así como el RD 581/2001, que prohíbe la tenencia y uso de municiones con plomo en el ejercicio de la caza y tiro deportivo.

Comisos y decomisos de caza

Los comisos se pueden efectuar cuando se comete una infracción.

Los **comisos** se efectúan siempre que hay una infracción, estando viva (según reglamento) o muerta (entrega a Centro Benéfico Local o Ayto.).

Los **decomisos** se realizan sobre las artes y medios (subasta de los legales y destrucción de los ilegales). En caso de animales, se sustituye por abono de cantidad prefijada por ejemplar.

La **retirada del arma** se regula reglamentariamente, bajo entrega de recibo y depósito ante la Guardia Civil. La devolución del arma es gratuita en infracciones leves.

DECRETO 506/1971 (25-MAR) APRUEBA REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY DE CAZA

Respecto al terreno:

- **Zonas de Seguridad:**

- En vías, caminos y aguas publicas tendrán su límite donde se establezca según las leyes del dominio público.
- Núcleos urbanos, rurales y áreas habitadas tendrán su límite en 100m desde la última edificación en todas direcciones.
- Villas, edificios aislados, jardines y parques tendrán su límite en 50m en todas direcciones.
- Centros deportivos tendrán su límite hasta donde llegue sus instalaciones (cercado o perímetro marcado).

Se **prohíbe** disparar hacia estas zonas si el cazador no se separa más allá del alcance del proyectil.

- **Carreteras:** Prohíbe el uso de armas en la zona de seguridad y en una franja de 50m.
- **Caminos, vías férreas y canales navegables:** Prohíbe el uso de armas en la zona de seguridad y en una franja de 25m.
- **Núcleos urbanos, zonas habitadas, parques, villas, jardines y centros deportivos:** Prohíbe el uso de armas en la zona de seguridad salvo autorización con fines deportivos.
- **Vías pecuarias y aguas publicas:** Permitido siempre que no ponga en riesgo a personas, ganado o animales domésticos. Permite limitaciones en casos especiales.

Respecto al aprovechamiento:

- **Posibilidad de comercio:** Siempre que estén vivas y provengan de cotos o granjas cinegéticas. En caso de caza mayor muerta, que estén marcadas/precintadas, y si es caza menor muerta que cuenten con guía de circulación y precinto.
- **Perros**
 - **Rehalas:** 16-40 perros
 - **Tránsito en zonas de seguridad:** Los perros de caza deben ir controlados eficazmente. Los perros de personas **sin licencia de caza** deben asegurar que el perro no molesta o daña a la fauna. Limitación de llevar perro suelto sin licencia de caza **a >50 m** en zonas abiertas y **<15 m en zonas con vegetación** → Perro vaga fuera de control, lo que implica **caza sin licencia**.
 - Los perros pastores **no entran en estas categorías** mientras el perro este bajo la vigilancia y alcance del pastor.
 - Se establecen **zonas de adiestramiento** por la Consejería.
 - **Monterías:** 10 o + cazadores con 16 o + perros.

Procedimiento inicio expedientes por infracción administrativa a la Ley de Caza

- Se hace la **Denuncia** en plazo de 48h, donde figure:
 - Denunciante
 - Datos personales de denunciados
 - Fecha de infracción y fecha del acta
 - Hechos (descripción)
 - Caza y artes ocupados y su destino (puesto Guardia Civil)
- Con respecto al **comiso de caza, medios, artes y animales**

- **Si la caza está viva:** Debemos dar destino de ella. Depósito provisional en centro adecuado o liberación ante testigos. Los animales de peligroso manejo quedarán depositados ante el infractor previa entrega de recibo. De negarse, se sacrificarán y se considerarán caza muerta
- **Caza muerta:** Entrega en Centro Benéfico Local o Ayto. En caso de alto valor de la pieza, el instructor podrá establecer la naturalización de todo o parte de él (se disecca).
- **Artes materiales:** Quedaran ocupados y a disposición del instructor como prueba. Los legales se subastarán públicamente y los ilegales se destruirán.
- **Animales de caza:** en animales especiales se sustituye el comiso por abono de cantidad dineraria por ejemplar. En animales genéricos se dejan depositados ante el infractor previa entrega de recibo anexo a la denuncia.
- **Armas:** Solo se retiran cuando son usadas para cometer la infracción. Se realizará entrega de recibo y entrega ante Guardia Civil en 48h.

REAL DECRETO 1095/1989 (8-SEP) DECLARAN LAS ESPECIES OBJETO DE CAZA Y PESCA Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA SU PROTECCIÓN

En el Anexo I se recoge la lista de especies, que luego las CCAA pueden decidir si retiran alguna o no:

Caza mayor		caza menor		Aves Acuáticas	
Nombre Científico	Nombre Común	Nombre Científico	Nombre Común	Nombre Científico	Nombre Común
<i>Sus scrofa</i>	Jabalí	<i>Alectoris graeca</i>	Perdiz griega	<i>Anser fabalis</i>	Ánsar campestre
<i>Cervus elaphus</i>	Ciervo (Venado)	<i>Alectoris rufa</i>	Perdiz roja	<i>Anser anser</i>	Ánsar común
<i>Dama dama</i>	Gamo	<i>Alectoris barbara</i>	Perdiz moruna	<i>Anas penelope</i>	Ánade silbón
<i>Capreolus capreolus</i>	Corzo	<i>Perdix perdix</i>	Perdiz pardilla	<i>Anas strepera</i>	Ánade friso
<i>Rupicapra rupicapra</i>	Rebeco	<i>Phasianus colchicus</i>	Faisán común	<i>Anas crecca</i>	Cerceta común
<i>Capra pyrenaica</i>	Cabra montés	<i>Coturnix coturnix</i>	Codorniz común	<i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade real (Azulón)
<i>Ovis musimon</i>	Muflón	<i>Scolopax rusticola</i>	Becada	<i>Anas acuta</i>	Ánade rabudo
<i>Ammotragus lervia</i>	Arruí	<i>Columba livia</i>	Paloma bravía	<i>Anas querquedula</i>	Cerceta carretona
		<i>Columba palumbus</i>	Paloma torcaz	<i>Anas clypeata</i>	Pato cuchara
		<i>Columba oenas</i>	Paloma zurita	<i>Aythya ferina</i>	Porrón común
		<i>Streptopelia turtur</i>	Tórtola común	<i>Aythya fuligula</i>	Porrón moñudo
		<i>Turdus pilaris</i>	Zorzal real	<i>Netta rufina</i>	Pato colorado
		<i>Turdus philomelos</i>	Zorzal común	<i>Fulica atra</i>	Focha común
		<i>Turdus iliacus</i>	Zorzal alirrojo	<i>Vanellus vanellus</i>	Avefría
		<i>Turdus viscivorus</i>	Zorzal charlo	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	Agachadiza chica
		<i>Sturnus vulgaris</i>	Estornino pinto	<i>Gallinago gallinago</i>	Agachadiza común
		<i>Pica pica</i>	Urraca	<i>Larus ridibundus</i>	Gaviota reidora
		<i>Corvus monedula</i>	Grajilla	<i>Larus cachinnans</i>	Gaviota patiamarilla
		<i>Corvus corone</i>	Corneja negra		
		<i>Lepus spp.</i>	Liebre		
		<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo		
		<i>Vulpes vulpes</i>	Zorro		

LEY 20 FEBRERO 1942, REGULA EL FOMENTO Y CONSERVACIÓN DE LA PESCA FLUVIAL

6 Títulos 14 Capítulos 68 Artículos (59 y 60 derogados)

Establece las **dimensiones mínimas** de los peces.

Obligatoriedad de colocar rejillas en tomas de agua, dejar caudales mínimos y establecer obras de paso.

Fija **épocas de veda**, pero son modificadas por la orden anual.

Prohibiciones:

- Construir barreras para encauzar aguas y peces
- Usar luces o aparatos punzantes en la pesca

- Usar artes de tirón, ancla, cordelillo y sedal durmiente
- Uso de artes fijas
- Pescar sobre aparatos de flotación de anchura rígida y permanente
- Usar dinamita o materiales explosivos (sust. Químicas que exploten)
- Usar sustancias venenosas o desoxigenadoras para los peces
- Apalear las aguas y espantar a los peces para beneficio propio
- Pescar a mano o con arma de fuego y golpear piedras refugios
- Reducir el caudal de las aguas arbitrariamente
- Emplear medios de pesca nocivos

Esta Ley regula las **Concesiones** para crear cotos de pesca (puedes tener una primera concesión y después puede ampliarla por decenios consecutivos)

En **aguas públicas**, los peces carecen de dueño (en privadas del titular). Establece las **funciones** de policía, custodia y vigilancia, pero no a los cuerpos actuales (ley preconstitucional). Por trasposición estas funciones se transfieren a los **Cuerpo Agentes Forestales**.

Comiso de artes y pesca ilícitas (destrucción de las ilegales) **Prescripción** del acto de denuncia (2 meses) y responsabilidad (1 año).

ORDENACIÓN Y PLANES

Caza

Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre (derogada por la **Ley 42/2007** del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), **la caza** debe estar **obligatoriamente ordenada** para su aprovechamiento a nivel de unidad de gestión (normalmente, un coto). Esto es la **planificación del recurso cinegético** plasmado en un documento de gestión, o proyecto de ordenación, denominado **Plan Técnico de Caza**.

Todos los titulares de los cotos de caza están obligados a presentar ante la Administración un **Plan Cinegético**, o instrumento equivalente, y son responsables de su cumplimiento. Estos se realizan por un técnico designado por el titular, que realizara el **Plan de aprovechamiento** (especie, cuantía, modalidad y temporadas) y de mejoras (acciones para fomentar y mejorar las poblaciones).

¿Un plan de aprovechamiento puede establecer un periodo de caza fuera del periodo de vedas? Podría ser que **sí**, pero es un caso excepcional, bajo autorización de la Administración, si el motivo está fundamentado en un aval científico/técnico suficiente.

Pesca

Las **CC.AA.** tienen atribuidas las competencias en materia de ordenación, planificación, regulación y gestión de los recursos piscícolas y la pesca continental, por ello con el fin de regular el ejercicio de la pesca, es habitual que **dichas CC.AA. redacten la planificación piscícola** a distintos niveles.

Para ello redactan el **Plan Regional de Ordenación Piscícola o Plan General de Ordenación Piscícola** (instrumento básico regional) y los **Planes Técnicos** (Desarrollan el plan básico y permiten la redacción de **Planes Anuales**, que son los que regulan la actividad en los cotos)

LEY 8/2003 (24-ABR) DE SANIDAD ANIMAL.

La UE tiene cedida la soberanía en materia de sanidad animal, por lo que en España es de aplicación el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 de sanidad animal.

Dentro del marco estatal, es de aplicación la Ley 8/2003 de Sanidad Animal, que tiene como fines:

- La **prevención, lucha, control y erradicación** de las enfermedades de los animales
- La **mejora sanitaria** de los animales, de sus explotaciones, de sus productos y de la fauna de los ecosistemas naturales
- La **prevención de la introducción** en el territorio nacional, y en el resto de la Unión Europea, **de enfermedades** de los animales, evitando la propagación La **protección de la salud humana y animal** mediante la prevención, lucha, control y, en su caso, erradicación de las enfermedades de los animales susceptibles de ser transmitidas a la especie humana o que impliquen riesgos sanitarios que comprometan la salud de los consumidores
- La **prevención de los riesgos para la salud humana** derivados del **consumo de productos alimenticios** de origen animal que puedan ser portadores de sustancias o aditivos nocivos o fraudulentos, así como de residuos perjudiciales de productos zoonos sanitarios o cualesquiera otros elementos de utilización en terapéutica veterinaria
- La **prevención de los riesgos para la sanidad animal** derivados de la **utilización incorrecta de productos zoonos sanitarios**, de la administración de productos nocivos y del consumo de productos para la alimentación animal que contengan sustancias capaces de desencadenar la aparición de enfermedades en los animales
- La **evaluación de los riesgos para la sanidad animal** del territorio nacional, teniendo en cuenta los testimonios y evidencias científicas existentes, los procesos y métodos de producción pertinentes, la actividad económica subyacente, la pérdida de rentas, los métodos pertinentes de inspección, muestreo y prueba, la prevalencia de enfermedades concretas, la existencia de zonas libres de enfermedades y las condiciones ecológicas y ambientales
- Lograr un **nivel óptimo de protección de la sanidad animal** contra sus riesgos potenciales, teniendo en cuenta los factores económicos de la actividad pecuaria y, entre ellos, el posible perjuicio por pérdida de producción o de ventas en caso de entrada, difusión o propagación de una enfermedad, los costos de control o erradicación y la relación coste-beneficio de otros posibles métodos para limitar los riesgos.

Fauna silvestre: «conjunto de especies, subespecies, población e individuos animales que **viven y se reproducen de forma natural en estado silvestre** en el territorio nacional, incluidos los que se encuentran en invernada o están de paso, con independencia de su carácter autóctono o alóctono, y de la posibilidad de su aprovechamiento cinegético». → por lo tanto, quedan excluidos los domésticos, ganados y de experimentación.

Toda persona, física o jurídica, pública o privada, está **obligada a comunicar todos los focos** de que tenga conocimiento **de enfermedades** de carácter epizootico, o que por su especial virulencia, extrema gravedad o rápida difusión impliquen un peligro potencial de contagio para la población animal, **incluida la doméstica o silvestre**, o un riesgo para la salud pública o para el medio ambiente.

En materia de prevención la ley impone una serie de **obligaciones a los propietarios o responsables** de los animales:

- **Vigilar** a los animales.
- **Facilitar toda clase de información** que les sea requerida por la autoridad competente sobre el estado sanitario de los animales que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad.
- **Aplicar y llevar a cabo todas las medidas sanitarias** impuestas por la normativa vigente en cada caso, así como las medidas sanitarias obligatorias que se establezcan para prevenir las enfermedades de los animales, o consentir su aplicación, así como poner los medios necesarios para que se puedan realizar las citadas medidas con las debidas garantías de seguridad, tanto para los animales objeto de aquéllas como para el personal que las ejecute.
- **Comunicar** a las Administraciones públicas, en tiempo y forma, **los datos sanitarios exigidos** por la normativa aplicable en cada caso, en especial los relativos a la **aparición reiterada de animales muertos** de la fauna silvestre.
- Proceder a la **eliminación o destrucción de los cadáveres de animales**, que tengan bajo su responsabilidad, en la **forma y condiciones** establecidas en la normativa aplicable en cada caso.
- **Solicitar los certificados o documentación sanitaria exigibles** para la importación y exportación, en la forma y condiciones previstas reglamentariamente.
- **Mantener las condiciones sanitarias** adecuadas de las especies cinegéticas, a fin de evitar la aparición de enfermedades.
- **Comunicar a la autoridad competente** las enfermedades de los animales de que tenga sospecha.

Obligaciones a titulares o responsables de animales (cinegéticos y silvestres también):

- Mantener los animales en **buen estado sanitario**.
- **Aplicar las medidas sanitarias obligatorias** que se establezcan para luchar, controlar o erradicar las enfermedades de los animales, o consentir su aplicación, así como poner los medios necesarios para que se puedan realizar las citadas medidas con las debidas garantías de seguridad, tanto para los animales objeto de éstas como para el personal que las ejecute.
- Efectuar las **revisiones y modificaciones en las instalaciones**, que disminuyan el riesgo de aparición de enfermedades.
- Mantener el **equilibrio de la fauna silvestre** en sus aspectos sanitarios.

La **confirmación definitiva** de la existencia de la enfermedad determinará que por la CC.AA. se realice la **declaración obligatoria oficial** de su existencia, en los términos que establezca la normativa de aplicación, efectuando su **notificación oficial al Ministerio** competente en materia de ganadería, actuándose del modo establecido en cada caso y procediéndose a la ratificación, complementación o rectificación de las medidas sanitarias.

Tanto en **fase de sospecha**, como una vez **confirmado el diagnóstico** de la enfermedad, por la autoridad competente de que se trate podrá establecerse el sacrificio obligatorio de los animales sospechosos, enfermos, que corran el riesgo de ser afectados, o respecto de los que así sea preciso.

La **declaración oficial de la extinción** de la enfermedad se debe realizar por el **mismo órgano y procedimiento** por el que se declaró su existencia, una vez realizadas todas las medidas de intervención y saneamiento y transcurridos los plazos que en cada caso se determinen.

Se **prohíbe la venta ambulante de animales**, con las excepciones que puedan establecerse reglamentariamente.

El **movimiento de animales**, salvo los domésticos, y para el movimiento de óvulos, semen o embriones, se precisa la **emisión de un certificado sanitario** de origen emitido por veterinario oficial o, en su caso, por veterinario autorizado o habilitado al efecto por los órganos competentes de las comunidades autónomas.

REAL DECRETO 1082/2009 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS DE SANIDAD ANIMAL PARA EL MOVIMIENTO DE ANIMALES DE EXPLOTACIONES CINEGÉTICAS, DE ACUICULTURA CONTINENTAL Y DE NÚCLEOS ZOOLOGICOS, ASÍ COMO DE ANIMALES DE FAUNA SILVESTRE.

Establece los requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales (especies cinegéticas, acuicultura continental o fauna silvestre), dentro de España, entre explotaciones cinegéticas, núcleos zoológicos (más de 5 animales) o espacios naturales acotados.

- Quedan **excluidos** perros de caza, aves cetreras, lombricultura, canaricultura y actividades deportivas realizadas con animales.
- **Prohíbe el movimiento de animales de fauna silvestre, cinegéticos o de acuicultura continental** cuando exista la **sospecha** de la presencia en los mismos de enfermedades de carácter epizootico, virulentos o de especial importancia (**no en caso** de traslado a centros de recuperación).
- Los **titulares son los responsables del mantenimiento de la fauna silvestre** de los espacios naturales acotados, deben llevar, de manera actualizada, un **libro de registro** de forma manual o informatizada, que será accesible para la autoridad competente.

REAL DECRETO 526/2014 POR EL QUE SE ESTABLECE LA LISTA DE LAS ENFERMEDADES DE LOS ANIMALES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA Y SE REGULA SU NOTIFICACIÓN

- Determina las enfermedades de los animales sujetas a **declaración obligatoria** en el ámbito de España, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de Sanidad Animal, así como los **requisitos para su notificación**.

REAL DECRETO 50/2018 POR EL QUE SE DESARROLLAN LAS NORMAS DE CONTROL DE SUBPRODUCTOS ANIMALES NO DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO Y DE SANIDAD ANIMAL, EN LA PRÁCTICA CINEGÉTICA DE CAZA MAYOR

Realiza la **gestión de los subproductos** generados por la caza para evitar que sirvan de alimento a carnívoros oportunistas y jabalíes. Pretende establecer los **procedimientos de recogida, transporte, uso y eliminación** de los subproductos no destinados al consumo humano.

Es de aplicación a **todas las modalidades cinegéticas de caza mayor colectiva (cacerías)**, de >40 puestos o >20 piezas abatidas/jornada.

Establece **3 categorías para el material** obtenido de la caza:

- **Material cat. 1:** Partes del cuerpo cuando se **sospeche que están infectados** con enfermedades transmisibles a los seres humanos o a los animales, incluidas las mezclas de estos con otros materiales.
- **Material cat. 3:** Partes del cuerpo que sean **aptos para el consumo humano** con arreglo a la legislación comunitaria pero **no se destinan** a este fin por motivos comerciales (no se destina porque no se vende).
- **Material cat. 2:** El distinto a las categorías 1 y 3.

En cada **cacería habrá un responsable**, que asegurará medios de transporte de los animales abatidos, una zona de análisis de éstos (desinfectada), contenedores para restos, empresa acreditada para retirada de restos y medios para el enterramiento de subproductos.

TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DEL MATERIAL:

Material cat. 1:

Partes del cuerpo cuando se **sospeche que están infectados** con enfermedades transmisibles a los seres humanos o a los animales, incluidas las mezclas de estos con otros materiales.

- Transporte inmediato o a la mayor brevedad a centro autorizado, acompañado de documento del contenido del anexo I expedido por el responsable de la cacería.

Material cat. 3:

Partes del cuerpo que sean **aptos para el consumo humano** con arreglo a la legislación comunitaria pero **no se destinen** a este fin por motivos comerciales.

- Transporte a la mayor brevedad, acompañado de documento del contenido del anexo I expedido por el responsable de la cacería.
- Estos restos irán a eliminación directa (incineración), procesado para fabricación de abonos, alimentación como pienso, compostaje o biogás, alimentación de necrófagos en muladares (tendrán que estar en zonas abiertas, alejadas >4.000 m de aeródromos y >13.000 m de aeropuertos, fuera de cursos de agua, >200 m de zonas de alimentación al ganado, vallados de su explotación, carreteras o caminos, >500 m de viviendas, >1.000 m de tendidos eléctricos y >4.000 m de aerogeneradores), enterramiento u otros usos de alimentación autorizados.

Material cat. 2:

El distinto a las categorías 1 y 3

- Transporte a la mayor brevedad, acompañado de documento del contenido del anexo I expedido por el responsable de la cacería.
- Estos restos irán a eliminación directa, procesado para compostaje, alimentación para necrófagos en muladares (zonas abiertas, alejadas >4,000m de aeródromos y >13,000m de aeropuertos, fuera de cursos de agua, >200m de zonas de alimentación al ganado, vallados, carreteras o similar, >500m de viviendas, >1,000m de tendidos eléctricos y >4,000m de aerogeneradores), enterramiento u otros usos de alimentación autorizados. (diferencia: no va a abonos, piensos, ni biogás).

JUNTA NACIONAL DE HOMOLOGACIÓN DE TROFEOS DE CAZA.

A pesar de que la caza se encuentra entre las competencias transferidas a las CCAA por el **Art. 148.1.11ª de la Constitución Española**, la **Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza** ha venido manteniendo sus funciones de medición, homologación y catalogación de trofeos de especies cinegéticas hasta la fecha. Los trofeos son susceptibles de medición mediante normas internacionales, procediendo a su homologación y archivo por la Junta Nacional.

Actualmente se regula a través de la **Orden AAA/1231/2013**, de 1 de julio, por la que se regula la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.

- La Junta está **compuesta** por un total de **24 miembros: 1 presidente** (designado por el ministerio), **1 vicepresidente** (designado por el ministerio de entre los altos cargos del departamento), **1 secretario** (con voz, pero sin voto. Funcionario de nivel 24) y **21 vocales** (7 de CC.AA. + 12 representantes del sector + 2 representantes del ministerio).

- La junta **define las fórmulas de valoración de cada especie**, los **procedimientos de homologación** para acceder a los listados del archivo nacional, **coopera** para la aplicación de las fórmulas de medición, **define los sistemas** de catalogación de los trofeos, facilita el **intercambio de información**, sirve como **entidad colaborativa** con otros organismos, actúa como **órgano consultivo** en materia de caza, **informa** de producciones y mercados agrarios, **mide y homologa** toda clase de trofeos, **elabora los catálogos** de trofeos de caza, **protege la diversidad biológica** y **pone en valor** los recursos cinegéticos.
- La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza **puede exigir**, con carácter **previo** a la catalogación de las homologaciones de trofeos, **cuantos datos e informes considere necesarios** para comprobar la veracidad de los antecedentes de sus capturas, su lugar y su fecha, así como la identidad de su propietario. Un trofeo oficialmente homologado y catalogado no podrá volver a medirse.
- **Fases y proceso** de catalogación
 - **Recepción del trofeo:** datos de la persona que entrega, datos del propietario, datos del trofeo y datos del titular del coto.
 - **Medición:** el resultado queda reflejado en la ficha documental. Dicha actividad consiste en la medición de diferentes parámetros del trofeo en cuestión, en función de la especie de que se trate. El resultado de dicha medición será una puntuación global, presentada como una calificación.

ESTRATEGIA NACIONAL DE GESTIÓN CINEGÉTICA.

Esta estrategia aparece recogida en la disposición adicional 4ª de la Ley 21/2015, de 21 de julio, de modificación de la Ley 43/2003 de Montes. Es decir, es una disposición que se recoge en esta Ley, no que haya modificado la Ley de Montes para que aparezca.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las comunidades autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética con el objetivo final de que constituya el marco orientativo y de coordinación de la gestión cinegética a escala estatal, cuyas disposiciones pueden ser incorporadas voluntariamente por las Administraciones competentes.

Esta Estrategia fue aprobada por la **Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural** el 2 de marzo de 2022.

La Estrategia ha definido **5 objetivos**:

1. Defensa de un **modelo de caza sostenible** integrado en el **desarrollo rural** y como elemento de **lucha contra la despoblación**, y para la **gestión del medio natural**, en equilibrio con otras funciones, servicios, aprovechamientos y usos del medio.
2. Establecimiento de **directrices de gestión** de la actividad cinegética, que permitan su ejercicio ordenado y sostenible, adaptadas a las necesidades y nuevos retos de la gestión.
3. Puesta en marcha de **sistemas de información y monitorización** de la caza interoperables y basados en el mejor conocimiento científico disponible. (seguimiento de las poblaciones y presiones, y mejorar el Inventario Español de Caza y Pesca).
4. Fomento de la **coordinación interadministrativa e intersectorial**, integración de las demandas sociales, económicas y medioambientales en la gestión.
5. **Mejora de la imagen social** de la caza, y promoción de sus beneficios medioambientales, socioeconómicos, así como la **formación de cazadores** y fomento de buenas prácticas en el sector.

El horizonte temporal de la Estrategia es **indefinido**, pero será revisada cada **5 años**.