

## 低氘水對不同腫瘤的敏感度列表

各種起源性腫瘤或轉移後腫瘤，對低氘水的敏感度也不同，我們研究了數千個病例後，歸納總結為四種類型：

**【高敏感性】**低氘水對這類腫瘤都有很好的治療效果，而且 70-80% 的患者幾周內就會出現明顯的腫瘤衰退。

**【一般敏感性】**這些腫瘤對低氘水不是特別敏感，但大多患者在持續飲用一段時間後，仍可促使腫瘤衰退，病情緩解。

**【低敏感性】**這類腫瘤患者只有少數對低氘水有積極反應，太多的效果不太明顯，但也有能成功遏制腫瘤生長的病例。

**【抵抗性】**根據現有臨床病例統計低氘水對這類腫瘤沒有實質的效果。

高敏感性	一般敏感性	低敏感性	抵抗性
子宮腫瘤	結腸腫瘤	膽囊腫瘤	
子宮頸腫瘤	直腸腫瘤	惡性黑色素腫瘤	
舌部腫瘤	肺部腫瘤	膠質母細胞瘤	
喉部腫瘤	多發性骨髓瘤	胰臟腫瘤	
甲狀腺腫瘤	星狀細胞瘤		
急性淋巴細胞白血病	霍奇金氏淋巴瘤		
慢性淋巴細胞白血病	非霍奇金氏淋巴瘤		
急性粒細胞白血病	卵巢腫瘤		
慢性粒細胞白血病	膀胱腫瘤		
乳腺腫瘤	肝臟腫瘤		
皮膚腫瘤			
睪丸腫瘤			
胃癌			

前列腺腫瘤			
腎臟腫瘤			