

Academia Sabatina de Jóvenes Talento

Polinomios Clase #1

Encuentro: 1

Curso: Polinomios

Fecha: 18 de marzo de 2023

Nivel: 5

Semestre: I

Instructor: Kenny Jordan Tinoco

D. auxiliar: José Adán Duarte

Contenido: Polinomios cuadráticos y cúbicos

En esta primera sesión nos toca acometer las primeras nociones sobre los polinomios. Veremos definiciones, propiedades, características particulares y curiosidades sobre estas expresiones, con el fin de cimentar las bases que son necesarias para el resto del presente curso.

1. Desarrollo

1.1. Definiciones

Definición: Un *polinomio* en x es una expresión de la forma

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

donde n es un entero mayor o igual que cero y a_1, a_2, \dots, a_n son números que pueden ser enteros, racionales, reales o complejos y son llamados los **coeficientes** de $P(x)$. Si $a_n \neq 0$, se dice que $P(x)$ es de *grado* n y se denota por $\deg(P) = n$; en este caso a_n es llamado **coeficiente principal**.

En particular, los polinomios de grado 1, 2 y 3 son llamados *lineal*, *cuadrático* y *cúbico*, respectivamente, y son estos el caso de estudio de esta primera sesión.

$$\text{Lineal: } P(x) = a_1 x + a_0$$

$$\text{Cuadrático: } P(x) = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$\text{Cúbico: } P(x) = a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Veremos a continuación algunas características resaltables sobre los polinomios.

Término principal: El término (monomio) que contiene la mayor potencia es conocido *término principal* y su coeficiente como *coeficiente principal*.

Valor numérico: Resultado que se obtiene al evaluar el polinomio en una constante c , es decir $P(c)$. Además, cuando el valor de c es 0 o 1, el valor numérico es igual al **término independiente** y a la suma de todos los coeficientes, respectivamente. Siendo el término independiente aquel monomio que no tiene variable.

Polinomio mónico: Polinomio cuyo término principal tiene como coeficiente a 1.

Polinomio completo: Polinomio que tiene todos sus términos. Desde el término con exponente n hasta el término con exponente 0.

Polinomio iguales: Diremos que dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ son iguales si y solo si $\deg(P) = \deg(Q) = n$ y $a_i = b_i$, con $0 \leq i \leq n$. Donde a_i, b_i son los coeficientes de $P(x)$ y $Q(x)$, respectivamente.

Polinomio recíproco: Un polinomio $P(x)$ es recíproco si cumple que $a_i = a_{n-i}$, con $0 \leq i \leq n$, donde $\deg(P) = n$.

Polinomio de varias variables: Un polinomio que dependen de más de una variable es llamado multivariante o multivariable, y es denotado por $P(x_1, x_2, \dots, x_k)$.

Polinomio ordenado: Un polinomio es ordenado cuando los exponente de la variable de referencia, guardan cierto orden, ya sea ascendente o descendente.

Polinomio homogéneo: Un polinomio multivariable es homogéneo si todos sus términos tienen el mismo grado absoluto.

1.2. Operaciones con polinomios

Sean dos polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ de grado 3,

$$\begin{aligned} P(x) &= a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \\ Q(x) &= b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \end{aligned}$$

se definen:

Suma: $P(x) + Q(x) = (a_3 + b_3)x^3 + (a_2 + b_2)x^2 + (a_1 + b_1)x + (a_0 + b_0)$

Resta: $P(x) - Q(x) = (a_3 - b_3)x^3 + (a_2 - b_2)x^2 + (a_1 - b_1)x + (a_0 - b_0)$

Multiplicación: $P(x) \times Q(x) = a_3b_3x^6 + (a_2b_3 + a_3b_2)x^5 + (a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1)x^4 + (a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0)x^3 + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + (a_0b_1 + a_1b_0)x + a_0b_0$

Composición: $(P \circ Q)(x) = P(Q(x)) = a_3Q(x)^3 + a_2Q(x)^2 + a_1Q(x) + a_0$. Se lee P compuesto de Q y consiste en remplazar la variable x por Q en P .

En general si $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios no nulos, entonces se verifica que

$$\begin{aligned} \deg(P \pm Q) &\leq \max\{\deg(P), \deg(Q)\} \\ \deg(P \times Q) &= \deg(P) + \deg(Q) \end{aligned}$$

La composición de polinomios es asociativa, es decir, $(P \circ Q) \circ R = P \circ (Q \circ R)$, mas no conmutativa, salvo casos especiales, así que generalmente supondremos que $P \circ Q \neq Q \circ P$.

Una pequeña aclaración: $P(x)^n \neq P^n(x)$. Denotaremos como $P(x)^n$ al polinomio elevado a la n -ésima potencia y a $P^n(x)$ como la composición n -ésima de $P(x)$ con si mismo, es decir $P(P(P \dots P(P(x)) \dots))$ n veces.

2. Problemas propuestos

3. Extra

Referencias

- [Bar89] Edward Barbeau. *Polynomials*. Springer, 1989.
- [BGV14] Radmila Bulajich, José Gómez, and Rogelio Valdez. *Álgebra*. UNAM, 2014.
- [CL22] Axel Canales and Ricardo Largaespada. Clase 1. polinomios cuadráticos y cúbicos. *Academia Sabatina de Jóvenes Talento*, Marzo 2022.

En caso de consultas

Instructor: Kenny J. Tinoco

Teléfono: +505 7836 3102 (*Tigo*)

Correo: kenny.tinoco10@gmail.com

Docente: José A. Duarte

Teléfono: +505 8420 4002

Correo: joseandanduarte@gmail.com