

Colinealidad y Concurrencia Clase #5

Encuentro: 19

Curso: Colinealidad y Concurrencia

Fecha: 19 de agosto de 2023

Nivel: 5

Semestre: II

Instructor: Kenny Jordan Tinoco

D. auxiliar: José Adán Duarte

Unidad II: Colinealidad


Contenido: Teoremas de Colinealidad

1. Desarrollo

Teorema 1.1 (Teorema de Pascal).

Sea $ABCDEF$ un hexágono inscrito (no necesariamente convexo) en una circunferencia Ω . Entonces, los puntos $M = AB \cap DE$, $N = BC \cap EF$ y $P = CD \cap FA$ son colineales.

Demostración. Sean $X = BC \cap DE$, $Y = DE \cap FA$ y $Z = FA \cap BC$.



Al usar el teorema de **Menelao** tres veces en $\triangle XYZ$, primero con la transversal $A-B-M$, después con la transversal $P-C-D$ y finalmente con $F-N-E$, respectivamente, obtenemos que

$$\frac{XM}{MY} \cdot \frac{XA}{AZ} \cdot \frac{ZB}{BX} = 1,$$

$$\frac{XD}{DY} \cdot \frac{XP}{PZ} \cdot \frac{ZC}{CX} = 1 \text{ y}$$

$$\frac{XE}{EY} \cdot \frac{XF}{FZ} \cdot \frac{ZN}{NX} = 1.$$

Multiplicando estas tres igualdades y reordenando los miembros, obtenemos que

$$\frac{XM}{MY} \cdot \frac{XM}{MY} \cdot \frac{XM}{MY} \cdot \frac{(YA \cdot YF) \cdot (ZB \cdot ZC) \cdot (XD \cdot XE)}{(AZ \cdot FZ) \cdot (BX \cdot CX) \cdot (DY \cdot EF)} = 1. \quad (*)$$

Ahora por la **Propiedad 2.1** sabemos que para los puntos X , Y y Z se cumple que

$$XD \cdot XE = XC \cdot XB \quad \wedge \quad YF \cdot YA = YE \cdot YD \quad \wedge \quad ZB \cdot ZC = ZA \cdot ZE$$

Así (*) se convierte en

$$\frac{XM}{MY} \cdot \frac{XP}{PZ} \cdot \frac{ZN}{NX} = 1,$$

que por el teorema de **Menelao** significa que M , N y P son colineales. ■

Observación 1.

Una manera fácil de recordar las intersecciones es la siguiente: Tomamos dos letras consecutivas, dejamos una letra de espacio, y tomamos otras dos letras consecutivas. La intersección de las rectas formadas con esos pares de puntos es el primer punto de la colinealidad. Luego nos movemos a la derecha y repetimos el proceso dos veces más.^a




Figura 1: Teorema de Pascal.




Figura 2: Mnemotécnica de Pascal.

^aOtra manera de verlos es tomar vértices consecutivos módulo 3.

El **Teorema 1.1** es independiente de cómo haya sido tomado el hexágono. El mostrado en la demostración es el caso más sencillo en el cual el hexágono es convexo. Sin embargo, la colinealidad se sigue cumpliendo aunque el hexágono no sea convexo, como se puede ver en la figura 1. La demostración de este caso y de cualquier otro es análoga a la primera.

Ejemplo 1.1.

Sean D y E los puntos medios de los arcos menores \widehat{AB} y \widehat{AC} del circuncírculo del $\triangle ABC$, respectivamente. Sea P un punto en el arco menor BC , $Q = PD \cap AB$ y $R = PE \cap AC$. Probar que la recta QR pasa a través del incentro I del $\triangle ABC$.

Solución. Dado que D es el punto medio del arco \widehat{AB} , CD es bisectriz del ángulo $\angle BCA$. Análogamente, BE es bisectriz de $\angle ABC$. Por lo tanto, $CD \cap BE = I$. Ahora, aplicando el **Teorema 1.1** al hexágono $CDPEBA$ tenemos que los puntos $CD \cap BE = I$, $DP \cap BA = Q$ y $PE \cap AC = R$ son colineales. ■

El **Teorema 1.1** puede presentar versiones degeneradas, aunque puede suceder, el caso más habitual ya no consiste en un paralelismo, sino en la transformación de un polígono de seis lados a un polígono de cinco, cuatro o tres lados. Como lo podemos ver en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.2.

Sea ω el circuncírculo del $\triangle ABC$. Las tangentes a ω por los puntos A , B y C intersecan a las rectas BC , CA y AB en los puntos D , E y F , respectivamente. Probar que los puntos D , E y F están alineados.

Solución. Aplicando el **Teorema 1.1** al hexágono $AABBCC$. Tenemos que los puntos $AA \cap BC = D$, $AB \cap CC = F$ y $BB \cap CA = E$ son colineales. ■

Observación 2.

Teorema 1.2 (Teorema de Brianchon).

Sea $ABCDEF$ un hexágono circunscrito (no necesariamente convexo) a un círculo Ω . Entonces, las rectas AD , BE y CF son concurrentes.

1.1. Agregados culturales y preguntas**2. Conocimiento previo**

Propiedad 2.1 (Potencia de un punto exterior). Sean AD y CD dos rectas que se intersecan en X tales que $X - A - B$ y $X - C - D$. Entonces el cuadrilátero $ABCD$ es cíclico si y solo si

$$\overline{XA} \cdot \overline{XB} = \overline{XC} \cdot \overline{XD}.$$


Demostración. Rápidamente nos damos cuenta de que $\angle CXB = \angle AXD$ (*). Entonces $ABCD$ es cíclico

$$\iff \angle ABC = \angle ADC$$

$$\iff \angle XBC = \angle ADX$$

$$\stackrel{(*)}{\iff} \triangle XBC \sim \triangle XDA \stackrel{(*)}{\iff} \frac{\overline{XB}}{\overline{XC}} = \frac{\overline{XD}}{\overline{XA}}$$

$$\iff \overline{XA} \cdot \overline{XB} = \overline{XC} \cdot \overline{XD}. \quad \blacksquare$$

**3. Ejercicios y Problemas**

Sección de ejercicios y problemas para el autoestudio.

4. Problemas propuestos

Recordar que los problemas de esta sección son los asignados como **tarea**. Es el deber del estudiante resolverlos y entregarlos de manera clara y ordenada el próximo encuentro (de ser necesario, también se pueden entregar borradores).

5. Extra**Referencias**

[Agu19] Eduardo Aguilar. *Estrategias sintéticas en Geometría Euclídea*. Editorial, 2019.

- [Bac22] Jafet Baca. *Apuntes de Geometría Euclidiana para Competiciones Matemáticas*. Independent publication, 2022.

En caso de consultas

Instructor: Kenny J. Tinoco

Teléfono: +505 7836 3102 (*Tigo*)

Correo: kenny.tinoco10@gmail.com

Docente: José A. Duarte

Teléfono: +505 8420 4002 (*Claro*)

Correo: joseandanduarte@gmail.com