

原子核の変形と中性子ドリップラインに対する クーロン相互作用の効果

201910867 萩原健太
指導教員：中務孝 日野原伸生

概要

さらには中性子星などのマクロな核物質までを対象に、密度
陽子と中性子が多く集まった量子多体系である原子核を扱うことができるエネルギー汎関数理論が発展してきた。この理論を用いることで、比較的小さな質量数の原子核から超重核と呼ばれる質量数の大きな原子核に対して、系統的な数値計算を実行することが出来る。Ebata and Nakatsukasa, Phys. Scr. 92, 064005 (2017) の論文内で陽子数 $Z = 6 - 92$ の同位体のうち $N = Z$ と $N = 2Z$ の範囲
本研究では、原子核の変形と対相関を自己無撞着に決定することのできる計算プログラムであるHFBTHOを用い、陽子数 $Z=2-120$ の束縛する全ての偶々核を対象に数値計算を実行した。ただし原子核の形に関しては、パリティ対称性と軸対称性を破らない形に制限している。陽子・中性子の化学ポテンシャルが負であることを束縛条件とし、中性子と原子核の存在限界（ドリップライン）を決定し、対象
変形について解くことが出来る HFBTHO programme を利用することで、クーロン相互作用が偶偶核の変形度および中性子ドリップラインに与える影響について評価した。中性子ドリップライン側の

計算の結果からクーロン相互作用により、原子核全体で変形度が大きくなる傾向にあること、そして興味深いことに、中性子ドリップラインが拡大することが判明した。斥力の効果からエネルギー的には不安定になることが直感的に予想されるが、結果的に束縛状態にある原子核を増やすような計算結果を得た。また中性子ドリップラインが拡大している領域において、変形度が増加している原子核だけでなく球形核の状態で存在するものも確認され、中性子側の存在限界と変形度は必ずしも直接的な相関があるとは言えないことも興味深い。これらのプロセスについて考察を行うために、原子核の半径やエネルギー、変形度など様々な物理量を評価した。

本研究で発見された斥力のクーロン相互作用が一部の原子核を安定化させる現象は、我々の知る限り過去に指摘されたことがなく、この原因を詳しく考察することは重要である。クーロン相互作用によって、

がどのように変化するかを解析し、原子核の量子性が果たす重要な役割が解明された。