

慕课第三章习题及题解

3.6.2 计算题

3.1 用行阶梯形(或 LU 分解)方法求矩阵的行列式, 并与用 det 函数求的结果比较:

$$(a) A = \begin{bmatrix} -6 & -7 & 7 & 6 \\ 3 & 4 & 2 & 3 \\ -4 & -2 & 0 & 6 \\ 1 & 7 & 8 & 3 \end{bmatrix}; (b) B = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 7 & -1 \\ 7 & 7 & -6 & -8 \\ -6 & 5 & -4 & 9 \\ 9 & -7 & 3 & 2 \end{bmatrix}; (c) \begin{bmatrix} -6 & -9 & -2 & 6 \\ -6 & 5 & 7 & -9 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \\ -4 & 8 & -6 & -2 \end{bmatrix}.$$

(a) Aa=[-6,-7,7,6;3,4,2,3;-4,-2,0,6;1,7,8,3], [Ua]=ref1(Aa), Da=prod(diag(Aa)), Da1=det(Aa)

结果为:

$$La = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ -0.5000 & 0.0857 & -0.5323 & 1.0000 \\ 0.6667 & 0.4571 & 1.0000 & 0 \\ -0.1667 & 1.0000 & 0 & 0 \end{bmatrix}, Ua = \begin{bmatrix} -6.0000 & -7.0000 & 7.0000 & 6.0000 \\ 0 & 5.8333 & 9.1667 & 4.0000 \\ 0 & 0 & -8.8571 & 0.1714 \\ 0 & 0 & 0 & 5.7484 \end{bmatrix}$$

$$Da = 1.7820e+03, \quad Da1 = -1.7820e+03.$$

(b) Ab=[0,-5,7,-1;7,7,-6,-8;-6,5,-4,9;9,-7,3,2], [Ub]=ref2(Ab), Db=prod(diag(Ub)), Db1=det(Ab)

$$Db = 3368, \quad Db1 = 3368$$

$$Lb = \begin{bmatrix} 0 & -0.4018 & 1.0000 & 0 \\ 0.7778 & 1.0000 & 0 & 0 \\ -0.6667 & 0.0268 & -0.4866 & 1.0000 \\ 1.0000 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, Ub = \begin{bmatrix} 9.0000 & -7.0000 & 3.0000 & 2.0000 \\ 0 & 12.4444 & -8.3333 & -9.5556 \\ 0 & 0 & 3.6518 & -4.8393 \\ 0 & 0 & 0 & 8.2347 \end{bmatrix}$$

(c) Ac=[-6,-9,-2,6;-6,5,7,-9;2,-1,0,3;4,8,-6,-2], [Lc,Uc]=lu(Ac), Dc=prod(diag(Uc)), Dc1=det(Ac)

$$Lc = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 1.0000 & 1.0000 & 0 & 0 \\ -0.3333 & -0.2857 & -0.1394 & 1.0000 \\ 0.6667 & 1.0000 & 1.0000 & 0 \end{bmatrix}, Uc = \begin{bmatrix} -6.0000 & -9.0000 & -2.0000 & 6.0000 \\ 0 & 14.0000 & 9.0000 & -15.0000 \\ 0 & 0 & -13.6667 & 9.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.9686 \end{bmatrix}$$

$$Dc = 2260, \quad Dc1 = -2260$$

3.2 用 det 函数计算行列式:

$$(a) \begin{vmatrix} 4 & 9 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \end{vmatrix}; (b) \begin{vmatrix} 1 & 9 & 4 \\ 3 & 1 & 7 \\ 2 & 0 & 9 \end{vmatrix}; (c) \begin{vmatrix} a & b & a+b \\ b & a+b & a \\ a+b & a & b \end{vmatrix}; (d) \begin{vmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & c & 1 & 0 \\ 0 & d & 0 & 1 \end{vmatrix} \text{ 及 } \begin{vmatrix} 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & b & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & d & 1 \end{vmatrix}.$$

解: (a) Da=det([4,9,1;1,4,0;2,5,2]), 得 Da=11

(b) Db=det([1,9,4;3,1,7;2,0,9]), 得 Db=-116

(c) syms a b, Ac=[a,b,a+b;b,a+b,a;a+b,a,b], Dc=det(Ac),

得: Dc = -2*a^3 - 2*b^3, 即 Dc = -2a^3 - 2b^3

3.3 用 randintr(n)函数随机生成两个四阶方阵 A, B。

(a) 验证等式 $\det(A+B) = \det(A) + \det(B)$ 是否成立。

(b) 验证等式 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 是否成立。

(c) 验证等式 $\det(A^{-1}) = (\det(A))^{-1}$ 是否成立。

解: A=randintr(4), B=randintr(4),

(a) Ea=det(A+B)-det(A)-det(B),

$$(b) Eb=\det(A*B)-\det(A)*\det(B)$$

$$(c) Ec=\det(\text{inv}(A))-\text{inv}(\det(A))$$

三式各经三次运行, Ea 的数量级为 4,5 位十进制, Eb 的数量级为小数点后-9,-10 位, 很近于零, Ec 更接近于零。故(b,c)两问成立, 而(a)则是不成立的。

3.4 根据方程组的系数行列式, 判断其解是否存在, 是否唯一。再用行阶梯形分解方法或其他方法进行验证。

$$(a) \begin{cases} 4x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 7x_3 + x_4 = 4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}; (b) \begin{cases} -7x_1 + 4x_3 + 7x_4 = 8 \\ 3x_1 + x_2 + 7x_3 - 5x_4 = 1 \\ 4x_1 - 7x_2 - 4x_3 + 6x_4 = 1 \\ 4x_1 - x_2 - 5x_3 + 8x_4 = 3 \end{cases}$$

解: (a) $Aa=[4,-1,1,-1;2,3,7,1;2,2,2,-1;3,-1,2,0]$, $ba=[2;4;0;3]$, $Ua=\text{rref}([Aa,ba])$

(b) $Ab=[A=[2,1,3,1;8;3,-2,2,4,1;3,5,6,0,1;-2,-1,-5,1,3]$, $bb=[8;1;1;3]$, $Ub=\text{rref}([Ab,bb])$

程序运行结果:

$$Ua = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & -0.5000 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 & -0.5000 & -1.0000 \\ 0 & 0 & 1.0000 & 0.5000 & 1.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, Ub = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(a)是欠定方程, 解存在但不唯一; (b) 是超定方程, 解不存在。

3.5 利用行列式计算面积。

(a) 已知 $A(1,2)$, $B(3,3)$, $C(2,1)$, 画出三角形 ABC 图形并求其面积。

答案: $S=0.5*\text{abs}(\det([3-1,2-1;3-2,1-2]))=1.5$

(b) 已知 $A(0,0)$, $B(1,4)$, $C(5,3)$, $D(4,1)$, 画出四边形 $ABCD$ 图形并求其面积。

答案: $S=0.5*(\text{abs}(\det([1,5;4,3]))+\text{abs}(\det([5,4;3,1])))$, 结果为 $S=12$

3.6 求一个顶点在原点, 相邻顶点在 $(1,0,2)$, $(1,2,4)$, $(7,1,0)$ 的平行六面体的体积。

解: $V=\text{abs}(\det([1,1,7;0,2,1;2,4,0]))$, 体积为 30

3.7 由 $A=\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ 求 A^2 和 A^{-1} 及 $A-\lambda I$ 的行列式, λ 取哪两个数时会导致 $|A-\lambda I|=0$ 。


解: $A=[4,1;2,3]$, $D1=\det(A^2)$, $D2=\det(\text{inv}(A))$, syms lamda , $D3=\det(A-\text{eye}(2)*\text{lamda})$

答案: $D1=100$, $D2=0.1$, $D3=\text{lamda}^2-7*\text{lamda}+10$, 令 $D3=0$, 得 $\text{lamda}=2$ 和 5 两个数。

3.8 (a) 求描述如题 3-8 图所示的交通流图的方程组并求其解。

(b) 如果 x_4 的路段被封闭, 求此方程组的解。

(c) 如果 x_5 的路段被封闭, 求此方程组的解。



题 3-8 图 交通流图

解: 方程组为: $x_1+x_3-x_4=40$, $x_1+x_2=200$, $x_2-x_3-x_5=100$, $x_4+x_5=60$

写成矩阵形式：
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40 \\ 200 \\ 100 \\ 60 \end{bmatrix}$$
，显然它是一个欠定方程组，有依赖于常数的无穷个解。

程序为：C=[1,0,1,-1,0,40;1,1,0,0,0,200;0,1,0,0,1,100;0,0,0,1,1,60], U=rref(C)

$$\text{得到: } UO = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 60 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 100 \\ x_2 = 100 \\ x_3 = -x_5 \\ x_4 = -x_5 + 60 \end{cases}$$

(a) 自由变量 x_5 是表示了 x_3, x_4, x_5 的环形车流，沿 x_5 （顺时针）为正。

(b) 令 $x_4=0$ ，得到特解 $x_5=60$ ，此时方程组的解为 $X=[100, 100, -60, 0, 60]^T$ 。

(c) 此时 $x_5=0$ ，方程组的解为 $X=[100, 100, 0, 60, 0]^T$ 。

3.9 求一个顶点在原点，相邻顶点在以下三点的平行六面体的体积。

$$(a) \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad (b) \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix};$$

解：(a) $va1=[1,0,-2]'$, $va2=[1,2,4]'$, $va3=[7,1,0]'$, $Vola=\text{abs}(\det([va1, va2, va3]))$

结果为：Vola=22

(b) $vb1=[1,4,0]'$, $vb2=[-2,-5,2]'$, $vb3=[-1,2,-1]'$, $Volb=\text{abs}(\det([vb1, vb2, vb3]))$

结果为：Volb=15

3.10 用克莱姆法则解下列方程组：

$$(a) \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 4 \\ 4x_1 + 3x_2 - x_3 + 2x_4 = 6 \\ 8x_1 + 5x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 12 \\ 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 6 \end{cases}; \quad (b) \begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 11x_3 + 5x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 = -3 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \end{cases}$$

解：(a) 程序：Aa=[2,2,-1,1;4,3,-1,2;8,5,-3,4;3,3,-2,2], ba=[4;6;12;6], Da=det(Aa);

$xa1=Da\backslash\det([ba, Aa(:,2:4)])$, $xa2=Da\backslash\det([Aa(:,1), ba, Aa(:,3:4)])$,

$xa3=Da\backslash\det([Aa(:,1:2), ba, Aa(:,4)])$, $xa4=Da\backslash\det([Aa(:,1:3), ba])$,

得到：xa1=xa2=1, xa3=xa4=-1

(b) 程序：Ab=[2,2,11,5;1,1,5,2;2,1,3,2;1,1,3,4], bb=[2;1;-3;-3], Db=det(Ab);

$xb1=Db\backslash\det([bb, Ab(:,2:4)])$, $xb2=Db\backslash\det([Ab(:,1), bb, Ab(:,3:4)])$,

$xb3=Db\backslash\det([Ab(:,1:2), bb, Ab(:,4)])$, $xb4=Db\backslash\det([Ab(:,1:3), bb])$,

得到：xb1=-2, xb2=0, xb3=-1, xb4=1

3.11 用消元法把 $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 4 & 3 & 9 \\ 8 & 9 & 0 \end{bmatrix}$ 简化成 $A=LU$ ，求 $L, U, A, U^{-1}L^{-1}$ 及 $U^{-1}L^{-1}A$ 的行列式。

解：A=[2,4,8;4,3,9;8,9,0], [L,U]=lu(A), detL=det(L), detU=det(U), detA=det(A)

得到：detL=1, detU=222, detA=222, $\det(U^{-1}L^{-1})=1/\det(LU)=0.0045$, $\det(U^{-1}L^{-1}A)=1$

3.12 设平面三角形的三个顶点坐标为 $z1=[x1,y1]$, $z2=[x2,y2]$, $z3=[x3,y3]$ ，试写出计算其面积的子程序。

规定该子程序的程序头具有以下的基本格式：

```
function A=triarea(z1,z2,z3)
```

(注：下面三行是注释语句，在用 help triarea 命令时显示)

```
% function A=triarea(z1,z2,z3)
```

```
% 根据三角形的三个顶点坐标 z1,z2,z3，计算其面积 A 的子程序
```

```
% z1=[x1,y1],z2=[x2,y2],z3=[x3,y3]各为三个顶点的 1×2 坐标向量
```

(要写的程序段从此处开始)

解：子程序内容为： $A=0.5*\det(z2-z1;z3-z1);$

用 3.5 题的数据： $z1=[1,2];z2=[3,3];z3=[2,1];$ 赋值后键入 $A=triarea(z1,z2,3)$ ，得到 $A=1.5$ ，结果正确。


3.13 设某线性系统的信号流图如图 3-8 所示，输入信号为 u ，输出信号为 y ，请自行在四个中间节点上标注信号 x_1, x_2, x_3, x_4 ，然后

(a) 列出此系统的线性方程组。

(b) 将此线性方程组写成 $Ax=b$ 的标准矩阵形式。

(c) 用 $x=A\backslash B$ 求此方程，求出输出 y 与输入 u 之比，即系统传递函数。

(提示：要把 $G_1, G_2, G_3, G_4, G_5, G_6, G_7$ 设为符号变量。)



题 3.13 图 某系统的信号流图

解： $x1=G1u+G5x4, x2=G2x1, x3=G3x2, x4=G4x2+G6x3, y=G7x3$

写成矩阵形式：取 $x1, x2, x3, x4, y$ 五个变量：

$$\begin{cases} x1 = G1u + G5x4, \\ x2 = G2x1, \\ x3 = G3x2, \\ x4 = G4x2 + G6x3, \\ y = G7x3 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \\ x3 \\ x4 \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G5 & 0 \\ G2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G4 & G6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G7 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x1 \\ x2 \\ x3 \\ x4 \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} G1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \Rightarrow X = QX + Pu$$

程序为： `syms G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7`

`Q=[0,0,0,G5,0;G2,0,0,0,0;0,G3,0,0,0;0,G4,G6,0,0;0,0,G7,0,0],`

`P=[G1;0;0;0;0], W=inv(eye(5)-Q)*P`

`pretty(W(5))`

运行结果为：

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & G5 & 0 \\ G2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & G4 & G6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & G7 & 0 & 0 \end{bmatrix}, P = \begin{bmatrix} G1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{bmatrix} -G1/(G2*G4*G5 + G2*G3*G5*G6 - 1) \\ -(G1*G2)/(G2*G4*G5 + G2*G3*G5*G6 - 1) \\ -(G1*G2*G3)/(G2*G4*G5 + G2*G3*G5*G6 - 1) \\ -(G1*(G2*G4 + G2*G3*G6))/(G2*G4*G5 + G2*G3*G5*G6 - 1) \\ -(G1*G2*G3*G7)/(G2*G4*G5 + G2*G3*G5*G6 - 1) \end{bmatrix}$$

从 u 输入，y 为输出的传递函数为 W(4)，其美观显示形式为：

$$W(5) = \left[\frac{-G1 \ G2 \ G3 \ G7}{G2 \ G4 \ G5 + G2 \ G3 \ G5 \ G6 - 1} \right]$$

3.14 设矩阵方程为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 4 \\ 2 & 7 & -1 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 写成 } X=A*X+B, \text{ 求 } X=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

解：公式写成：X=A*X+B, X=inv(eye(3)-A)*B

A=[-1,2,4;2,7,-1;5,6,-2], B=[3;2;1], X=inv(eye(3)-A)*B

结果为：

$$X = \begin{bmatrix} -0.0435 \\ -0.4130 \\ -0.5652 \end{bmatrix}$$

3.15 用 3.14 题的 A、B 和求出的 X，求：

(a) E1=B-(eye(3)-A)*X

(b) E2= X-B/(eye(3)-A)

(c) E3= X- (eye(3)-A)\B

解释三个结果不同的原因。

解：(a),(c), E1=E3=~0，因为它们两式都是原题式子移项至左边的结果。

(b),E2 不能运算。因为两矩阵左除的条件是其列数相等，此处 B 为单列，分母为 3*3 矩阵，无解。