បច្ចេកទេសដាំដំណាំម្រះF1ពូជ៖ មរកត

1. លក្ខណៈម្រះពូជមរកត

- លក្ខណៈដើម៖ ដើមរឹងមាំ មានកំលាំង មែកច្រើន ផ្លែតំបូងតិច បន្ទាប់មកច្រើន ធន់អាកាសធាតុ ធន់នឹងជម្ងឺ
- អាយុប្រមូលផល ៖ ៤៣ ទៅ ៤៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដាំផ្ទាល់
- ទំរងផ្លែ៖ ទ្រវែងស្រួចក្បាល និងកន្ទុយ ប្រវែង ១៨-២០ សង់ទីម៉ែត្រ និងមុខកាត់ផ្លែ ៤.៩ ទៅ ៥.២សង់ទីម៉ែត្រ
- លក្ខណៈផ្លែ៖ បៃតងខ្ចី ក្រលាញ៉ឹកលឹបនិងខ័ណ្ឌដោយទ្រនង់លានដាច់ៗ,សម្បកស្តើងមធ្យម អាចដាំដុះ1ឆ្នាំពេញ(ធន់រដូវរំហើយ&ក្តៅ)
- ទិន្នផល ៖ ៤.៥ ទៅ ៦គីឡូក្រាម/ដើម

2. ការរៀបចំដី

- សំអាតដីចំការ និង រើសស្មៅចេញឱ្យអស់
- ភ្ជួរ រាស់ដីឲ្យបានម៉ដ្ឋណ្ណ ហើយហាលឱ្យបានពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃ ។
- ភ្ជួរដី (គោក្របី ឬ គោយន្ត) ជម្រៅពី ១៥ ទៅ ២០ សង់ទីម៉ែត្រ។

3. ការលើករងដាំ

- ទទឹងរង៖ ជារងភ្លោះ ដែលមានទទឹងរង ១ ម៉ែត្រ ចន្លោះប្រឡាយបង្ហូរទឹក ០,៦ម៉ែត្រ និង បណ្តោយទៅតាមលទ្ធភាពដោយផ្អែកលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រព ។
- គម្លាតពីរងភ្លោះនិមួយៗទៅមួយ៖ ៣ម៉ែត្រ
- កំពស់រង៖ នៅរដូវប្រាំង ពី២០ ទៅ៣០សង់ទីម៉ែត្រ និង នៅរដូវវស្សា ពី៣០ ទៅ ៥០ សង់ទីម៉ែត្រ
- ចន្លោះគុម្ព៖ ចន្លោះពីគុម្ព១ ទៅ ១ គឺ ០,៤ ទៅ ០,៥ម៉ែត្រ
- ដាក់លាមកសត្វស្ងួត ឬ ជីកំប៉ុស្ត៍៖ បរិមាណពី ១ ទៅ ២គីឡូក្រាម ក្នុងផ្ទៃដីរង១ ម៉ែត្រការ៉េ ទ្រាប់បាត ដោយផ្អែកលើគុណភាពដី។
- ប្រភេទរង៖ រងភ្លោះ ដោយមានចង្ហូទឹកកណ្តាល គម្លាតពីរងមួយទៅមួយ ចំងាយ ៣ម៉ែត្រ
  - ✓ ការគ្របរងជាកត្តាសំខាប់កាត់បន្ថយស្មៅដុះ ទប់នឹងការខាតបង់ទឹក និងដី។
  - ✓ ដំណាំនេះត្រូវប្រើប្រាស់ទ្រើងជាចាំបាច់។
  - ✓ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទឹកជួយកាត់បន្ថយកំលាំងពលកម្ម និងកាត់បន្ថយថ្លៃដើម

ចំពោះដំណាំម្រះ កសិករត្រូវតែលើករងឲ្យរួចរាល់មុនពេល ដាក់បណ្តុះកូន។



រូបភាពគំរូទី១៖ ការលើករង

ម្រះមរកត

4. ការបណ្តុះកូនម្រះ

ដើម្បីឲ្យកសិករដាំម្រះប្រមូលផលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងទទួលបានទិន្នផលតាមផែនការ នោះកសិករមានវិធីដាំ ជា២បែបគឺ ៖

4.1. ដាំគ្រាប់ពូជដោយផ្ទាល់

ចំពោះគ្រាប់ម្រះ F1 **ពូជ មរកត** របស់**ក្រុមហ៊ុន ខេ អេស ស៊ីដ ឯ.ក** កសិករអាចយកគ្រាប់ដាំដោយផ្ទាល់បាន លុះត្រាតែចំការមានប្រព័ន្ធទឹក និងអាចគ្រប់គ្រងសំណើមគ្រប់គ្រាន់។ បន្ទាប់ពីដាំបានរយៈពេល ៣ថ្ងៃបន្ទាប់មកគ្រាប់ពូជនឹងចេញពន្លក នឹងថ្ងៃទី៧ ចេញស្លឹក២។ ការដាំដោយគ្រាប់ផ្ទាល់ គឺកសិករត្រូវពិនិត្យឲ្យបានទៀតទាត់ មានគ្រាប់ចំនួន ៣-៥% នឹងបាត់បង់ ឬមិនដុះ មកពីវិធីកប់គ្រាប់ជ្រៅពេក ឬទឹកជោគជាំពេក ឬមានកត្តាសត្វបំផ្លាញផ្សេងៗ ដូច្នេះកសិករត្រូវបណ្តុះត្រៀមជួសចំនួន ១០%។

4.2. ការបណ្តុះកូន

មុនពេលបណ្តុះកូនម្រះ កសិករត្រូវតែធ្វើរោងបណ្តុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺគិតទៅទំហំចំនួនកូនដែលត្រូវដាំ ដោយផ្តោតលើកំពស់រោង ០,៨ម៉ែត្រពីដី ដែលរោងត្រូវប្រើស្បៃសំណាញ់ការពារសត្វព័ទ្ធជុំវិញ និងមានដំបូលជិតដែលការពារសត្វល្អិត(ការពារកើតវ៉ីរុស) ទឹកភ្លៀង និងពិនិត្យកំរិតកំដៅឲ្យត្រឹមត្រូវ។ ជាមធ្យមកូនម្រះ ត្រូវប្រើចំនួនចន្លោះពី ១១០០០ ទៅ១៦០០០កូនក្នុង១ហិចតា អាស្រ័យលើ ចន្លោះគុម្ព និងចន្លោះរង។

កសិករត្រូវតែគិតពីទំហំរោងបណ្តុះកូន ការលាយល្បាយដីគឺគិតទៅតាមចំនួនថាសបណ្តុះ ឬកន្ទោងបណ្តុះកូន។

ម្រះពូជមរកត នឹងចេញស្លឹក២ បន្ទាប់ពីបានដាក់ដាំគ្រាប់ដោយផ្ទាល់ក្នុងថាសបណ្តុះ ឬកន្ទោង ប្រសិនបើមានសំណើម និងកំដៅសមរម្យ(៣០ ទៅ៣៥អង្សារ)។ បន្ទាប់ពីបណ្តុះកូន បានរយៈ៤ ទៅ ៦ថ្ងៃ កសិករត្រូវពង្រឹងកូន (បន្ថយទឹក និងដាក់កូនឲ្យត្រូវកំដៅដោយផ្ទាល់រយៈពេល២ថ្ងៃ) មុនពេលយកទៅដាំលើរង។ ថ្ងៃទី៧ ឬថ្ងៃទី៨ អាចយកទៅដាំលើរងបានហើយ។

រូបភាពគំរូទី២៖ ការធ្វើរោងបណ្តុះកូនម្រះមរកត

5. ការស្ងួងកូន

ករណីបណ្តុះកូនម្រះក្នុងថាសបណ្តុះ ឬកន្ទោង អាយុបាន ៧ ទៅ៨ថ្ងៃ ត្រូវស្ងួងលើរងកសិករត្រូវអនុវត្តន៍ដោយ៖

- កសិករត្រូវតម្លើង ទ្រើងជាមុនសិន ព្រោះបន្ទាប់ពីស្ងួងកូនហើយ កូនម្រះមរកត លូតលាស់លឿនណាស់
- បញ្ចូលទឹក តាមរងឲ្យជោកជាំពេលពីល្ងាច ដើម្បីដាំពេលព្រឹក
- មុនពេលដាំត្រូវលាយល្បាយដីចាក់ចូលរន្ធៅមុនពេលស្ងួងកូនចំនួន ១៥០មីលីត្រ/រណ្តៅ (ដីអ៊ុយរ៉ែ ៥០ក្រាម និងហ៊ីយមិកអាស៊ីដ ៥០ក្រាមលាយទឹក ២០លីត្រ)
- បន្ទាប់ពីដាក់ត្រូវសង្កត់ដីជុំវិញកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

រូបភាពទី៣៖ ការបញ្ចូលដីក្នុងរណ្តៅ កំឡុងពេលស្ងួងកូនម្រះមរកត

រូបភាពទី៤៖ ប្រភេទទ្រើងដែលកសិករនិយមដាំម្រះមរកត

6. ការថែទាំ

6.1 ការគ្រប់គ្រងទឹក៖

ការស្រោចស្រព ដោយប្រព័ន្ធ ប្រឡាយទឹក

ការស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធដំណក់ ទឹក

ការស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធ Sprinkler

ការស្រោចស្រពដោយប្រព័ន្ធសាច

ដំណាំម្រះ ក៏ដូចដំណាំផ្សេងទៀតដែរ ទឹកគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិត។ ប្រសិនបើ ការប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនពេកនាំឲ្យខាត់បង់ពេលវេលា ចំណាយច្រើន និងធ្វើឲ្យដំណាំម្រះងាប់ តែបើខ្វះធ្វើបាត់បង់ទិន្នផល និងងាប់ដើមដែរ។ តើកសិករគួរតែគ្រប់គ្រងដោយវិធីណា? គួរតែប្រើពេលណាស់?

- ❖ ចំពោះដំណាំម្រះកសិករ អាចគ្រប់គ្រងទឹកដោយប្រើ៖
  - ➢ **ប្រព័ន្ធដំណក់** គឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងសន្សំសំចៃទឹកកំរិតបានច្រើន ចំគោលដៅតាមប្រព័ន្ធឫស និងអាចដាក់ជីតាមប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យកសិករសន្សំពេលវេលា និងកំលាំងពលកម្មបានច្រើន។
  - ➢ **ប្រើប្រព័ន្ធទុយោសាចទឹក** គឺក្នុងសន្សំសំចៃទឹកកំរិតមធ្យម ចំគោលដៅតាមប្រព័ន្ធឫស និងអាចដាក់តាមប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យកសិករសន្សំពេលវេលា និងងាយបទបែនតាមសណ្ឋានដី។
  - ➢ **បង្ហូរតាមចង្អូរទឹក** ចំពោះរកសិករខ្នាតមធ្យម(៥អាឡេង) និងខ្នាតធំ គឺពិបាកក្នុងគ្រប់សំណើមដី ធ្វើខាតបង់បរិមាណទឹក ពេលវេលា ចំណាយច្រើន និងមានហានិភ័យលើដំណាំ(ទិន្នផលទាប ឬងាប់ដើម)។
- ❖ ពេលវេលាត្រូវដាក់ទឹក៖ ចំពោះការប្រើប្រាស់ទឹក គឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ដំណាំ តែការប្រើប្រាស់ទឹកក៏អាចនាំឲ្យនាំឲ្យដំណាំ ស្ត្រេសឈានដល់ការការពន្យាពេលប្រមូលផល និងបាត់បង់ទិន្នផល។ កសិករត្រូវគោរពគោលការណ៍ តាមបែបធម្មជាតិនៃដំណាំតាមកាលពេលវេលារដូចជា៖
  - ➢ **រដូវប្រាំង ឬ កូនរដូវប្រាំង**(មិនមានទឹកភ្លៀងចាប់ពី១៨ថ្ងៃឡើង) ៖ អាចស្រោចទឹក ក្រោយពីថ្ងៃរ:២០នាទី រហូតដល់ម៉ោង ១០:៣០នាទីព្រឹក និងចាប់ផ្តើមបន្តស្រោចនៅម៉ោង ០៣:០០នាទីរសៀល។

កូនម្រះបន្ទាប់ពីបណ្តុះបាន១០ថ្ងៃ

- ❖ ពេលវេលា និងបរិមាណកំរិតទឹកដែលត្រូវប្រើ៖
  - ➢ **រដូវប្រាំង ឬ កូនរដូវប្រាំង(មិនមានទឹកភ្លៀងចាប់ពី១៨ថ្ងៃឡើង) ៖** កំរិតទឹកប្រើប្រាស់គឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រភេទដី ចំពោះប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ និងខ្សាច់(ត្រូវប្រើជីកំប៉ុស ២០ ទៅ៤០គោន/១ហិតា ឬប្រើដំណាំគម្របដីបានចាប់ពីពីរដងឡើងទៅ) ៥០ទៅ ៥៥ម៉ែត្រគូប/ហិតា (តែបើដាំនាទឹកសម្រក ត្រូវប្រើតាមសំណើមដី អាច ១៥ទៅ២០ ម៉ែត្រគូប/ហិតា)។

    ចំណាំ៖ នៅរដូវនេះ កសិករត្រូវប្រើប្រព័ន្ធទឹកសាច(Mini-Sprinkler)ពីលើទ្រើងម្រះ ដោយបំពាក់កំពស់ពីលើទ្រើងចន្លោះ៣,៥-៥តឹក ហើយប្រើ១ ទៅ២ដង/១ថ្ងៃ ធ្វើឲ្យទិន្នផលខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វបានពី៣០ ទៅ៤០% ។

- **រដូវភ្លៀងធ្លាក់ ឬសំណើមខ្ពស់ ៖** កសិករគួរចាំឲ្យដើមមានកំដៅសិន(ត្រូវស្ងួតដើម ឬបង្គោលដែលនៅក្នុងចំការ) ឬត្រូវគួរចាំស្ងឹកស្ងួតសំណើម(រដូវងារ) ពេលគឺត្រូវចាប់ផ្តើមស្រោចនៅចន្លោះម៉ោង១០:០០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ០៣:៣០នាទីរសៀល ត្រូវបញ្ចប់ការស្រោច។ នៅរដូវនេះមានខែខ្លះភ្លៀងជាប់ៗគ្នា ដែលសំណើមគ្រប់គ្រាន់ ឬជួនកាលសំណើមអាចលើស មិនគួរស្រោចទឹកបន្ថែមទេ ដែលអាចធ្វើឲដំណាំស្រ្តេសឬងាប់និងអាចបង្ករជាជម្ងឺផ្សេងៗទៀត។ កំរិតការប្រើប្រាស់នៅរដូវនេះ គឺកសិករត្រូវមានភាពទទួលខុសត្រូវដោយពិនិត្យលើរងផ្ទាល់ ដោយឧបករណ៍គ្រប់គ្រងសំណើម ឬស្ទាប់ដោយដៃផ្ទាល់។

6.2 ការគ្រប់គ្រងដី៖

ដំណាំម្រះកសិករត្រូវយល់ដឹងអំពីគុណភាពដី ឬដឹងពីប្រវត្តនៃការធ្វើដំណាំក្បែរខាងដូចជា តំបន់ខ្លះមិនតម្រូវឲ្យប្រើជីធម្មជាតិទ្រប់បាត(ដីសណ្ដរទន្លេ ឬដីក្រហមនិងដីរៀនព្រៃស្រោងថ្មី) តែតំបន់ភាគច្រើននៃស្រុកខ្មែរ ត្រូវតែប្រើជីធម្មជាតិដែលតិច ឬច្រើនទៅតាមលក្ខណៈនៃដី ដូចជាប្រភេទដីល្បាយខ្សាច់ខ្លះត្រូវប្រើចំនួន២០ ទៅ៤០គោន/១ហិតា ឬដាំដំណាំគម្របដីយ៉ាងតិច ២ដង។ (សម្រាប់ជីកសិករអាចប្រើប្រាស់បានតាមរយៈ ២របៀប៖

របៀបទី១៖ កសិករអាចដាក់ផ្ទាល់លើរង ដោយចោះរន្ធដាក់៥ក្រាមក្នុង១រណ្ដៅទៅតាមដំណាក់កាល និងប្រភេទដី។ នេះជាតារាង អាយុកាល ចំនួន និងប្រភេទដី ដែលត្រូវប្រើក្នុង១វដ្ដជីវិតរបស់ដំណាំម្រះពូជមរកត សម្រាប់ផ្ទៃដី ១ហិតា៖

ចំនួនថ្ងៃត្រូវដាក់ជីបន្ទាប់ពីស្ទុងកូន	ចំងាយត្រូវដាក់ពីគល់ cm	ជីសរ kg	ដេអាប៉ kg	ចំរុះ kg	កាលី kg	កំចំណាំ
		46-0-0	18-46-0	20-20-15+TE	0-0-60	
ចំនួនជីត្រូវប្រើសរុប១ហិចតា/រដូវដំណាំ Kg		212	190	275	360	
7	6-8cm	22				ដើម ២រន្ធ & 1g/រន្ធ
14	10-15cm	10	45			ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
21	20-25cm			55		ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
31	20-25cm			55		ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
41	20-25cm		25		30	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
51	20-25cm	30			25	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
61	20-25cm	20			35	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
71	20-25cm			55		ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
81	20-25cm	10	30		15	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
91	20-25cm	10	10		25	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
101	20-25cm	20			35	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
111	20-25cm			55		ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
121	20-25cm	10			45	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
131	20-25cm	10	30		15	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
141	20-25cm	10	10		25	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
151	20-25cm			55		ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
161	20-25cm	10	30		15	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
171	20-25cm	10	10		25	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
181	20-25cm	20			35	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ
191	20-25cm	20			35	ដើម ១រន្ធ & 5g/រន្ធ

របៀបទី២៖ជាការដាក់ជីទៅតាមប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក គឺភាគច្រើន កសិករត្រូវប្រើជី ប្រភេទដែលរលាយ ក្នុងទឹក និងមិនសូវមានកាកសំណល់ដែលរំខានដល់ រន្ធដំណាក់ទឹក។ នេះជាតារាង អាយុកាល ចំនួន និងប្រភេទជី ដែលត្រូវប្រើក្នុង១វដ្តជីវិតរបស់ដំណាំម្រះពូជមរកត សម្រាប់ផ្ទៃដី ១ហិតា៖

ចំនួនថ្ងៃត្រូវដាក់ជីបន្ទាប់ពីស្តុងកូន	វគ្គនៃដំណាំ	Urea	MAP	Kcl	15-15-15+TE	CaNo3	MgSo4	Huminc Acide
		46-0-0	12-61-0	0-0-60	15-15-15+TE	15-0-0+ 24% CaO	11-0-0+ 15.4%MgO	0-0-15+ 40% Humic Acide
7	I.វគ្គកូនសំណាប (១៦ថ្ងៃ)	4.03	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
4		4.03	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		4.50	4.03	0.00	5.00	0.00	1.01	1.00
4		4.50	4.27	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
4	II.វគ្គលូតលាស់ (៣២ថ្ងៃ)	4.50	3.79	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	4.27	0.00	6.73	1.00	1.01	1.00
4		5.50	4.27	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	5.69	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	III.វគ្គថែទាំផ្លែផ្កា និង ប្រមូលផល (76ថ្ងៃ)	5.50	6.54	6.51	8.00	1.00	1.50	1.00
4		5.50	6.54	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	0.00	8.00	1.00	1.50	1.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	0.00	8.00	1.00	1.50	1.00
4		5.50	7.59	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	8.00	1.00	2.00	1.00
4		5.50	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	7.59	5.33	0.00	1.00	2.00	1.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4		5.50	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
សរុប គិតជា Kg		**142.65**	**56.94**	**106.77**	**50.26**	**7.00**	**10.51**	**8.00**

តារាងដាក់ជីតាមអាយុកាលលូតលាស់របស់ដំណាំម្រះ

7. ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជម្ងឺ

7.1 ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត

ចំពោះម្រះF1 ពូជ មរកត ជាប្រភេទពូជដែលធន់នឹង ជម្ងឺ រ៉ាស ធន់នឹងអាកាសធាតុស្រុកខ្មែរយើងណាស់។ កន្លងមកតាមរយៈការប្រៃប្រួលអាកាសធាតុឃើញថា សត្វល្អិតបានបំផ្លាញដំណាំខ្លាំងណាស់ជាពិសេសរដូវប្រាំងសម្រាប់ពូជមរកត មានប្រភេទសត្វល្អិតដូចជា៖ ពពួកសត្វជញ្ជក់មានដូចជា រុយស, មមាចខៀវ,ទ្រីប, ចៃ……, **ពពួកជង្គ្រី៖** ជង្គ្រីចោះផ្លែ, ជង្គ្រីហ្វូង, ជង្គ្រីមូស្លឹក,

កូនដង្កូវ អណ្តើកមាស..... និងពពួកស្រាំង ឬរុយចោះផ្លែ

ពពួកនេះ វាអាចធ្វើឲ្យដំណាំបាត់បង់ទិន្នផលទាំងស្រុងបាន ប្រសិនបើមិនមានវិធានការការពារ។ វារីករាលដាលខ្លាំង នៅពេលណា ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅ ហើយស្ងួត ឬពេលមិនមានភ្លៀង រយៈពេលចាប់ពី ៥ទៅ១៥ថ្ងៃជាប់គ្នា។

7.1.1 វិធីការពារ៖

កសិករត្រូវតែត្រួតពិនិត្យចំការជាប្រចាំ ប្រសិនបើឃើញសត្វល្អិតទាំងនេះត្រូវកំចាត់ឲ្យទាន់ពេលវេលា តាមតែអាចធ្វើទៅបាន តាមរយៈ៖

- ✓ ការតែងមែក និងស្លឹកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
- ✓ ការប្រើប្រាស់ទឹកសាចលើស្លឹក (ប្រព័ន្ធmini- Sprinkler ពីលើទ្រើងទាំងមូលដើម្បីកំចាត់ពងសត្វ នៅរដូវប្រាំង)
- ✓ ការប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ផ្សែងលាយថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត

7.1.2 វិធីកំចាត់ ៖

កសិករត្រូវតែមានការយល់ដឹង ឬប្រឹក្សារជាមួយមន្ត្រីជំនាញលើថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ មុនពេលសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់។ ដោយសារតែកន្លងមក ថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតមួយចំនួន បានសុំាទៅនឹងតំបន់នោះរួចទៅហើយ នៅពេលកសិករទិញថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិតទាំងនោះទៅប្រើប្រាស់ បែជាមិនមានប្រសិទ្ធភាព នាំឲ្យកសិករខាតបង់ដូចជា លុយ កំលាំងពលកម្ម ពេលវេលា និងបាត់បង់ទិន្នផលទៀតផង។

ខាងក្រោមនេះជាធាតុសកម្មថ្នាំកំចាត់សត្វល្អិត ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៖

ឈ្មោះធាតុសកម្ម	ពពួកសត្វល្អិតជញ្ជក់	ពពួកដង្កូវ ស៊ីរូង ចោះ	ពពួកដង្កូវស៊ីញ៉ែ	ពពួកកាត់រមូ ស្លឹក	រុយចោះផ្លែ
Pymetrozine 600g/kg+ Nitenpyram 200g/kg	* * *		*	* *	* *
Carbaryl 85% WP	* * *		* *		
Thiamethoxam	* *				
Imidachloprid	* * *				
Permethrin 500g/L	*	*	* * *	*	*
Indoxacarb		*	* *	* * *	
Chlorantranilprole10% + Chlorfenapyr 20% SC	* *	* * *	*	* * *	
Flubendiamide		* *		*	

សំគាល់ ៖ * (ងាប់តិច) * * (ងាប់មធ្យម) * * * (ងាប់ខ្លាំង)

ទ្រីប

រុយសរ

មមាចខៀវ

ពពួកចៃ

សត្វល្អិត៖ដង្កូវចោះផ្លែ

សត្វល្អិត៖ដង្កូវមូស្លឹក

ដង្កូវអណ្តើកមាស

សត្វល្អិត៖ស្រាងទិចផ្លែ

7.2 ការគ្រប់គ្រងជំងឺ

ចំពោះដំណាំម្រះ កសិករត្រូវឧស្សាហ៍ត្រួតពិនិត្យមើលចំការនៅអំឡុងពេលកូនម្រះនៅតូច ដែលមានអាយុចាប់ពី ១៥ថ្ងៃឡើង ព្រោះជាដំណាក់កាលជំងឺចាប់ផ្តើមឆ្លងចូលដំណាំ ហើយការកើតមានជំងឺអាចបណ្តាលមកពីការចម្លងរបស់សត្វល្អិត, ពពួកផ្សិតនៅក្នុងដី, កត្តាពូជ(ការជ្រើសរើសពូជមិនបានត្រឹមត្រូវ ក៏ការទុកពូជដែលមានជំងឺស្រាប់)។

ប្រភេទជំងឺដែលឧស្សាហ៍កើតលើដំណាំម្រះមានដូចជា៖ ជំងឺរលួយគល់កូន(Damping off)ជំងឺផ្សិតម្សៅ(powdery mildew), ជំងឺអ៊ុចលឿងស្លឹក(downy mildew), ជំងឺអ៊ុចភ្នែកកង្កែប(anthracnose), វីរុស(Virus), ជំងឺស្វិតស្រពោនស្រស់(bacterial wilt)។

ជំងឺ រលួយគល់

ជំងឺផ្សិតម្សៅ

ជំងឺអ៊ុចភ្នែកកង្កែប

វីរុស mosaic

ជំងឺអ៊ុចលឿងស្លឹក

7.2.1 វិធីការពារជំងឺរុក្ខជាតិ

ការពារជំងឺរុក្ខជាតិគឺសំខាន់ណាស់ ដើម្បីរក្សាផលដំណាំឲ្យមានគុណភាពល្អ និងបង្កើនទិន្នផល។ ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រសំខាន់ៗ៖

- រៀបចំដីឲ្យល្អកាប់ឫស និងសំណល់រុក្ខជាតិចាស់ៗចេញ
- បន្ថែមជីកំប៉ុស ឬជីសរីរាង្គ

- ប្តូរដំណាំ (crop rotation) ដើម្បីកាត់បន្ថយមេរោគនៅក្នុងដី
- សម្អាត និងកម្ចាត់រុក្ខជាតិឆ្លងជំងឺ
- កាត់បំបាត់ស្លឹក ឬដើមដែលមានជំងឺ
- កុំទុកសំណល់ជំងឺនៅលើវាល
- សម្អាតឧបករណ៍កសិកម្មជាប្រចាំ
- ប្រើថ្នាំការពាររុក្ខជាតិដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
- ប្រើថ្នាំតាមការណែនាំបច្ចេកទេស
- ពាក់សម្ភារៈការពារ (ម៉ាស់ ស្រោមដៃ)

រូបភាពឧទាហរណ៍

➢ ខាងក្រោមនេះជាតារាងធាតុសកម្មថ្នាំការពារ និងព្យាបាលជំងឺ៖

ឈ្មោះធាតុសកម្ម	របៀកម្ចាត	ប្រភេទជំងឺ
Metalaxyl	ព្យាបាល	downy mildew
Azoxystrobin	ព្យាបាល	powdery mildew
Azoxystrobin	ព្យាបាល	anthracnose
Chlorothalonil	ការពារ	
Mencozeb	ការពារ	

ចំពោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្ម កសិករត្រូវសាក់សួរពត៌មាននៃការប្រើប្រាស់ពី មន្ត្រីកសិកម្ម និងបុគ្គលិកជំនាញ់ មុនធ្វើការប្រើប្រាស់។