
$M(\tilde{t})$ per (a, b), with $\tilde{t}$ in each cell; $\tilde{t} = 5/|\lambda_2|$
96x96, v = 1, N = 4 evenly spaced, $\tau = 0.01$, modal engine; λ_2 from the char-time job
M from the spectral (eigen-modal) series
8.906×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.4966$
1.080×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.4632$
3.351×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.2680$
6.135×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1623$
5.778×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.5887$
6.938×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.5515$
2.690×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.3070$
6.134×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1624$
9.008×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.6549$
8.993×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.6178$
2.218×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.3552$
6.124×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1633$
3.851×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.6407$
3.552×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.6171$
3.153×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.4035$
6.010×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1736$
a
0.1
1
10
100
b
0.1
1
10
100
$\log_{10} M(\tilde{t})$
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
−2.00