
$M(\tilde{t})$ per (a, b), with $\tilde{t}$ in each cell; $\tilde{t} = 5/\mathrm{Re}(\lambda_2)$
96x96, v = 1, N = 4 evenly spaced, $\tau = 0.01$, modal engine; λ_2 from the char-time job
M from the spectral (eigen-modal) series
6.869×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.5416$
8.871×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.4971$
3.258×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.2728$
6.135×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1623$
3.000×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.7170$
4.139×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.6477$
2.539×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.3170$
6.134×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1624$
3.685×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.9985$
4.057×10^{-2}
$\tilde{t} = 0.8749$
1.942×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.3800$
6.124×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1633$
1.865×10^{-1}
$\tilde{t} = 1.2530$
1.926×10^{-1}
$\tilde{t} = 1.0729$
2.724×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.4496$
6.010×10^{-1}
$\tilde{t} = 0.1736$
a
0.1
1
10
100
b
0.1
1
10
100
$\log_{10} M(\tilde{t})$
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00
−1.25
−1.50
−1.75
−2.00