
$M(\tilde{t})$ per (a, b), with $\tilde{t}$ in each cell; $\tilde{t} = 1/|\lambda_2|$
96x96, v = 1000, N = 4 evenly spaced, $\tau = 0.01$, power engine; λ_2 from the reduced operator's eigenvalues
M by exact powers of the one-step operator
0.999015
$\tilde{t}$ = 0.03244
0.999015
$\tilde{t}$ = 0.03244
0.999015
$\tilde{t}$ = 0.03244
0.999014
$\tilde{t}$ = 0.03244
0.999034
$\tilde{t}$ = 0.03236
0.999034
$\tilde{t}$ = 0.03236
0.999034
$\tilde{t}$ = 0.03236
0.999033
$\tilde{t}$ = 0.03237
0.999199
$\tilde{t}$ = 0.03162
0.999199
$\tilde{t}$ = 0.03162
0.999198
$\tilde{t}$ = 0.03162
0.999192
$\tilde{t}$ = 0.03165
0.999726
$\tilde{t}$ = 0.02798
0.999726
$\tilde{t}$ = 0.02798
0.999725
$\tilde{t}$ = 0.02799
0.999715
$\tilde{t}$ = 0.02811
a
0.1
1
10
100
b
0.1
1
10
100
$M(\tilde{t})$
0.9998
0.9997
0.9996
0.9995
0.9994
0.9993
0.9992
0.9991
0.9990