
$M(\tilde{t})$ per (a, b), with $\tilde{t}$ in each cell; $\tilde{t} = 5/|\lambda_2|$
96x96, v = 1000, N = 4 evenly spaced, τ = 0.01, power engine; λ_2 from the reduced operator's eigenvalues
M by exact powers of the one-step operator
0.614 $\tilde{t}$ = 0.16222
0.614 $\tilde{t}$ = 0.16222
0.614 $\tilde{t}$ = 0.16222
0.614 $\tilde{t}$ = 0.16222
0.616 $\tilde{t}$ = 0.16181
0.616 $\tilde{t}$ = 0.16181
0.616 $\tilde{t}$ = 0.16181
0.616 $\tilde{t}$ = 0.16183
0.636 $\tilde{t}$ = 0.15808
0.636 $\tilde{t}$ = 0.15808
0.636 $\tilde{t}$ = 0.15809
0.635 $\tilde{t}$ = 0.15825
0.744 $\tilde{t}$ = 0.13991
0.744 $\tilde{t}$ = 0.13991
0.744 $\tilde{t}$ = 0.13997
0.742 $\tilde{t}$ = 0.14054
a
0.1
1
10
100
b
0.1
1
10
100
$M(\tilde{t})$
0.800
0.775
0.750
0.725
0.700
0.675
0.650
0.625
0.600